



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Q. 165. S. 12.




E. BIBL. RADCL.

21
J. 3
-9


~~81. 7~~
X

1512 e. 67
3

CR. Q. 71







INSTITVTIONVM
MEDICINAE
PRACTICAE

Q V A S

AVDITORIBVS SVIS PRAELEGEBAT
IO. BAPT. BURSERIVS

DE KANILFELD

VOLV MEN TERTIVM

DE

PRAECIPVIS SINGVLARVM CORPORIS
PARTIVM MORBIS

AC PRIMVM DE IIS,
QVAE AD CAPVT PERTINENT.

EDITIO NOVA.

LIPSI AE,
SVMTIBVS CASPARI FRITSCH,
MDCCXCVIII.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

BY
JOHN F. JOHNSON
OF THE
NEW YORK PUBLIC LIBRARY

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT
BY
JOHN F. JOHNSON
OF THE
NEW YORK PUBLIC LIBRARY

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT
BY
JOHN F. JOHNSON
OF THE
NEW YORK PUBLIC LIBRARY

LECTORI BENEVOLO!

Superioribus libris et omne febrium genus, et morbos exanthematicos febriles complexi sumus. Nunc morbos singularum corporis partium, in primis interiorum, explicandos aggredimur, initium ab iis, qui ad caput pertinent, facientes. Ordinem de industria, quem natura prope ipsa, quem sedes, quem functionum laesio, quem partium, et locorum connexio, quem simplex, et primus adspectus commonstrant, cuicumque alii, etsi ad speciem eximio, et acute excogitato, multas ob causas praetulimus; nihil veriti censoriam virgulam, aut eorum objurgationes, qui id aegre admodum ferent, imò nobis etiam subirascentur, quod in tanta methodorum, quas Nosologi nostri temporis in scholas inuexerunt, commendatione, et celebritate vulgarem, antiquamque rationem sequamur. Verum, si quid in hoc

culpae exsistit, facile nobis condonatum iri speramus, simul ac nouerint (vti vltro fatemur), nos natura sic constitutos, ac factos esse, vt difficillime sola rerum nouitate moueamur. Non enim quid nouum, vt vulgo fit, sed, quid verum, quid rectum, quid vtile, commodumque sit, quaerimus, et sectamur. Nosologorum labores, et curas, quibus morbos in classes, ordines, genera, et species Botanicorum exemplo redigere annisi sunt, non modo admiramur, sed etiam sua laude, ex eo quod memoriae cum ad eos nominandos, tum ad distinguendos magno sunt adiumento, fraudari nolumus, nec patimur. At (quid dissimulem?) eorum systemata omnia haecenus cognita, quantumuis elaboratissima, eisdem propemodum vitiis, ac difficultatibus laborant, eisdemque scopulis, et syrtibus obijciuntur, in quae impegerunt illa Botanicorum. Atque, vt nouorum nominum, quibus abutuntur, barbariem, arbitrariamque veterum, vsuque receptorum mutationem praetermittam, quanta (dii boni!) rerum confusio, quantus a receptis doctrinis discessus, quantaedemum, et quot tenebrae, obscuritatesque supersunt! Illud maxime, ac saepissime vsu venit, vt morbi summopere discrepantes, genereque diuersi

diuerſi in vna, eademque claſſe contra naturæ inſtitutum comprehendī, coaceruari, et vi qua-
dam compelli cernantur; dum alii, natura af-
fines, propinqui, et veluti colligati, ſyſtematis
cauſſa, ac neceſſitate pene diuelluntur, ſepa-
rantur, atque ineptiſſime diſponuntur. Exem-
plis quibuſdam res illuſtranda eſt, vt magis cla-
ra, ac perſpicua fiat. JO. BAPTISTA MICHAEL
SAGARIUS in altera, et nuperrima ſui *ſyſtematis*
editione *claſſem XIII.* conficit ex morbis, quos,
SAUVAGEſTVM tanquam ducem ſecutus, vocat
veſanias. In hujus claſſis *ordine I.* collocat *hal-*
lucinationes, nouum, inauditumque denomina-
tionis genus. Ad has vero varia morborum
genera, *vertiginem* nempe, *ſuffuſionem*, ſiue *cata-*
ractam, *diplopiam*, ſiue duplicatam obſectorum
viſionem, *ſyrgimum*, ſiue aurium tinnitum, *hy-*
pochondriaſin, ſiue paſſionem hypochondriacam,
et *ſonnambulismum* referunt. Quis non videat
illico maximum interuallum, quod intereſt ver-
tiginem inter, et cataractam, inter aurium tin-
nitum, et duplicatam viſionem, inter hypo-
chondriaſin, et ſonnambulismum? Tirōnes
ipſi vel leuiſſime morborum ſcientia imbuti ju-
diciū de hiſce ferant. In *ordine II.* ejuſdem
claſſis ponit *morofitates*, nouum id pariter, et

penitus antehac medicis ignotum morborum nomen. Morositatibus adnumerat *picam*, *bulimiam*, *polydipsiam*, *antipathiam*, siue auersationem, *nostalgiam*, siue patriae desiderium, *panophobia*, siue pauorem in somno, *satyriasmum*, siue penis tentiginem cum effreni veneris cupiditate, *nymphomaniam*, siue furorem vterinum, *tarantismum*, *hydrophobiam*, et *rabiem*. En pauorem in somno confusum cum satyriasi, nostalgiam cum furore vterino, tarantismum cum hydrophobia, cum siti, cum appetitus aucti vitiis, cum rabie; morbis, ni fallor, toto coelo distantibus. En monstra, en profecto vesanias, hallucinationesque noui systematis! Quemadmodum vero diversos, alienosque morbos vna conjungi systematis ratione demonstrauius; sic eorum, qui licet affines, et proximi, tamen systematis ejusdem culpa disjunguntur, exemplum ex eodem auctore depromere non erit alienum. In ordine I: class. XI., in qua inflammationes, siue *phlegmasias* congeffit, recensentur *phlegmasias* *miscu-
losae*, nempe *phlegmone*, siue tumor inflammatorius, *cynanche*, *myosotis*, *carditis*. In ordine II. *phlegmasias* *membranaceas*, nempe *phrenitin*, *diaphragmatin*, *pleuritidem*, *gastritidem*, *enteritidem*, *epiplo-
itidem*, *cystitidem* etc. In his duobus ordinibus
cynan-

cynanche, siue angina, et pleuritis tantummodo verae, et legitimae, id est phlegmonodes, locum obtinent. Hinc anginarum, et pleuritidum reliqua genera, siue species, uti angina spuria, catarrhalis, ulcerosa, gangraenosa, convulsiva, paralytica, aliaeque; itemque pleuritis rheumatica, putrida, biliosa, verminosa etc., licet ratione sedis, et symptomatum similitudine morbi prope connexi, systematis vi, ac violentia segregantur, et plerique ad alias classes rejiciuntur. Recte id fieri, et tironibus instituentis utile esse, aut clinicis ipsis commodum quis dixerit? Nimius essem, si ejusmodi systematum nosologicorum vitia vellem percurrere. Satis erit exemplum aliquod adhuc specierum pene innumerabilium adducere, quae a quibusdam ponuntur, et, fere dixerim, temere multiplicantur. In primis illae superuacuae videntur, quae a levi aliquo adjuncto symptomate desumuntur. Errare etiam non leuiter illi videntur, qui quodlibet symptoma pro morbo accipiunt. Oscitatio, pandiculatio, horror febrilis iis pro tot morbis sunt. Quae res sane morborum non modo genera, verum etiam species sine ullo emolumento adauget in infinitum. Quapropter non nostrum, sed Cl. LUDWIGII iudicium

cium velim audiatur. Is enim post recensitionem systematis nosologici a SAGARIO editi, se vero, inquit, nobis liceat dicere, quid nos sentiamus de hoc libello, ac de Cl. SAVVAGES, omnibusque aliis ejusmodi libellis hac methodo conscriptis, intelligimus quidem insignem hujus rei difficultatem, summamque in eo studii assiduitatem, potissimum in B. SAVVAGES Nosologia methodica; tamen non possumus non fateri, has nimias symptomatum diuisiones plus confundere, quam erudire, atque vero diuisionis fundamento talia systemata destituta nobis videri a). Ad LVDWIGII sententiam propemodum accedit ALBRECHTVS THAER, eos affirmans, qui diuisiones morborum a symptomatibus conficiunt, ut plurimum deuios, transuersosque agi; quia idem morbus, eademque ex causa ortus pro aegrotantis, constitutionis, aetatis, vitae generis, et curationis diuersitate plurimum varietatis habet, et diuersa itidem symptomata suscipit: et contra morbos plane diuersos in multis saepe symptomatibus conuenire; atque idcirco, si ob solam symptomatum conuenientiam sub eadem specie, et nomine comprehendantur, confundi morbos omnino

a) Comment. de reb. in med. et scient. nat. gest. Vol. XVIII. P. 3. p. 451.

omnino diuerfos necesse esse *b*). Quas ob causas satius visum est, morbos singularum corporis partium digerere eo prorsus ordine, quem loca ipsa praebent. Quilibet enim earum morbus non modo aegris, verum etiam medicis se ostendit imminuta, aut deprauata, aut deficiente actione, et functione alicujus partis. Si singuli morbi, in quibus actio, et functio illa laeditur, unus post alium explicentur, signaque tradantur, quibus diuersa laesionum genera patefunt, atque haec omnia medentis memoria teneantur, citius, promptius, faciliusque, me quidem iudicari poterit conjicere, quo morbi genere quis laboret; quam si sparsim, et passim morborum species, et differentiae expositae sint, variisque, et diffitis ex locis, siue classibus conquiri debeant. Placuit etiam morbos potius describere, quam definire, quod eorum causae proximae plerumque ignorantur; atque ideo rectius ex phaenomenis, quam ab essentia, ut ZIMMERMANNIVS *a*), LOCKIVS *a**), et NIETCHIVS *b*) judicant, deducuntur. Species et differentias

* 5

perpau-

b) De actione system. nervos. in febr. §. 2. p. 5. n. a. et n. b.

a) ZIMMERM. De l'experience. T. I. p. 296.

*a**) De Intell. human.

b) Pathologia etc.

perpaucas admisimus, ne in idem vitium, quod in aliis damnauimus, incideremus; et vt plurimum eas a causis euidentibus desumimus, quod etiam ab aliis magnae auctoritatis viris probari ^{c)} videmus. Quanquam vero parcissimi fuerimus in constituendis generibus, speciebus, et differentiis, inaudio tamen esse non nullos, male feriatos, laborisque impatientes, qui alta voce, fluentibusque buccis exclamant, artem nostram breuiorem, facilioremque reddendam esse, nec talem effici tot diuisionibus, differentiis, praeceptis, cautionibusque, quibus hae nostrae Institutiones iis abundare videntur; imo discipulos copia, et difficultate rerum a Medicinae studio deterreri, et prope ad desperandum adduci, vix fore vnquam, vt ad ejus acquisitionem perueniant; praeterea, cuncta haec superuacua, et fere inutilia esse, cum sine his complures Medici et honores, et opes, et nominis celebritatem sibi compararint. Sed qui ita obstrepunt, nae faciunt, vt nimis intelligendo nihil intelligant. Diuisiones vtique, et differentias aut nimias, aut mente subtilius confictas, naturisque morborum haud respondentes, nos ipsi rejecimus; idque adeo verum est, vt, si

confe-

c) ZIMMERM. l. c. p. 302.

conferantur cum iis, quas Nosologi quidam habent, facile calumnia appareat. Paucae vero, et necessarias, quales ad clariorem rerum intelligentiam nos non modo posuimus, verum etiam in ipsis aegris demonstrare Tironibus nunquam destitimus, quamdiu in Nosocomio Ticinensi eos ad clinicea instituere nobis incubuit, quis reprobet, quis missas faciat, cum sine his nulla ars, nulla disciplina existere, ac doceri unquam possit? Vltro quidem fatemur, hisce, multisque aliis de causis medicinam et longam esse, et perdifficilem. Atqui fietne facilior, et breuior omiſſis iis, quae cum eadem conserta, et fere connata videntur? Nonne potius manca, mutila, imperfecta, atque inanis? Nempe vnus in reliquis artibus necessarias notiones, diuisiones, subdiuisiones, differentiasque e rerum ipsarum sinu petitas aut praeteriit, aut praeter-eundas unquam duxit. Licet his vti oratoribus, et physicis; licet botanicis; licet chemiae magistris: soline medicinae non liceat? Quid, si non istarum rerum neglectu, non in praeceptorum inopia, et jejuna, quasi dixerim, delibatione consistat Medicinam faciliorem reddendi ratio? Velint, nolint lepidi isti criminatores, nulla alia ratione ex longa breuior, ex difficili facilior,

facilior, ex obscura planior, expeditiorque mendendi scientia euasura est, quam si apto, concinno, perspicuo, commodoque ordine vniuersa exponatur; si de singulis clarae, distinctae, et, quod ajunt, adaequatae notiones praestituantur; si morborum historia quam fieri potest absolutissime tradatur; si hypotheses, commentitiaeque opiniones deuitentur; si dubia, incerta, et controuersa, nisi dilucidari queant, exulare jubeantur, aut a veris, certis, demonstratisque separentur; si facta, et obseruata omnis aevi memorentur; morbi a morbis distinguantur, eorumque species, et differentiae, variique gradus notentur; signa, quibus praesentia cognosci, futura praedici possint, nec generalia tantum, sed peculiaria, et propria cuiusque aegrotationis proferantur; et demum curatio pro differentiarum, causarum, temporum, graduum, locorum, aetatum, sexuum, temperamentorumque ratione accommodatissima omnium perscribatur: quod sine praeceptis, sine exceptionibus, cautelisque multis fieri profecto nequit. Sic difficultates, sic impedimenta, quibus ars implicatur, difficilisque, et longa redditur, utique expediuntur, et propemodum euanescent. Equidem haec omnia praestare

pro

pro viribus studui. Num scopum attigerim, meum non est judicare: judicent vero velim qui aut longa annorum serie multis aegris medicinam fecerint, aut contra ii, qui e scholis egressi primum clinicae manum admouent. Illi facile agnoscent, an naturam vbique secutus sim, et ad lydium experientiae lapidem omnia temperauerim; hi vero perspicient, vtrumquae a nobis proposita, et scripta sunt cum iis, quae in aegrotantibus obseruant, ac deprehendunt, omnino consonent, dubiisque in rebus, atque obscuris aliquid lucis sibi inde affulgeat. Vtrotumque igitur istorum stare malo, quam aliorum iudicio. Reliqui lucubrationes nostras deprimant, abjiciant, arceantque a se, per me licet. Quaeritent, vt solent, Compendia, Enchiridia, Spicilegia, in quibus et summa morborum genera breuibus, contractisque descriptionibus adumbrata, et generales quasdam medendi rationes, per saepe empiricas inueniant; quae legi facile, et addisci vel ab iis possint, qui ad medicinam nequaquam rite instituti sunt, neque ei nomen dedere. Se hinc in medicos leui negotio, et sine multo labore, ac studio erigant; morbos ad pauca capita redactos e prima facie sine haesitatione, et audacter definiant;

niant; de multiplici caussarum varietate nec multum laborent, nec diligenti indagatione adhibita operam perdant; vnā quamcunque, quae primum se se offert, arripiant; hanc morlicus, quam semel statuerint, sustineant; salutem omnibus circulatorum non dissimiles promittant, suis arcanis, et antidotis confisi; verbo experimenta per mortes faciant. Quod si hac facili, et plana artis breuitate fiat, vt in cognoscendis, declarandisque morbis turpiter errauerint, cadauerum sectione eorum errores detegente, aut in vita, et morte praefagienda temere se gesserint, exitu rem non comprobante (quod saepe iis accidere nouimus); animum tamen nequaquam despondeant, pergantque sine verecundia gloriari, se breuiorem, facilioremque medendi disciplinam facere. Nos contenti erimus paucis, solertibus, veri, rectique studiosis lectoribus; quibus scilicet persuasum est, non sine assiduo, et pene improbo labore medicinae scientiam acquiri posse; nec vllibi eam esse, nisi vbi magna animi contentione, summaque industria apud aegros exercetur, et colitur.

INDEX CAPITVM.

PARS PRIMA.

CAP. I.

De dolore capitis. pag. 1

CAP. II.

De Hydrocephalo et spina bifida, siue aqueo spinæ tumore. 33

CAP. III.

De Agrypnia siue Peruigilio. 51

CAP. IV.

De Apoplexia. 56

CAP. V.

De Catalepsi, Ecstasi et Somnambulismo. 124

CAP. VI.

De Sphacelismo cerebri HIPPOCRATIS siue Cephalitide. 143

CAP. VII.

De Delirio variisque ejus generibus. 154

PARS ALTERA.

CAP. VIII.

De nervorum distentione et rigore. 201

CAP. IX.

De Vertigine. 263

CAP. X.

De Ophthalmia aliisque oculorum vitiis. 271

CAP. XI.

De Grauedine, Coryza, et Phlegmatorrhagia. 306

CAP.

INDEX CAPITVM.

CAP. XII.	
<i>De narium Haemorrhagia.</i>	pag. 310
CAP. XIII.	
<i>De Dolore aurium et quibusdam auditus vitijs.</i>	318
CAP. XIV.	
<i>De Odontalgia.</i>	325
CAP. XV.	
<i>De Tumore glandularum parotidum, et maxillarum.</i>	328
CAP. XVI.	
<i>De Glossite. siue linguae inflammatione.</i>	342
CAP. XVII.	
<i>De Angina.</i>	343

CAPVT I.

DE DOLORE CAPITIS.

§. I.

De morbis, qui certas, et potissimum interiores sedes habent, acturus, ut ordine quodam pertractentur, initium faciam a capite, sublimi, ac nobili illa veluti arce, qua mens, ejusque facultates recondi videntur. Et protinus inter vitia, quibus illud obnoxium est, primum se sistit *dolor*, ad sentiendi facultatem proprie spectans. Is generatim non vna ab omnibus ratione definitur; quamquam recte, ut ego arbitror, ii sentire videantur, qui eum *tristem sensationem* existiment, *quam ea ratione mens percipit, ut eam referat ad partem corporis, cui ex causa aliqua siue externa siue interna, vis praeter naturam infertur a)*. Speciatim ergo qui ad caput attinet, definiri poterit molesta, atque insolita quaedam grauitatis, punctiois, distentionis, compressionis, pulsationis, vel similis alius ingratae sensationis totum caput, aut ejus partem afficientis perceptio. Haec autem respondet peculiari cuidam ignotae, et sensibus imperuiae mutationi, quam *sensorio communi* vis aliqua impressit, interdum adeo validae, atque inhaerenti, et fixae, ut post etiam cessantem, aut amotam causam, doloris, quamcunque ipse tenuerit partem, idea, siue imago superesse, atque animo obuersari queat, quod in primis mutilati aliquo membro *b)* experiuntur.

Definitio doloris in genere.

Definitio ejusdem in specie.

a) CALDAN. *Institut. Patholog. Cap. XXI. §. 304.* b) *Id. ibid. §. 306. p. 232. et VAN SWIETEN in Aphor. BOERHAAV. de cogn. et curand. morb. §. 220.*

§. II.

Hinc pro ratione istiusmodi *sensationis* (§. I.) *Differentia dolor capitis vel obtusus, et grauis est, vel lancinans,* ^{ex modo.}

Vol. III. P. I.

A

et

et *pungens*, vel *distrahens*, vel *premens*, vel *pulsans*, vel *dilacerans*, et sic porro. Praeterea si dolor recens fit, aut a causis euidentibus, non tamen nimis violentis fiat, *Κεφαλαλγία* plerisque nominatur; si inveteratus, et pertinacior, *Κεφαλαία*; si vnum duntaxat capitis latus affligat, *ἡμικρανία*; demum *continuus*, vel *periodicus*, prout continenter discruciat, vel statim quibusdam horis, aut temporibus accedit, aut recrudescit, et paribus intervallis desinit, aut se se remittit. Est quoque qui peculiarem locum torquet, spatioque exiguo, quod oui fere magnitudinem adaequet, continetur, et tunc *ouum* a quibusdam appellatur; *clavus* vero, cum nempe intolerabile doloris genus est, et multo minus spatium occupat, acuti veluti clavi alte defixi speciem referens. Ac quoniam hic posterior foeminas frequenter hystericas corripit, ideo *clavus hystericus* vulgo vocatur.

§. III.

At modo interiores, modo exteriores capitis partes dolor afficit; hinc aptissime diuiditur in *interdum*, aut *externum*; quod plurimum interest recte dignoscere. Observatio autem edocuit, non semper ejus causam capiti insidere, sed quandoque aliis diffitis partibus, ex quarum consensione caput laborat. Quare, prout vna, aut altera ratione dolor fit, alia hinc oritur ejus diuisio, videlicet in *idiopathicum*, aut *sympathicum*. Nec desunt qui, praeter hujusmodi differentias, alias atque alias excogitarunt pro originis, causarumque varietate. Hinc non inepte distingui solet in *protopathicum*, siue primum, *deuteropathicum*, siue secundarium, in *symptomaticum*, *febrilem*, *inflammatorium*, *sanguineum*, *biliosum*, *pituitosum*, *rheumaticum*, *catarrhalem*, *arthriticum*, *scorbuticum*, *venereum*, *hypochondriacum*, *hystericum*, *convulsivum*, et demum ET TMULLERO duce in

in *calidum*, et *frigidum*, quamquam plures ex his ad priores illas referri quodammodo possint.

§. IV.

Ad causas, quae proxime dolorem capitis efficiunt, redigitur quidquid partes siue interiores, siue exteriores, sentiendi facultate praeditas vrget, distrahit, diuellit, comprimit, erodit, aut quocumque alio modo irritat, ac laedit. Quo spectant vehementior sanguinis motus, aut nimia copia, aut congestio; exteriorum partium, communium velamentorum, musculorum, aponeurosium, pericranii, aut interiorum, meningum videlicet, et cerebri vasa, et cellularia quandoque spatiosa, atque alia receptacula distendens; serum accumulatum, praesertim acre, aut confertim, et repente effusum, in primis intra membranas, et ventriculos; inflammatio; erysipelas; cachymia scorbutica, venerea, pituitosa, arthritica, rheumatica; acritates herpeticae, scabiosae, variolosae, et alius generis; virus plicae polonicae, praesertim repulsum, aut retentum *); metastases variae; tumores; abscessus; exostoses; tophi; caries; mala cranii ipsius conformatio; dura mater indurata, aut ossea facta; ejusdem processibus innatae osseae squamae, aut verrucae durae, acutae, pungentes; lapilli alicubi concreti; futurarum defectus; spasmi quicunque liberum humorum circuitum impediunt; atque alia hujusmodi, quae cum proxime, tum remote comprimendo eas partes, quae nervis, atque adeo sensu pollent, aut irritando, et conuellendo dolorem excitare multimodis possunt **).

Causae remotiores.

*) Quamquam capilli in Plica polonica maxime vitentur, et in caudas horribiles conferruminantur, non tamen huic morbo inter morbos capitis locus a nobis datur, quia ad morbos totius corporis, et ad peculiare cachexiae ge-

nus spectare nobis videtur. De Plica vero polonica egregie scripserunt multi, sed prae ceteris HERCVLES SAXONIA, *Traët. de Plic.*, DANIEL SENNERTVS, *oper. T. 3. p. 849.* EPHEMERID. N. C. Dec. I. an. 6. p. 190. SAILLANT *mém. historiq. sur la maladie singuliere de la Veuve Melin 1^{re} à la faculté de Méd. de Paris au prima mensis de Février 1776.* Sed in primis eminet Cl. VICAT, scriptor recentissimus, cujus libellus *de la Plique Polonique*, Lausannae editus ann. 1775. apud Franc. Grasset, lectu videtur dignissimus.

**.) *Maximi dolores capitis visi sunt*, inquit illustris HAL-
 LERVS ex fide, atque observationibus complurium medi-
 corum indubiae auctoritatis, *nasci a cortice cerebri inflam-*
mato; a sanguine in cerebro effuso; a fungosa caruncula sub
cranio; a grumo sanguinis corpus striatum, et corpus callo-
sum comprimente; a glandula scirrhusa ad processum falci-
formem; a sanguine in ventriculum anteriorem congesto; a
calculo pinealis glandulae; a scirrho cerebelli; a duro corpo-
re, quod calloso corpori infidebat; a cerebri labe putrida,
aut ichorosa, aut abscessu; a sero in ventriculis stagnante, et
cum corrupto cerebro, aut cum tumore scirrhuso conjuncto;
a stilo in cerebro latente; a verme in cerebello abscondito;
a cerebelli abscessu; a carotidibus ossis, et calculosis; a san-
guine demum unice per frigidum balneum in caput compulso etc.
 Element. Physiolog. T. IV. lib. X. sect. VII. §. XX.

§. V.

Polypi fi-
nium veno-
sorum.

Praecipuae hae sunt causae (§. IV.), quas ca-
 dauorum diligentior anatome pluries inuenit, et hi-
 storiae medicae consignauit. Non pauci tamen ex
 Medicis, qui fama doctrinae inclaruerunt, non dubi-
 tant, quin sanguis in sinibus quoque durae meningis
 in polypos interdum concreseat, circuitui humo-
 rum obicem ponat, per venas reditum retardet, et
 causam doloris praebeat. Quod sane non valde
 a vero abesse videtur, in iis praesertim, in quibus
 vitiata sinuum structura, et laxata praeter naturam
 compages sic sanguinis motum lentescere finit, ut
 fibrosa pars, atque ad concrescendum procliuior
 a reliquis secedat, paullatimque, uti ejus natura fert,
 compingatur. At incertum admodum putauerim,
 ubi

vbi ejusmodi polypi in cadaueribus inueniuntur, an ante mortem in ipsis exstiterint, num vero a morte solum concreuerint. Vbi ante mortem reapse existant, tunc dolorem secundum sinuum longitudinem, et directionem protendi contendunt. A vitis vero malae conformationis, et praesertim a durae matris, ejusque appendicum ossa duritie derivandas non raro contumacissimas quasdam cephalaeas, atque hemicranias periodicas, quae nullis remediis auscultant, suspicatur aequissimus harum rerum judex MORGAGNIUS a).

*Cephalaea
contumax
unde? Item
hemicrania
periodica
persinacior?*

a) De sed. et caus. morb. epist. I. n. II.

§. VI.

Inter causas doloris capitis vermes etiam in cerebro nidulantes recenferi solent. At hujusmodi opinio, ut falsa, rejicitur a Cl. MORGAGNIO a). Non enim eos in cerebro reperiri posse ipse credit, nisi in illud extrinsecus irreperint; neque vermibus, aut Tabaci fumo, ejusque pulveri, ut vulgo opinantur, in cranii caueam ullum patere aditum, nisi ulcere naribus, aut calvariae ossibus exesis via illuc paratur; quod utique rationi valde consentaneum videtur. Attamen postquam quorundam illustrium naturae scrutatorum oculi plus, quam lyncei animalcula viuentia in brutorum cerebro, in hydatidibus, aliisque visceribus detexerunt, prudentis hominis erit hac super re omne iudicium cohibere, donec dies certiora protulerit.

*An vermes
doloris capi-
tis causas?*

a) L. c. n. 9.

§. VII.

Id vnum non inficiamur, saepe narium, frontaliisque sinuum caua, aliaque loca sub cute posita obsideri, incolique a vermibus aut illuc clanculum illapsis, aut ex ovis ibi depositis demum natis, qui rodendo atrocissimum quandoque dolorem pariunt,

*Vermes in
caneis na-
rium, et si-
num fron-
tali.*

quamcunque medelam spernentem, nec prius delit-
 turum plerumque, quam foras prodierint. In id
 prae ceteris incidunt mali genus, qui variis musca-
 rum, praecipue tabanorum, atque asilorum, et for-
 tasse etiam papilionum speciebus obijciuntur, nec
 semper sibi cauere ab eiusmodi hostibus possunt,
 dum sub dio in campis, aut pratis humi prostrati,
 et labore fessi somno occupantur. Nam tunc in
 eorum naribus, aut circa proximas partes ab his ani-
 malculis ova, unde vermiculi deinde excluduntur,
 aut vermes ipsi, nam quaedam viuipara vere sunt,
 deponuntur; aut inspiratione intro adducuntur, ibi-
 que locata atque alta adollescunt. Ova etiam inse-
 ctorum, quae in floribus deposita fuerunt, flores in-
 caute olfaciendo in nares attrahi possunt, ibique ex-
 chudi. Hujusmodi exempla existunt apud FERNE-
 LIVM a), TRINCAVELLIUM b), ROLFINCKIUM c),
 aliosque admirabilium observationum collectores d).
 Imo quandoque euenit, vt lumbrici ipsi sursum
 repentes, in caua narium perueniant, ibique con-
 sistant *), doloremque capitis procreant.

a) Patholog. l. V. cap. 7. b) l. 9. cap. IV. c) De dolore
 caput. d) Videatur in primis IOHAN. AUGUST. WOHL-
 FARTI Observatio de vermibus per nares excretis, Hal. Mag-
 deb. edita ann. 1768., in qua non solum vermes ab eo visi,
 sed ab aliis etiam notati referuntur. Ipse enim vermes ex
 sinistra cauea narium senis septem et sexaginta annorum per
 ostiduum pertinaci cephalaea, et dexteri capitis lateris tumo-
 re excruciat, praegressa narium per triduum continuans
 haemorrhagia, excretos narrat. Prodierunt vero cum leua-
 mine aegri vermes hujusmodi ad duodeviginti, albidii omnes,
 qui vase vitreo terram continente inclusi, paucis diebus inter-
 jectis in erucas subnigras, et duras mutari, integro mense ela-
 pso, muscas dederunt oculis subruis, antennis filiformibus.
 Vermes corpus habebant undecies intersectum, in capite quatuor
 binos, anguliformes, nigros, duros, mobiles, quibus dum in-
 ter rependum posteriorem corporis partem attrahere contem-
 dunt, caput firman, eosque alias ita retrahunt, vt plane la-
 teant. Ultimae intersectioni depressio inerat cum duobus stig-
 matibus,

matibus, totoque corpore pilis nigris, breuibus, et sparsis scabebant. Auctor autem in sene hoc genitos esse existimat, quod muco de naso dormientis forte propendenti imposueris sua ouula musca quaedam, quae una cum muco retracta, inque finibus frontilibus foras vermes excluderint. Comment. de reb. in scient. nat. et medic. gest. V. XVII. p. 159. et seqq. Non absimilem obseruationem habet cel. RAZOU, quae legi potest in ejus *Tabulis nosologicis* p. 265. gallica lingua euulgatis. In *commentariis* etiam medicis, et philosophicis *societatis medicae Edimburgensis* T. 2. P. 3. p. 65. 66. edit. *Vener.* vermes scolopendris similes, sesquipollicem longi e naribus excreti ex fide Cl. HILLII, et MONROI referuntur. Ante aliquot annos GELMETTIVS, Medicus Mantuanus longe praestantissimus, qui clinicen in nosocomio Ticinensi me duce, dum ibi eam profitebar, excoluerat, historiam cephalalgiae intolerabilis per tres vermiculos excretos tandem domitae mecum communicauit. Hi autem vermiculi, non e narium cauo prodierunt, sed ex tuberculo, quod ad apicem nasi paullatim extrorsum proruperat. Frontem primum dolor torserat, deinde ad radicem nasi descenderat, atque tandem oborto ad apicem ejus, vt dixi, tuberculo, erumpentibusque vermiculis penitus euauit. Quos cum in vas vitreum demisisset, seruassetque dies aliquos, vt metamorphosin, vt putabar, subirent, magno cum animi oblectamento, vtpote historiae naturalis studiosissimus, eos in muscas quasdam nigras e majorem genere, quales equos insectari solent, transformari vidit.

*) Exstat apud THOMAM BARTHOLINVM epistola I. LANGELOTTI, in qua describitur sequens obseruatio: *Foemina rustica cum per multum tempus diros sensisset capitis dolores, tandemque ii adeo increuissent, vt instar maniacae hinc inde discurreret, venit ad pastorem pagi Neukirchen, famosum tunc inter rusticos medicinae practicum, qui non ita pridem e viuis excessit, magnis clamoribus opem implorans. Is statim consuetum sibi in cephalalgis ptarmicum miserculae adhibuit; quo capus vehementer concussus una infaustum hospitum loco mouit, eque naribus exire compulsi; quo facto immanis capitis dolor statim conquieuit. Hospes autem iste erat vermis digiti medii longitudine. Epist. medicinal. cent. II. epist. LXXIV.*

De vehementi hemicrania fere per annum continua cum spastica palpebrae contractione, a verme in sinu frontali hospitante orta, quae illico post eum egressum cessauit, mentionem facit SALTZMANNVS. *De verm. e narib. ex-*

caso §. 5. Similem casum auditor olim meus, nunc clinicus in patria felicissimus, DAVID BUZZIVS ad me perscripsit. Laborabat vehementissima hemicrania rusticus quidam, cui, cum multa incassum adhibuisset, excreto demum lumbrico terete e naribus, mox rediit perfecta sanitas.

§. VIII.

Causae remotiores.

Haecenus de his obscurioribus causis satis. Restat, ut eas, quae remotiores sunt, et magis apertae, breuiter enumeremus. Tales vniuersim censentur suppressae sanguinis consuetae euacuationes; intermissa venae sectio in iis, qui ei assueuerint; ulcera incaute exsiccata; grauiditas; liquorum fermentorum abusus; insolatio; calor; frigus; ventus; austrinae constitutiones; repletio; cruditates primarum viarum; lenta, et difficilis ciborum digestio; lumbrici, aliaeque vermium species ventriculum, aut intestina obsidentes; hypochondriaca, atque hysterica affectio; odores acuti, et graues; nimia neruorum, ut vocant, sensibilitas *); vectio celeris per strata inaequalia viarum; ictus; casus; contusiones, et alia huiusmodi.

*) Hanc causam jam cognouerat BALLONIVS. Nam in 2. *epidem. p.* 162., ut habet BONETVS in sua epitome, *capitis*, inquit, *dolores quidam oriuntur ex acuitate sensus, quemadmodum quidam facile syncopisunt, et resolvuntur ob acutiem sensus.*

D i a g n o s i s.

§. IX.

Signa doloris externi.

Externas affici partes cognoscimus, si capilli quasi rigent, et dolor solo eorum tactu, aut cutis compressione extrinsecus facta intenditur; si rubor, aut tumor aliquis oculis pateat, functionibus interim cerebri nihil, aut parum omnino laesis. Contra ejus sedem intra caluariam esse indicant contrariae notae: in primis tunc, cum dolore mens stupet, oculi

Interni.

oculi caligant, aures tinniunt, aut grauius audiunt; aut strepitum quemque molestius ferunt; imo, si GALENO credimus, dolor ad oculorum vsque radices porrigitur. Vox etiam subinde sine vlla alia causa intercipitur; deglutiendi facultas laborat; muscoli ceruicis, et mandibulas adducentes contrahuntur, et dolent; membra contremiscunt; caput crebra vertigine tentatur, et, si vehementior morbus est, vomitus, aut vomendi conatus, et delirium tandem accedunt. Interdum tanta est interiorum partium noxa, vt ad retinam, et tunicam choroideam propagetur, oculi lucis impatientissimi fiant, doleantque acriter, aut rubore suffusi tumeant *), atque illacryment.

*) Interdum oculi ita inflammantur, et tument ex hac causa, vt ophthalmiam, et quidem vti primariam repraesentent, quod sequens historia comprobabit. Virgo annorum XXV., quae prope Diui Francisci fanum habitabat Faentiae, mense Nouembri an. 1752. dolore acutissimo totam sinistram capitis partem affligente correpta fuit, eoque quindecim ferme continuos dies vehementer ingemuit, quin medicam opem imploraret. Tandem cum ophthalmia oculus sinister rubere, et tumere inceperet, nec quiete, et patientia quidquam malum remitteret, imo intra paucos dies ita increuisset, vt vniuersa exterior palpebrarum, et vicinarum partium facies in ingentem tumorem rubrum, et dolentem attolleretur; auxilium tunc primum quaesitum est. Gena praeterea tota intumuerat, et rubore roseo, qui digitis compressus albicaret, vndique suffundebatur. Phlegmonen erysipelatodem dixisset. Febris aderat valida admodum, et summa iactatio, atque anxietas. Palpebrae autem ob tumorem, inflammationemque ita claudebantur, vt oculi bulbus nec detegi, nec inspicere villo modo posset. Protinus ea curatio adhibita, quae magnis inflammationibus conuenit, extrinsecusque mitissima emollientia imposita sunt. Post aliquot tamen dies phlegmonen suppuratio excepit, et rupto sponte ad angulum oculi externum abscessu magna scaturit vis puris foetentissimi, quod non modo ex cauo orbitae, et ex circumpositis oculo locis, verum etiam ex potiore genae parte, quando comprimebantur, vbertim effundebatur. Hinc breui deturnauerunt

palpebrae, et proximae partes, ut oculus detegi, atque inspicere potuerit. Tunc tota adnata oculi membrana ruberrima, et tumidissima apparuit, ut corneae planum, veluti in Chemosi, superaret. Cornea nihilominus nitida, et pellucida videbatur. At pupilla iusto amplior erat, ut in mydriasi, et orationis videndi facultas in eo oculo perierat. Quarto a rupto abscessu die accessit vehemens, vniuersalisque nervorum distentio, quae paullo post in resolutionem desiit, siue paralyin omnium membrorum cum sensuum omnium abolitione, respiratione languida, inaequali, et stertorosa, pulsu exiguo, intermittente, ac deficiente, et sic intra brevissimum tempus diem obiit extremum. Hora post mortem vigesima quarta capitis anatomé inita est. Tota adiposa, et cellularis tela, quae sub cute ad palpebras, orbitam, et genam spectat, usque ad mandibulam inferiorem corrupta, ac destructa erat, et ejus loco spatium, quod inter oculi bulbum, musculosque ejus, et orbitae ipsius fundum interiacet, pure vero, et foetidissimo plenum. Oculus solus illaesus videbatur, itemque contenti in eo humores. Cornea vero lucida nitorem, pelluciditatemque non nihil amiserat. Resecto cranio, lobus anterior, et sinister cerebri usque ad ventriculum ejusdem lateris suppuratione magnam partem absortus cernebatur. Suppuratio autem totum nervum opticum circumibat, quin tamen ipse nec extrinsecus, nec intrinsecus manifesto labem ostenderet; communicabatque extrorsum cum orbitae cavo. Dissectioni, uti morbo interfuerunt PETRVS PAVLLVS DALLARMIUS, et LAURENTIVS BENEDICTVS, qui tunc clinices tyrocinium obibant.

§. X.

*Quomodo
externae et-
iam partes
consensiant.*

*Signa dolo-
ris altius
siti.*

Non modo ad oculos, verum etiam ad alia exteriora loca protenditur interdum dolor, quamquam interiores sedes teneat; eo quod *dura meninx*, quando ipsa potissimam doloris causam continet, et si sensu carere videatur, per pericranium, et vasa sanguifera cum exterioribus partibus connexionem habet; aut quod nervorum adminiculo exteriores quoque in consensum trahuntur. Si profundior doloris sensus percipitur, cerebrum, et in primis ejus medullam altius affici, vexarique, plerumque significat;

ficat; neque absurdum est, tunc *piam matrem*, quae laterales, et reliquos cerebri ventriculos, ejusque basin subtendit, maxime laborare a), dummodo doloris sedes non ipsa, sed alba, et medullaris cerebri pars ab illa pressa, distracta, aut aliter irritata intelligatur. Neque hinc mirum erit, si tum ad verticem quoque dolor excurrat, quia cerebrum quaque-versum distentum ad verticem adprimi etiam potest, aut *pia mater*, quae illuc protenditur, eo scilicet loco sentientem cerebri medullam laedit, ut ibi quoque non absimilis molestiae sensus cieatur.

*Sedes doloris
in medulla
cerebri.*

a) MORGAGN. l. c. *Epist. I. n. 7.*

§. XI.

Sed singulas etiam causas, a quibus dolor est, internoscere oportet. Itaque signa cujusque propria, quoad fieri potest, diligentissime nunc tradam. Ac primum a sanguine fieri cephalalgiam ostendunt plethora; venarum, arteriarumque tumor; pulsus magnus, plenus, vehemens, aut quandoque suppressus; calor, et feruor circa frontem; pulsatio temporum; aurium tinnitus; lucis auersatio; faciei, aut oculorum rubor; temperamentum sanguineum; aetas juvenilis; haemorrhagiae a); et causae, quae sanguinis copiam auxerint, aut motum impetumque ejus ad caput allegerint, et concitarint *).

*Singularum
causarum
notae.*

*Sanguinei
doloris signa.*

a) VANDERMOND. *Recueil d' observations: etc. T. 8. p. 275.*

*) Non hic de eo dolore, qui inflammationis comes est, verba facimus. Inflammatorii enim opportunius meminerimus, ejusque peculiaria signa afferemus, ubi de cephalitide, et phrenitide differendum erit.

§. XII.

Qui a seroso humore, aut a pituita proficiscitur dolor, plerumque in eos cadit, qui in temperamento phleg-

*Signa serosi,
et pituitosi.*

phlogmatico, habitu corporis cachectico, et decore, aetate senili, aut puerili donantur; eum vero antecesserunt caussae, quae aquei, et pituitosi humoris illuviem inferunt. Pallet facies, et tumet; venae subsidunt; membra flavescent, et frigent; abest calor, et pulsatio; acri in somnum propendunt, et jam antea torpore, vertigine, hebetudine, et sopore plerumque laborarunt. Sed potissimum catarrhus, quo membrana pituitaria, aliaeque partes afficiuntur, adesse consuevit.

§. XIII.

Dolor quando acutus, quando obtusus esse possit.

DOLAEVS cum huiusmodi dolore (§. XII.) coniungi docet grauitatis, siue ponderis sensum, mentis segnitiam, ac stuporem: contra, si a bilioso humore gignatur, acutum valde esse, imo lancinantem, insignique calore stipatum. Ad DOLAEVM quodam modo accedit Cl. MORGAGNIUS ^{a)}, ubi doloris cum acuti, tum obtusi causam inquirat. Nam etsi paullo aliter rem ipse explicet, cum eo tamen consentit, dum putat, si in latere, quod dolor occupat, ventriculus aqua pura, atque insipida repleatur, dolorem obtusorem existere, licet plena sint omnia: si vero impura, acri, aut salsa turgeat, acutum. Plenitudo quippe sola non videtur doctissimo viro semper sufficere ad dolorem acutum excitandum, nisi simul plenitudini acritas humoris adjungatur, aut plenitudo ea sit, quae repente facta partes vehementer, et continuo diuellat, dilaceretque. Quare vero saltem simillimum erit, acutum, pungentemque dolorem, cuicunque parti infederit, fere ab acri, mordacique humore; grauem vero, atque obtusum ab aqueo quidem, aut viscido, sed insipido procreari.

^{a)} L. c.

§. XIV.

Signa dolo-

Vermes, atque insecta animalcula (§§. VI. VII.) subesse

subesse suspicabimur, si dolor fixus, et pernix, quae ^{ris a ver-} radix nasi fronti adnectitur, aut quae alteruter sinuum ^{mibus.} frontalis situs est, maneat; nullique remedio cedat; si frequens sternutamentum corripiat; si nares arescant, aut alterutra tantum plus iusto humectetur; si pruriant; si foetidus inde, aut ex ore odor exhalet, et vertigo subinde a) recurrat. Signum vero magis proprium, et ferme peculiare doloris ab hac causa illud saepe est, quod cum respirationis, et bestiolae se se intus mouentis sensu coniungi consuevit.

a) VOGEL. *Acad. Praelect. de cogn. et curand. morb.* §. 420.

§. XV.

Sympathicum capitis dolorem efficiunt vitia ^{Signa dolo-} aliarum partium. Saepissime is a ventriculo origi- ^{ris sympa-} nem ducit, vel etiam ab utero. Qui a ventriculo fit, ^{thici.} anteriorem capitis partem magis occupat, plerumque a cruditatibus, aut a pasto, aut a crapula aggreditur, eumque nausea; oris amarities; vomitus materiae viscidae, acris, acidae, aut biliosae; dolores ventriculi, aut intestinorum; flatus; ructus, aliaeque cacoehyliae in primis viis existentis notae comitantur. Quibus caput ex huiusmodi causa dolet, ii vomitu, quem dixi, aut alui fluxu lenari solent: id quod minime idiopathice laborantibus solatio est. Ieiunos ut plurimum affligit; sed in his ab assumpto cibo sedatur, aut etiam ex toto euanescent, ablata nimirum per cibum spastica ventriculi affectione, aut temperato acri, irritantique ejus fomite. Lumbricos vero, aliaeque vermium genera, a quibus dolor capitis sympathicus non raro profluit, in intestinis latitare intelliges ex eorundem propriis signis, alibi a nobis *) recensendis.

*) Vid. *Volumen de morb. imi ventris cap. de vermibus.*

§. XVI.

§. XVI.

*Signa doloris
ab utero.*

Qui ab utero dolor capiti obuenit, verticem, occiputque magis diuexat, et sensum veluti frigoris ibidem parit a). Plerumque suppressis catameniiis, aut difficulter fluentibus, maloque hysterico superuenit. Vixque ab eo differt, qui ab affectis imi ventris visceribus, vel ab atra bile, vel a nimia nervorum sensibilitate aut ataxia dimanans hypochondriacos, sensibilioresque homines infestat. Cum hujusmodi dolore concurrunt ut plurimum spasticae aliarum partium affectiones, et speciatim extremorum, inferiorumque artuum frigus. Ferèque perpetuum in eo est, ab exteriori compressione mitescere, nervorum videlicet per eam sensu vel coercito, vel plane intercepto.

a) BAGLIV. *Prax. med. l. I. de dolore in gener. p. 65.*

§. XVII.

Signa hemicraniae, oui, et clavi hysterici.

Saepe huc (§§. XV. XVI.) spectare videntur *Hemicrania, Ouum, et Clavius hystericus*. Hemicranicus autem dolor plerumque periodice accedit, deceditque, uti febris quotidiana, tertianaue intermittens. Hinc non nulli febrem laruatam, aut topicam intermittentem vocant. Ad solis ortum plerumque incipit, vehementius desaeuit ad meridiem, sole vero declinante remittitur, et desinit. Idcirco *morbus etiam solaris* a quibusdam nuncupatur. Interdum vespertinis, aut nocturnis horis suos circuitus obit; sed hoc quidem rarius contingit. Rarissimum casum vidit PETRVS SALIVS DIVERSVS, Medicus Faentinus sui temporis celeberrimus, hemicraniam nempe quouis octavo die periodice revertentem, eamque curavit in sacerdote quodam e Diui Dominici familia, qui ea per tres annos continuas, et menses septem atrociter excruciatu a) fuerat. Octanae febris intermittenti diuturnae, cujus alibi

alibi b) mentionem fecimus, quam simillimam diceret. Quandoque tamen *hemicraniam* arthritica labes, aut sanguinea sinuum frontaliū congestio gignit; sed tunc non adeo manifestos, et constantes circuitus habet, et praeterea eorum morborum indicia non deficiunt. Sic quoque *symptomaticum*, aut *secundarium* capitis dolorem, ut *inflammatorium*, *febrilem*, *scorbuticum*, *venereum* a reliquis distinguere non erit arduum, si in primarii affectus, e quo veluti ex sua radice germinat, praesentiam sedulo inquisiveris, et per sua signa detexeris.

a) Annotation. in lib. ALTOMARI cap. XII. p. 394. vbi Cl. Auctor rem ita narrat: *Religiosus vir per tres annos continuos, et menses septem passus est hemicraniam in parte capitis dextera una cum ingenti, et acuto dolore circa temporalem musculum, quae unoquoque die Lunae dicato semper eadem ferme hora inuadebat. Exacerbatio ad viginti octo, aut triginta horas ad summum perseverabat, quo tempore nec lumen adspicere, nec strepitum audire sine manifesta laesione, nec etiam cibum assumere, aut gustare poterat. Hoc tempore elapso, sanissimus erat, omniaque munia tam naturalia, quam animalia feliciter obibat.* b) Volum. I. §. LXV.

§. XVIII.

Multo difficilius plane est cognitu, quando istiusmodi dolor a vitio aliquo organico (§§. IV. V.) proficiscatur. Diuturnitas tamen morbi, nihil proficientibus artis auxiliis, cum signis (§§. IX. X.), atque absentia eorum, quae a §. VIII. et XI. ad XVI. usque proposuimus, valde probabilem de eo conjecturam reddit. Cystidem pure plenam oui columbini magnitudine, inuolucro satis firmo, et crasso cinctam in dextero cerebri lobo sub osse parietali, qua ossi temporum adnectitur, sitam deprehendi in robustissimo viro, quem eo in loco dolor atrocissimus, subinde adeo ingrauescens, ut conuulsivis motibus, et tremoribus totius corporis, praesertim e latere ad-

*Quomodo
distinguitur
dolor a vi-
tiis organi-
cis generis.*

*Historiae
abscessuum
cerebri, et
cerebelli.*

verso

verso agigaretur, atque humi ferme concideret, menses aliquot miserrime confecerat, quin ab adhibitis valentioribus medicinae praesidiis quidquam leniretur *). Tumorem rubentem, steatomati similem, ejusdem ferme magnitudinis, in dextero anteriori cerebri loco sub cortice ipso locatum gerebat senex quidam cifiarius, quem diuturna febris crebro recidiua cum capitis dolore fere perpetuo ad verticem, et paralyfi lateris oppositi, et motibus conuulsivis ad quaedam intervalla inordinate recurrentibus, non sine vlcerosa pulmonum labe, post quatuor mensium lapsum, tandem exstinxit. Mulier consistentis aetatis post scabiem temere retropulsam incidit in cephalaeam incertae propemodum sedis, qua aliquot menses, vix interdum febricitans, ita conflictata est, vt saepe ob doloris tormentum toto corpore contremisceret, ejularet, et fere nunquam somnum capere posset, pulsibus variis, parvis, contractis, et inaequalibus, raro frequentibus. Tandem morbo consumpta obiit. Dissecto ejus cadauere inventus est in medullari posterioris cerebri lobi parte prope tentorium abscessus, pure plenus, in cujus cauo capi nux major cum suo cortice potuisset. Tumorem in calloso corpore durum, ex albido rubentem JOH. FANTONO a) exhibuit sectio cadaueris viri cujusdam prouectae aetatis, qui plurium annorum spatio cephalaea, postremis mensibus acerbissima laborauerat. Is cum de loco affecto rogaretur, verticem capitis indicabat. Epilepsia quoque corripit subinde, et de maxima salivae acritate, atque importuna fame conqueri solebat. Quando vehementius dolore isto angebatur, absurda plerumque effutiebat. Tandem profundo somno obrutus, simulque conuulsus interiit. Neque in historia hujus aegroti vlla de febre mentio facta est.

*Observatio
Fantoni.*

*) Non valde differt ab hac observatione illa, quam memorat

morat LANCISIVS, *De subitan. mortib. l. 1. cap. XI §. XI.*
pag. 65.

a) *Epist. de observat. med. et anat. ad Cl. RANGETVM,*
epist. V.

§. XIX.

Dexterum cerebelli lobum abscessu magnam par- *Observatio*
tem corruptum vidit cel. JANVS PLANCVS Arimi- *L. Planci.*
nensis in nobili puero, qui a suppressio puris ex au-
re ejusdem lateris fluxu, cui a primis usque annis
obnoxius fuit, inciderat in acerrimam cephalalgiam
tum febre continua acuta, ex qua intra brevis tem-
poris spatium mortem oppetiit a). Febris pluries
intra diem exacerbabatur, et horrida erat, sic ut
hemitritaeo similis videretur. Accedebat subinde
aphonia, et trismus, sed breui redibat loquendi po-
testas. Tandem paralyti non oppositi, ut moris
est, sed ejusdem lateris correptus, sensibusque or-
batus fato cessit *). Memoria quoque digna sunt,
quae DOUGLASSIVS b) habet de homine, qui ex *Douglassi.*
cerebelli abscessu decumbebat; nam dolorem, et
pondus in anteriore capitis parte accusabat. San-
guinis missio, purgatio, vlcerata cantharidibus cer-
vix nihil profuerant. Cogebatur residere capite
antrorsum inclinato; quia dolor contrario positu
inualefcebat atrocius. Is quoque febre, quod mi-
rum maxime est, prorsus carebat, neque vllis con-
vellebatur spasticis affectionibus. Verum fere per-
petuo nauseabat, et vix vnquam somno recreaba-
tur. Praeterea cum oculos celerius convertere
vellet, dolorem duplo intensiorem illico experieba-
tur. Tres menses ita excrutiabatur. Denique quo-
dam vespere dolor repente evanuit, ut et coenare,
et dormire nocte insequente placide potuerit. At
mane postero ex syncope subitanea obiit, quin vlla
alterutrius lateris convulsio, aut paralyti antecessis-
set. In medio cerebelli repertus est abscessus, qui

duas uncias puris albi continebat. Aderat quoque sanguinis effusi non parua vis, qui ex rupto sinu laterali sinistro manauerat, qui que fortasse tam inexpectatum malo finem imposuit. Ex symptomatis in huiusmodi aegris supra (§§. XVIII. XIX.) observatis plurimum lucis affulgebit attentiori, diligentiorique Clinico, ut conjecturam cum veri non exigua similitudine similibus in casibus faciat. Abditiora vero vitia malae conformationis, et structurae a naturali statu abluventibus singillatim praenosceret humanae mentis. pene limites excedit. Attamen qui historias plerarumque causarum, quae ad hoc genus (§§. IV. V.) spectant, expendere cupierit, ut inde aliquid adjuamenti ad diagnosin rite instituentem sibi hauriat, is consulat, BONETVM c), FANTONVM d), MORGAGNIUM e), LIEVTAUDIVM f), aliosque ejusmodi observationum collectores, sed in primis Diaria medica, et Academiarum acta, et commentarios g).

a) *Storia medica d'una Postema del lobo destro del cervello ec.*

*) Non absimilis historia legitur in *Comment. Med. et Philosoph. Societ. med. Edimburg. Vol. 2. P. 2. p. 54. edit. Venet.* de viro quodam sex et triginta annos nato, quam hic repetere non puto alienum. Huic a puero ex aure dextera puris aliquid identidem effluere consueverat: at non inde valde molestabatur. Auditum tantummodo ejus auris aliquot ante annis amiserat. Demum eadem auris dolore atroci corripitur, qui breui non solum ad caput diffundebatur, verum etiam nauseam mouebat cum oris ventriculi morfu conjunctam. Die decima in somnum, stuporisque speciem aegrotus prolabitur; atque inter dormiendum vana obloquitur. Die undecima omnino delirat, garrit, et febricitat. Die duodecima delirium, et sopor alternatim sibi succedunt; alius resoluitur; vesperi caroticus fit. Nocte membra identidem conuelluntur: tendines crebro subsiliunt. Cuncta haec diebus XIII. XIV. XV. ingrauescunt. Conuulsui motus frequentiores; delirium apertius; arteriarum micatus amplius centum intra minutum;

tum; urinae stranguriosae; pupilla immobilis, et dilatata, quae ne viuidioris quidem lucis appulsu contrahitur. Die XVI. vera anaesthesia. Praeter crebros motus convulsivos, et tendinum subsultus spiritus difficilis est; pulsus maxime varius, sed plerumque frequentissimus. Vesica urina turget. Die XVII. prima luce stertens, et anhelans diem obiit postremum. Resecta caluaria deprehensus est medius posterior lobus dexteri hemisphaerii arcte duorum circiter digitorum latitudine adhaerens durae matri, qua os petrosum spectat, et tentorio ipsi cerebello super extenso. Subter in ipsa cerebri substantia abscessus inuentus est, qui duas prope uncias puris foetidissimi, et virentis includebat, et cerebrum ipsum arroserat. Corporis striati sinistri summa facies inflammata visa est. Ambo etiam thalami nervorum opticorum rubro, et fusco colore tingeantur. Infra, et posterius inerat puris aliquid subviridis. Septum lucidum, fornix, et latera tertii ventriculi, processusque anterior cerebelli, qui supra valvulam VIEUSSENII locatur, laxius quam solent, cohaerebant, viuebant, et teterrimum expirabant odorem. In ventriculis lympa limpida ad duo exigua cochlearia reperta est. Dura mater, qua os petrosum subcingit, nigrificabat. Os ipsum petrosum non nihil obscurius apparebat, quam sinistrum, sed nequaquam erat cariosum. Meatus auris dexteræ replebatur pure fusco, subviridi, et foetido, quo pariter scatebat tota cauea tympani, cujus et membrana, et ossicula penitus destructa jam pridem fuisse videbantur.

b) *Essais de Médecine d'Edimburg. T. VI. p. 174.* c) *Sepulchrét. Anatom. lib. I. sect. I. de dolore capitis.* d) *Observ. anat. III. VI. IX. XXV. Item Epist. ad MANGET. V. VIII. n. 3. 6.* e) *De sed. et caus. morb. epist. I. atque alibi; loca videbis in tertio illius operis indice ad v. cerebrum.* f) *Histor. anatom.* g) *Nempe Transact. Anglican. Hist. et Mém. de l'Acad. des Scienc. de Paris, Journal de Médecine de M. VANDERMONDE, Giornale Medico di Venezia, Nouvelle Letterar. del LAMI, Avviso sulla salute umana del Sig. D. LVIGI TARGIONI, Raccolta d'Opuscoli medico-pratici, e fisico-medici DELLO STESSO, Giornale Medico di Firenze, Magazzino toscano del Sig. MANETTI, Comment. de reb. in med. et scient. natur. gestis, Lips. etc.*

palpebrae, et proximae partes, vt oculus detegi, atque inspicere potuerit. Tunc tota adnata oculi membrana ruberrima, et tumidissima apparuit, vt corneae planum, veluti in Chemosi, superaret. Cornea nihilominus nitida, et pellicula videbatur. At pupilla iusto amplior erat, vt in mydriasi, et oris videndi facultas in eo oculo perierat. Quarto a rupto abscessu die accessit vehemens, vniuersalisque neruorum distentio, quae paullo post in resolutionem desit, siue paralyin omnium membrorum cum sensuum omnium abolitione, respiratione languida, inaequali, et stertorosa, pulsu exiguo, intermittente, ac deficiente, et sic intra breuissimum tempus diem obiit extremum. Hora post mortem vigesima quarta capitis anatome inita est. Tota adiposa, et cellularis tela, quae sub cute ad palpebras, orbitam, et genam spectat, vsque ad mandibulam inferiorem corrupta, ac destructa erat, et ejus loco spatium, quod inter oculi bulbum, musculosque ejus, et orbitae ipsius fundum interiacet, pure vero, et foetidissimo plenum. Oculus solus illaesus videbatur, itemque contenti in eo humores. Cornea vero lucida nitorem, pelluciditatemque non nihil amiserat. Resecto cranio, lobus anterior, et sinister cerebri vsque ad ventriculum ejusdem lateris suppuratione magnam partem absumtus cernebatur. Suppuratio autem totum neruum opticum circumibat, quin tamen ipse nec extrinsecus, nec intrinsecus manifesto labem ostenderet; communicabatque extrorsum cum orbitae cauo. Dissectioni, vti morbo interfuerunt PETRVS PAVLLVS DALLARMIVS, et LAURENTIVS BENEDICTVS, qui tunc clinices tyrocinium obibant.

§. X.

*Quomodo
externae et-
iam partes
consentiant.*

Non modo ad oculos, verum etiam ad alia exteriora loca protenditur interdum dolor, quamquam interiores sedes teneat; eo quod *dura meninx*, quando ipsa potissimam doloris causam continet, cum sensu carere videatur, per pericranium, et per os guifera cum exterioribus partibus communicat, aut quod nerui

*Signa doloris
altri-
us.*

que in consensu
ris sensu
modum

ficat; neque absurdum est, tunc *piam matrem*, quae laterales, et reliquos cerebri ventriculos, ejusque basin subtendit, maxime laborare *a)*, dummodo doloris sedes non ipsa, sed alba, et medullaris cerebri *Sedes doloris in medulla cerebri.* pars ab illa pressa, distracta, aut aliter irritata intelligatur. Neque hinc mirum erit, si tum ad verticem quoque dolor excurrat, quia cerebrum quaquaversum distentum ad verticem adprimi etiam potest, aut *pia mater*, quae illuc protenditur, eo scilicet loco sentientem cerebri medullam laedit, ut ibi quoque non absimilis molestiae sensus cieatur.

a) MORGAGN. l. c. *Epist. I. n. 7.*

§. XI.

Sed singulas etiam causas, a quibus dolor est, internoscere oportet. Itaque signa cujusque propria, quoad fieri potest, diligentissime nunc tradam. *Singularum causarum notae.*

Ac primum a sanguine fieri cephalalgiam ostendunt plethora; venarum, arteriarumque tumor; pulsus magnus, plenus, vehemens, aut quandoque suppressus; calor, et feruor circa frontem; pulsatio temporum; aurium tinnitus; lucis auersatio; faciei, aut oculorum rubor; temperamentum sanguineum; aetas juvenilis; haemorrhagiae *a)*; et causas, quae sanguinis copiam auxerint, aut motum impetumque ejus ad caput allexerint, et concitarint *b)*. *Sanguinis doloris signa.*

a) VANDERMOND. *Recueil d'observations etc. T. 3. p. 275.*

b) Non hic de eo dolore, qui

visus comes est,
atque intermi-
tti de cepha-

et proficitur
temperamentum
phl...

phlegmatico, habitu corporis cachectico, et decore, aetate senili, aut puerili donantur; eum vero antecefferunt caussae, quae aquei, et pituitosi humoris illuviem inferunt. Pallet facies, et tumet; venae subsidunt; membra flavescent, et frigent; abest calor, et pulsatio; acri in somnum propendunt, et jam antea torpore, vertigine, hebetudine, et sopore plerumque laborarunt. Sed potissimum catarrhus, quo membrana pituitaria, aliaeque partes afficiuntur, adesse consuevit.

§. XIII.

Dolor quando acutus, quando obtusus esse possit.

DOLAEVS cum hujusmodi dolore (§. XII.) conjungi docet grauitatis, siue ponderis sensum, mentis segnitiam, ac stuporem: contra, si a bilioso humore gignatur, acutum valde esse, imo lancinantem, insignique calore stipatum. Ad DOLAEVM quodam modo accedit Cl. MORGAGNIUS ^{a)}, ubi doloris cum acuti, tum obtusi causam inquirat. Nam etsi paullo aliter rem ipse explicet, cum eo tamen consentit, dum putat, si in latere, quod dolor occupat, ventriculus aqua pura, atque insipida repleatur, dolorem obtusorem existere, licet plena sint omnia: si vero impura, acri, aut salsa turgeat, acutum. Plenitudo quippe sola non videtur doctissimo viro semper sufficere ad dolorem acutum excitandum, nisi simul plenitudini acritas humoris adjungatur, aut plenitudo ea sit, quae repente facta partes vehementer, et continuo diuellat, dilaceretque. Quare vero saltem simillimum erit, acutum, pungentemque dolorem, cuicunque parti infederit, fere ab acri, mordacique humore; grauem vero, atque obtusum ab aqueo quidem, aut viscido, sed insipido procreari.

^{a)} L. c.

§. XIV.

Signa dolo-

Vermes, atque insecta animalcula (§§. VI. VII.) subesse

subesse suspicabimur, si dolor fixus, et peruiçax, qua
radix nasi fronti adnectitur, aut qua alteruter sinuum
frontalium situs est, maneat; nullique remedio ce-
dat; si frequens sternutamentum corripit; si na-
res arefcant, aut alterutra tantum plus iusto hume-
fcetur; si pruriant; si foetidus inde, aut ex ore odor
exhalet, et vertigo subinde a) recurrat. Signum
vero magis proprium, et ferme peculiare doloris
ab hac caussa illud saepe est, quod cum rosionis,
et bestiolae se se intus mouentis sensu conjungi
consequitur.

ris a ver-
mibus.

a) VOGEL. *Acad. Praelect. de cogn. et curand. morb.*
§. 420.

§. XV.

Sympathicum capitis dolorem efficiunt vitia
aliarum partium. Saepissime is a ventriculo origi-
nem ducit, vel etiam ab vtero. Qui a ventriculo fit,
anteriorcm capitis partem magis occupat, plerum-
que a cruditatibus, aut a pastu, aut a crapula aggre-
ditur, eumque nausea; oris amarities; vomitus
materiae viscidae, acris, acidae, aut biliosae; dolores
ventriculi, aut intestinorum; flatus; ructus, aliae-
que cacochyliae in primis viis existentis notae co-
mitantur. Quibus caput ex huiusmodi caussa do-
let, ii vomitu, quem dixi, aut alui fluxu leuari
solent: id quod minime idiopathice laborantibus
solatio est. Ieiunos ut plurimum affligit; sed in
his ab assumpto cibo sedatur, aut etiam ex toto eua-
nescit, ablata nimirum per cibum spastica ventri-
culi affectione, aut temperato acri, irritantique
ejus fomite. Lumbricos vero, aliaque vermium
genera, a quibus dolor capitis sympathicus non raro
profluit, in intestinis latitare intelliges ex eorum-
dem propriis signis, alibi a nobis *) recensendis.

Signa dolo-
ris sympa-
thici.

*) Vid. *Volumen de morb. imi ventris cap. de vermibus.*

§. XVI.

§. XVI.

*Signa doloris
ab utero.*

Qui ab utero dolor capiti obuenit, verticem, occiputque magis diuexat, et sensum veluti frigoris ibidem parit a). Plerumque suppressis catameniiis, aut difficulter fluentibus, maloque hysterico superuenit. Vixque ab eo differt, qui ab affectis imi ventris visceribus, vel ab atra bile, vel a nimia nervorum sensibilitate aut ataxia dimanans hypochondriacos, sensibilioresque homines infestat. Cum huiusmodi dolore concurrunt ut plurimum spasticae aliarum partium affectiones, et speciatim extremorum, inferiorumque artuum frigus. Etenimque perpetuum in eo est, ab exteriori compressione mitescere, nervorum videlicet per eam sensu vel coërcito, vel plane intercepto.

a) BAGLIV. *Prax. med. l. I. de dolore in gener. p. 65.*

§. XVII.

*Signa hemi-
craniae, oui,
et clavi hy-
sterici.*

Saepe huc (§§. XV. XVI.) spectare videntur *Hemicrania, Ouum, et Clavius hystericus*. Hemicranicus autem dolor plerumque periodice accedit, deceditque, uti febris quotidiana, tertianaue intermittens. Hinc non nulli febrem laruatam, aut topicam intermittentem vocant. Ad solis ortum plerumque incipit, vehementius defauit ad meridiem, sole vero declinante remittitur, et desinit. Idcirco *morbus etiam solaris* a quibusdam nuncupatur. Interdum vespertinis, aut nocturnis horis suos circuitus obit; sed hoc quidem rarius contingit. Rarissimum casum vidit PETRVS SALIVS DIVERSVS, Medicus Faentinus sui temporis celeberrimus, hemicraniam nempe quouis octavo die periodice revertentem, eamque curauit in sacerdote quodam e Diui Dominici familia, qui ea *per tres annos continuas, et menses septem* atrociter excruciatu a) fuerat. Quanae febri intermittenti diuturnae, cuius alibi

alibi b) mentionem fecimus, quam simillimam diceret. Quandoque tamen *hemicraniam* arthritica labes, aut sanguinea finuum frontaliū congestio gignit; sed tunc non adeo manifestos, et constantes circuitus habet, et praeterea eorum morborum indicia non deficiunt. Sic quoque *symptomaticum*, aut *secundarium* capitis dolorem, uti *inflammatorium*, *febrilem*, *scorbuticum*, *venereum* a reliquis distinguere non erit arduum, si in primarii affectus, e quo veluti ex sua radice germinat, praesentiam sedulo inquisiveris, et per sua signa detexeris.

a) Annotation. in lib. ALTOMARI cap. XII. p. 394. vbi CL. Auctor rem ita narrat: *Religiosus vir per tres annos continuos, et menses septem passus est hemicraniam in parte capitis dextera una cum ingenti, et acuto dolore circa temporalem musculum, quae unoquoque die Lunae dicato semper eadem ferme hora inuadebat. Exacerbatio ad viginti octo, aut triginta horas ad summum perseverabat, quo tempore nec lumen adspicere, nec strepitum audire sine manifesta laesione, nec etiam cibum assumere, aut gustare poterat. Hoc tempore elapso, sanissimus erat, omniaque munia tam naturalia, quam animalia feliciter obibat.* b) Volum. I. §. LXV.

§. XVIII.

Multo difficilius plane est cognitu, quando istiusmodi dolor a vitio aliquo organico (§§. IV. V.) proficiscatur. Diuturnitas tamen morbi, nihil proficientibus artis auxiliis, cum signis (§§. IX. X.), atque absentia eorum, quae a §. VIII. et XI. ad XVI. usque proposuimus, valde probabilem de eo conjecturam reddit. Cystidem pure plenam oui columbini magnitudine, inuolucro fatis firmo, et crasso cinctam in dextero cerebri lobo sub osse parietali, qua offi temporum adnectitur, sitam deprehendi in robustissimo viro, quem eo in loco dolor atrocissimus, subinde adeo ingrauescens, ut conuulsivis motibus, et tremoribus totius corporis, praesertim e latere ad-

*Quomodo
distinguitur
dolor a
vitiis organi-
cis generis.*

*Historiae
abscessuum
cerebri, et
cerebelli.*

verso

verso agigaretur, atque humi ferme concideret, menses aliquot miserrime confecerat, quin ab adhibitis valentioribus medicinae praesidiis quidquam leniretur *). Tumorem rubentem, steatomati similem, ejusdem ferme magnitudinis, in dextero anteriori cerebri loco sub cortice ipso locatum gerebat senex quidam ciliaris, quem diuturna febris crebro recidiva cum capitis dolore fere perpetuo ad verticem, et paralyfi lateris oppositi, et motibus convulsivis ad quaedam intervalla inordinate recurrentibus, non sine ulcerosa pulmonum labe, post quatuor mensium lapsum, tandem exstinxit. Mulier consistentis aetatis post scabiem temere retropulsam incidit in cephalaeam incertae propemodum sedis, qua aliquot menses, vix interdum febricitans, ita conflata est, ut saepe ob doloris tormentum toto corpore contremisceret, ejularet, et fere nunquam somnum capere posset, pulsibus variis, parvis, contractis, et inaequalibus, raro frequentibus. Tandem morbo consumpta obiit. Dissecto ejus cadauere inventus est in medullari posterioris cerebri lobi parte prope tentorium abscessus, pure plenus, in cujus cavo capi nux major cum suo cortice potuisset. Tumorem in calloso corpore durum, ex albedo rubentem JOH. FANTONO a) exhibuit sectio cadaveris viri cujusdam proeclatae aetatis, qui plurium annorum spatio cephalaea, postremis mensibus acerbissima laborauerat. Is cum de loco affecto rogaretur, verticem capitis indicabat. Epilepsia quoque corripitur subinde, et de maxima salivae acritate, atque importuna fame conqueri solebat. Quando vehementius dolore isto angebatur, absurda plerumque effutiebatur. Tandem profundo somno obrutus, simulque convulsus interiit. Neque in historia hujus aegroti vlla de febre mentio facta est.

*Observatio
Fantoni.*

*) Non valde differt ab hac observatione illa, quam memorat

morat LANCISIVS, *De subitan. mortib. l. I. cap. XII §. XI.* pag. 65.

a) *Epist. de observat. med. et anat. ad Cl. HANGETVM, epist. V.*

§. XIX.

Dexterum cerebelli lobum abscessu magnam par- *Observatio*
tem corruptum vidit cel. JANVS PLANCVS Arimi- *I. Planci.*
nensis in nobili puero, qui a suppresso puris ex au-
re ejusdem lateris fluxu, cui a primis usque annis
obnoxius fuit, incidērat in acerrimam cephalalgiam
tum febre continua acuta, ex qua intra breue tem-
poris spatium mortem oppetiit a). Febris pluries
intra diētem exacerbabatur, et horrida erat, sic vt
hemitritaeo similis videretur. Accedebat subinde
aphonia, et trismus, sed breui redibat loquendi po-
testas. Tandem paralyti non oppositi, vt moris
est, sed ejusdem lateris correptus, sensibusque or-
batus fato cessit *). Memoria quoque digna sunt,
quae DOUGLASSIVS b) habet de homine, qui ex *Douglasst.*
cerebelli abscessu decumbebat; nam dolorem, et
pondus in anteriore capitis parte accusabat. San-
guinis missio, purgatio, vlcērata cantharidibus cer-
vix nihil profuerant. Cogebatur residere capite
antrorsum inclinato; quia dolor contrario positu
inualefcebat atrocius. Is quoque febre, quod mi-
rum maxime est, prorsus carebat, neque vllis con-
vellebatur spasticis affectionibus. Verum fere per-
petuo nauseabat, et vix vnquam somno recreaba-
tur. Praeterea cum oculos celerius convertere
vellet, dolorem duplo intensiorem illico experieba-
tur. Tres menses ita excruciabatur. Denique quo-
dam vespere dolor repente evanuit, vt et coenare,
et dormire nocte insequente placide potuerit. At
mane postero ex syncope subitanea obiit, quin vlla
alterutrius lateris convulsio, aut paralytis antecessis-
set. In medio cerebelli repertus est abscessus, qui

dnas uncias puris albi continebat. Aderat quoque sanguinis effusi non parua vis, qui ex rupto sinu laterali sinistro manauerat, qui que fortasse tam inexpectatum malo finem imposuit. Ex symptomatis in huiusmodi aegris supra (§§. XVIII. XIX.) observatis plurimum lucis affulgebit attentiori, diligentiorique Clinico, ut conjecturam cum veri non exigua similitudine similibus in casibus faciat. Abditiora vero vitia malae conformationis, et structurae a naturali statu abludentibus singillatim praenoscere humanae mentis pene limites excedit. Attamen qui historias plerarumque causarum, quae ad hoc genus (§§. IV. V.) spectant, expendere cupierit, ut inde aliquid adjuventi ad diagnosin rite instituentiam sibi hauriat, is consulat, BONETVM c), FANTONVM d), MORGAGNIVM e), LIEVTAUDIUM f), aliosque eiusmodi observationum collectores, sed in primis Diaria medica, et Academiarum acta, et commentarios g).

a) *Storia medica d'una Postema del lobo destro del cervello ec.*

*) Non absimilis historia legitur in *Comment. Med. et Philosoph. Societ. med. Edimburg. Vol. 2. P. 2. p. 54. edit. Vener.* de viro quodam sex et triginta annos nato, quam hic repetere non puto alienum. Huic a puero ex aure dextera puris aliquid identidem effluere consueuerat: at non inde valde molestabatur. Auditum tantummodo ejus auris aliquot ante annis amiserat. Denum eadem auris dolore atroci corripitur, qui breui non solum ad caput diffundebatur, verum etiam nauseam mouebat cum oris ventriculi morfu conjunctam. Die decima in somnum, stuporisque speciem aegrotus prolabitur; atque inter dormiendum vana obloquitur. Die undecima omnino delirat, garrit, et febricitat. Die duodecima delirium, et sopor alternatim sibi succedunt; alius resoluitur; vesperi caroticus fit. Nocte membra identidem conuelluntur: tendines crebro subsiliunt. Cuncta haec diebus XIII. XIV. XV. ingrauescunt. Conuulsui motus frequentiores; delirium apertius; arteriarum micatus amplius centum intra minutum;

tum; urinae stranguriosae; pupilla immobilis, et dilatata, quae ne viuidioris quidem lucis appulsu contrahitur. Die XVI. vera anaesthesia. Praeter crebros motus convulsivos, et tendinum subsultus spiritus difficilis est; pulsus maxime varius, sed plerumque frequentissimus. Vesica urina turget. Die XVII. prima luce stertens, et anhelans diem obiit postremum. Resecta caluaria deprehensus est medius posterior lobus dexteri hemisphaerii arcte duorum circiter digitorum latitudine adhaerens durae matri, qua os petrosum spectat, et tentorio ipsi cerebello super extenso. Subter in ipsa cerebri substantia abscessus inuentus est, qui duas prope uncias puris foetidissimi, et virentis includebat, et cerebrum ipsum arroserat. Corporis striati sinistri summa facies inflammata visa est. Ambo etiam thalami nervorum opticorum rubro, et fusco colore tingeantur. Infra, et posterius inerat puris aliquid subviridis. Septum lucidum, fornix, et latera tertii ventriculi, processusque anterior cerebelli, qui supra valvulam VIEUSSENII locatur, laxius quam solent, cohaerebant, viuebant, et teterrimum exspirabant odorem. In ventriculis lymphæ limpida ad duo exigua cochlearia reperta est. Dura mater, qua os petrosum subcingit, nigricabat. Os ipsum petrosum non nihil obscurius apparebat, quam sinistrum, sed nequaquam erat cariosum. Meatus auris dexteræ replebatur pure fusco, subviridi, et foetido, quo pariter scatebat tota cauea tympani, cujus et membrana, et ossicula penitus destructa jam pridem fuisse videbantur.

b) *Essais de Médecine d'Edimburg. T. VI. p. 174.* c) *Sepulchræ. Anatom. lib. I. sect. I. de dolore capitis.* d) *Observ. anat. III. VI. IX. XXV. Item Epist. ad MANGET. V. VIII. n. 3. 6.* e) *De sed. et caus. morb. epist. I. atque alibi; loca videbis in tertio illius operis indice ad v. cerebrum.* f) *Histor. anatom.* g) *Nempe Transact. Anglican. Hist. et Mémoir. de l'Acad. des Scienc. de Paris, Journal de Médecine de M. VANDERMONDE, Giornale Medico di Venezia, Nouvelle Letterar. del LAMI, Avviso sulla salute umana del Sig. D. LVIGI TARGIONI, Raccolta d'Opuscoli medico-pratici, e fisico-medici DELLO STESSO, Giornale Medico di Firenze, Magazzino toscano del Sig. MANETTI, Comment. de reb. in med. et scient. natur. gestis, Lips. etc.*

P r o g n o s i s.

§. XX.

*Externus
autior inter-
no.*

*Signa mali
praesagii.*

Jam verò quod attinet ad prognosin, generatiora quaedam non praetermittam, quae animadvertenda videntur. Dolor, qui exteriores capitis partes tenet, ut minus periculi habet, sic etiam facilior curatu est: contra qui interiores. Timendum enim est, ne posterior in coecitatem, nervorum distentionem, aut rigorem, insaniam, phrenitidem, epilepsiam, memoriae jacturam, apoplexiam, sphacelismum, abscessum, et mortem terminetur. Serosus, et pituitosus simplex, diuturnus quidem est, sed minus plerumque periculosus, nisi internas cerebri partes laedat. Malum significat febris acutae superueniens, si cum vrina tenui, et pellucida, quae prius crassa, et sedimentosa fuerit, copuletur; itemque si senescentibus, aut ex angina discussa, aut citius recedente, repente a) superueniat. Ad cerebrum enim morbidam ferri materiem, phrenitidemque imminere, certum indicium est. Tristitia etiam minatur, si ex acuto, vehementique mitior statim euadat, aut cesset, nulla euacuatione critica, aut imminutione reliqui morbi praegressa, aut subsequente. Sentiendi enim facultatem extinguere, gangraenamque inchoari, comperimus.

a) AVCTOR Coac. Praenot. n. 372. edit. Lindenianae Lugd. Batav. 1665.; quam, ubi loci Hippocratici mihi indicandi sunt, plerumque sequor.

§. XXI.

*Alia signa
mala.*

Perniciosum quoque est in capitis dolore frequenter vomere, praesertim aeruginosa; et cum sordiditate vigilare a), quod de idiopathico intelligatur velim. Tum enim vomitus sympathicus est, tracto

tracto in consensum per vagum neruorum par ventriculo, atque abdomine. Vbi hoc euenit, cito, et vehementer insaniunt. Malum praeterea vterque gerentibus caput dolere, et somno cum grauitate obrui *b)*, aut conuelli *c)*. Id enim a congesto circa cerebrum sanguine fieri videtur. Pessimum vniuersim signum censetur capitis dolor in febre acuta cum prauis aliis notis *d)*, vel cum virium exsolutione ex rigore, aut cruentis vrinis *e)*, vel cum vocis defectione, siue aponia, et rigore subinde accedente *f)*.

- a)* *Prorrh.* I. *b)* *Ibid.* *c)* *Coac.* n. 517. 534.
d) *Coac.* n. 160. *Praen.* n. 129. *e)* *Coac.* n. 22. 28.
f) *Ibid.* n. 255.

§. XXII.

Qui ex rigore, inquit Auctor Coacarum praenotionum *a)*, *valde frigent cum capitis, et ceruicis dolore, aponia, et tenui sudore, ii ubi vires resumerint, ac se veluti recollerint, moriuntur.* Idem perniciose habere tradit eos, qui capite dolent cum leui aliqua furditate, manuum tremore, ceruicis dolore, et nigras emittunt vrinas, ac densas, si nigra quoque vomitu effuderint. Mortiferum demum reputatur *b)*, in capitis dolore quaedam ante faciem obuersari, frustra muscas venari, et festucas legere, et floccos de vestibulis carpere, et de pariete paleas detrahare.

Signa lethalia.

- a)* *Coac.* n. I. *b)* *Praen.* n. 17.

§. XXIII.

Teste HIPPOCRATE, caput laboranti, et circumcirca dolenti pus, aut aqua, aut sanguis effluens per nares, aut per os, aut per aures soluit morbum *a)*. Nolim tamen id perpetuum credas, et nunquam fallere. Tanta interdum interior laesio est, vt tali

Signa boni praesagii.

euacuatione tolli nequeat; quod non semel obseruauimus. Liberat quoque vlcerum eruptio, interdum et somnus, et alui fluxus, aut sputa crassa, et inodora *b)*, itemque vrinae crassae, et vesicae difficultas *c)*, aut abcessus ad inferiora *d)*. Conuulsus capitis dolor, itemque sympathicus ex stomacho, vtero, aliisque partibus plerumque diuturnior est. Interdum tamen, etsi saepe per vices redeat, somno, quiete, et abstinentia intra viginti et quatuor horas mitescit. Qui hemicraniis frequenter obnoxii sunt, saepe aetatis mutatione, imminuta videlicet sensibilitate, et firmata solidarum partium cohaerentia, quam plurimum leuari consueuerunt. Hemicraniae vero periodicae, matutinis praesertim horis, vt dixi, reuertentes, plerumque intra octo, aut nouem, vel quod longissimum est, intra quatuordecim dies sponte soluuntur.

Quid de conuulsu dicendum?

Quid de hemicraniis?

a) Aphorism. 10. sect. VI. De iudicat. n. 81. b) Coac. n. 172. c) Coac. n. 170. Praedict. I. n. 152. d) Praenot. n. 129. Coac. n. 160.

C u r a t i o .

§. XXIV.

Curatio caussarum diuersitati aptanda est. Vbi a copia sanguinis, aut ejus congestione, aut a phlegmone, aut ab incitatori febris motu morbus est, sanguinem mitti oportet liberali manu, et lato vulnere ex brachiis, pedibusque, habita semper temperamenti, habitus, aetatis, sexus, et virium ratione. Si id non leuarit, vena frontis, aut jugularis *, imo arteria temporum incidi poterit. Arteriotomen autem in contumaciori malo jam ante ducentos annos GESNERVS *a)*, et DOLAEVS *b)* tamquam vsu comprobata commendarunt, eamque nuperiorum experientia extolfit. Cucurbitulae etiam

Sanguinis missa,

Jugularium sectio, et arteriosomia.

etiam dorso, scapulis, collo vtiliter admouentur *Cucurbitu-*
 tam scarificatae, quam siccae, itemque occipiti, aut *lac.*
 hirudines temporibus, et pone aures *c)*, aut nari- *Hirudines.*
 bus, quin etiam haemorrhoidibus, praesertim in
 hypochondriacis, aut haemorrhoidum, et menstruor-
 um fluxu imminuto, aut suppresso laborantibus.
 Praestantissimum vero est sanguinem e naribus euo- *Qua ratione*
 care fotu, aut vapore aquae calentis, aut immisso *sanguis e*
 calamo scriptorio in acutam aciem extenuato, et *naribus euo-*
 multifariam inciso, vt vulneret; quod in primis *cesur.*
 conuenit, si suppressa narium haemorrhagia caus-
 sam dolori dederit. Depletis autem vasis alius le- *Reuellensia.*
 nientibus medicamentis, sed iterato ducenda est,
 balneisque pedum tepidis, aut cataplasmatis, quae
 molliunt, aut quae sinapis semen habent, atque
 irritant, sanguinis cursus a capite quam maxime
 auertendus.

*) Solent Chirurgorum non pauci, quando venas jugu-
 lares secare iubentur, injecto collo vineulo sanguinis a
 capite reditum retardare, vt venae intumescant. Sed hoc
 capitis morbis nocumento est. Curandum igitur, omisso
 vinculo, vt manu paullo supra clauiculam posita, et capite
 posterius reclinato, vena jugularis comprimitur; sic enim
 intumescet sola, et apta sectioni fiet, quin caput quidquam
 mali patiarur.

a) TISSOT. *Epistol. varii argument. de cephalaea* p. 185.
edit. vener. b) *Miscellan. N. C. ann. VI. observ. 60. p. 90.*
 c) *Ibid. observ. 8. et 90.*

§. XXV.

Quando serosa colluies, aut pituita in causa *Curatio do-*
 est, hanc soluere, euacuare, et reuellere oportet. *loris a sero-*
 Sanguinis missio hic locum non habet, nisi cum va- *sa causa.*
 forum euidenti plenitudine, quod interdum incidit,
 conjuncta fuerit. Sed tum parciori manu, et magna
 prudentia detrahendus sanguis est; ne plus damni,
 quam emolumenti consequatur. Minus difficulta-

tis habent cucurbitulae scarificatae scapulis appositae, utpote quae facilius feruntur, et serum simul cum pauco cruore sine noxa subducunt. *Cathartica, et hydragoga.* Oppertuniora sunt cathartica, et speciatim hydragoga, subinde iterata, cujusmodi habentur ialapium, scammonium, sales medii, et subamari, uti anglicus, mutinensis, carolinus, itemque porrethanus, atque his affines, senae folia, agaricum, pilulae de hermodactylis, de succino CRATONIS, tartaroe, aut hydropicae BONTII, rhabbarum cum manna, *Incidentia, et diuretica.* mercurius dulcis, et hujus generis alia. Incidunt, resoluunt, et per vrinae vias serosi humoris copiam exturbant gummi ammoniacum, radices ari, et scillae, aselli, juniperi baccae, liquor cornu cerui succinatus, terra foliata tartari, et demum vinum ex genistae cineribus medicatum. Interponi his possunt diluta plantarum cephalicarum, uti salviae, betonicae, majoranae, rorismarini, radice valerianae sylvestris, paeoniae, angelicae, atque aliarum ejusmodi. *Decocta sudorifera.* His non proficientibus, ad sudorifera demum transeundum est, quorum usum ad longum tempus producere necesse plerumque est. Inter haec excellunt decocta ligni guajaci, juniperi, buxi, visci quercini, sassafras, radicum sarsaparillae, bardanae, chinae, smilacis asperae, et similium. Decocto saponariae feliciter usi fuisse non nulli summi viri dicuntur. Reuellant, et simul euacuant vesicantia, setacea, et fonticuli, praesertim posteriori ceruici imposita), fricationes, atque alia hujus generis pluries jam memorata. Et quod attinet ad vesicantia, haec in contumaciore malo post vniuersalia auxilia, opportunasque euacuationes loco in primis dolenti, imo vniuerso capiti deraaso admoventa jubent neoterici, et prae ceteris Anglorum plerique, ut praesentissimum remedium reuellens, discutiens, euacuans, doloremque mirifice tollens.

Quod

Quod remedii genus nec nouum est, nec nobis in-
 visitatum, cum jam LVDOVICVS SEPTALIVS adhi-
 bere illud, et commendare solitus b) fuerit. Haec
 vero nec cuncta simul coaceruari, nec singula indis-
 criminatim, nec in omnibus sine prudenti delectu
 adhiberi debent. Naturam cuiusque aegrotantis,
 et temperiem, et habitum, et aetatem, et regionem,
 et morbi causam, et gradum, et multa alia indican-
 tia, aut prohibentia peculiaria, et propria inspicere
 oportet, vt recte iis vtamur. Quae sane res medi-
 cum sapientem, atque exercitatum exposcit. Ne-
 que his contentus ipse fuerit; nam depulso etiam
 per ista morbo, interdum homo ita languet, et in
 cachexiam propendet, vt chalybe, et cortice peru-
 viano firmari debeat.

a) CAROL. PISO de ferof. colluv. sect. 2. P. I. cap. I.
 p. 42. 43. VAN SWIETEN §. 396. b) Animadv. et cau-
 sion. medic. l. 6. p. 141. vbi haec habet: Sed cum cutis ca-
 pitis crassior sit, quam vt liberum humori aditum concedat,
 neque vlla sensu patens fiat euacuatio humorum, ego saepissime
 expertus sum, praestare derasis capillis vesicantia imponere
 aut parti dolenti, aut toti etiam capiti; sic enim attracta ad
 externa materia euacuatur, maxime ea, quae tenuior est, et
 calida, et acris; vix enim, etiam si diuturnus dolor a crassa
 materia fiat, fieri potest, vt vehementia doloris adsit, nisi
 portio aliqua illius humoris admixta sit.

§. XXVI.

Abstinentia,alui duetione, aut vomitu curandus Dolor capi-
 dolor est, quem crapula, aut repletio induxit. Ec- tis a sto-
 coproticis, stomachicis, et roborantibus vti conue macho.
 nit, si primae coctionis vitium morbo occasionem Eccoprotica.
 dederit. In hoc casu emesim etiam proponere non Emetica.
 dubitat ANTONIVS FELICIVS, Medicus apud Picen-
 tinos non incelebris a). Decoctum fabarum casse Potus casse.
 vt praesentissimum remedium a BAGLIVIO b) prae-
 dicatur aduersus capitis dolores, qui vitio stomachi

*Piperis
usus.*

male digerentis pomeridianis horis accedunt. Bino homines hemicrania ex stomachi imbecillitate laborantes liberauit LANGIVS c) datis jejuno ventriculo quouis mane ad octiduum piperis integri granis duodecim, et desuper propinato aquae frigidae scypho. Ego vero non semel miros effectus a potu aquarum medicatarum, in primis acidularum martialium, editos vidi in hac mali specie.

Aquae medicatae.

a) *Dissertat. 4.* b) *De capit. affect. in acut. in ejus prax.* c) *Miscell. veritat. fasc. I. p. 68. 69.*

§. XXVII.

*Curatio hemicraniae
periodicae.*

Cum hemicrania periodice singulis diebus ad statas horas redit, abitque; febrem quotidianam larvatam, ut dixi (§§. II. XVII.), propemodum aemulatur. Reapse videtur esse febris partialis, et topica, ut vocatur BALLONIO, quia pars dolore affecta non solum vehementissime dolet, sed etiam calet; arteriaeque temporum validius, et crebrius mouentur, eo ferme modo, quo in febre accidit. Nec rarum est, a leui frigore, aut horrore accessionem incipere, quamquam in reliquo corpore arteriae placide suos motus obeant. Hanc post sanguinis missionem, atque alui blandam, repetitamque ductionem, quae saepissime vitari nequit, si sponte non cesserit, felicissime tollit cortex peruuanus largiori manu sumtus. Non raro antequam sanguinis copia imminuta fuerit, et primae viae expiatae, immature datus effectus suo caruit. Interdum hemicrania adeo pertinax est, ut, nisi secta arteria temporali, abigi a) nequeat. Plerumque tamen sufficit post vnam vel alteram phlebotomiam in plethoricis, et diathesi inflammatoria laborantibus jugularem venam incidere, cujus summam utilitatem in hoc affectu nedum antiquissimi medici, verum etiam nuperiores, et praesertim CAROLVS RI-

TA Taurinenſis celebrarunt *b*). Hic ipſe parem
 ope effectum ex hirudinibus temporibus applici-
 ſe obtinuiffe teſtatur.

a) PROSP. ALPIN. *Medicin. Aegypt. l. 2. cap. 12. et*
 DWIG. *Comment. de reb. in ſcient. natural. et medicin.*
ſt. Vol. 3. p. 535. b) *Conſtit. Taurin. alter. p. 79.*

§. XXVIII.

Aperientia, emmenagoga, anthyſterica expoſtu-
 at dolor is, qui ab obſtruētis viſcerum abdomina-
 lum, vterique vaſis, aut ab hyſteria, aut hypochon-
 driaſi ſimili ex cauſſa progenita dependet. Anthel-
 minthicis vero ille oppugnandus eſt, quemadmo-
 dum ſuo loco docebimus, ſi lumbrici, aliue inteſti-
 norum vermes eum promouere videantur. Nerui-
 na porro non praetermittantur, et ſedantia, vt quae
 opium habent, vbi ſpaſmi ſe ſe prodant, et nimia
 ſit neruorum ſenſibilitas. Hinc laudantur pilulae
 hyſtericae Antidotarii Bononiensis, triphera magna
 cum opio, diaſcordium Fracaſtorii, theriaca Andro-
 machi, philonium romanum, mithridatium Damo-
 cratis, laudanum nepenthes Quercetani, liquidum
 Sydenhamii, extractum opii gummoſum Baumaei,
 caſtoreum, moſchus, camphora, ſal volatile, et
 ſpiritus ſuccini, oleum ejuſdem, atque alia id genus.
 BAGLIVIVS proponit puluerem de *gutteta RIVE-*
RII ad drachmae *a*) pondus cum decocto primulae
 veris, quem tamen a multis inanibus, inutilibuſque
 rebus expurgatum hodie cuperent Medici ſapien-
 tiores, ne earum cauſſa, vti virium medicarum ex-
 pers, rejiciendus eſſet. In vniuerſum temperatiora
 deſideratis, ſenſibilioribuſque accommodentur; qui-
 bus etiam, ſi rigidiori, et ſicciori fibrarum natura
 donentur, balnea tepida, et largior aquae puriſſimae
 potatio conueniunt. Contra vbi fibrarum laxitas,
 aut languor peccat, vti in temperamentis pituitofiſ,
 habitu

*Aperientia,
 emmenagoga
 quando con-
 veniant?*

*Anthelmin-
 thica ubi?*

Paregorica.

*Animadu-
 ſio.*

habitu cachectico, paralyfi, somnolentia, mem-
rias, et sensuum imminutione, praestant ea, quae
blanda aromatica virtute pollent, quae leniter ex-
stimulant, quae roborant, imo etiam, quae extrin-
secus imposita rubefaciunt et vesicas eleuant b).

a) De dolor. capit. in genere. b) HOFFMANNVS *Medi-
systemat. T. 3. Sect. I. cap. V. §. 45.*

§. XXIX.

Dolor a sero Serosus humor, tenuis tamen, atque acer, quae
acri quomo- lis est, quem veteres salsum, aut biliosum vocabant
do trahan- (§. XIII.), si alicubi constiterit, haeseritque, et *dolorem*
das.

Refrigeran- calidum (§. III.) inferat, decocta herbarum refrige-
tia.

Lac. rantium, serum lactis, et lac ipsum requirit, neque
Hippocratis hoc in casu quidquam obstat HIPPOCRATIS aucto-
monitum ex- ritas, lac caput dolentibus noxium asseuerantis;
plicatur.

nam hoc monitum intelligi, vt ego quidem arbitror,
de eo debet capitis dolore, qui a laesa ciborum co-
ctione, ventriculique acida cruditate originem tra-

Dolor a ni- hit. Hanc quoque medendi rationem imperan-
nia sensibi- dam arbitror in ea doloris specie, cui neruorum ni-
litate quid mia sensibilitas, atque ataxia ex leui quauis causa
posules.

obnoxia esse consuevit. Neque tunc aliena habeantur
opium *), laudanum liquidum SYDENHAMII,
syrupus de meconio ejusdem, et reliqua, quae su-
pra (§. XXVIII.) memorauimus. Quod si quae opium
continent, et somnifera sunt, non bene ferantur,
vt interdum **) euenit, aut alia ibi proposita male
cedant, iis substitui tuto possunt liquor anodynus
mineralis HOFFMANNI, aether vitrioli, spiritus
antepilepticus REZOLDTI, emulsa ex seminibus fri-
gidis majoribus, et papaueris albi, aqua destillata
ex floribus violarum, et papaueris rhoeados, vel
nucum viridum cohobata, quibus blanda, et mira
inest vis anodyna, et sedans.

*) Cum magna suspicio est *sensus acutioris*, vt leui de
caussa

missa oriatur capitis dolor, qui ob eam acutiem ingens fit, narcotica confugiendum jubet **BALLONIVS** *Epitl. 2. et fil. 1. et 43. lib. 3. ex BONETI* recensione.

*) Saepissime in foeminas, aut viros incidimus, quibus ob peculiarem idiosyncrasiam loco quietis, et somni anxietates, aestum, vertigines, ruborem faciei, nauseam, gilias opium procreant. His igitur danda potius sunt anodyna, cujusmodi ea profecto sunt, de quibus supra memini. Cui virginem vestalem, cui duo, vel tria moschi grana milius dabantur; et foeminam aliam, quae somno non utebatur, nisi fumo singulis noctibus exiguo cochleari spiritus antepileptici **RESOLUTI** ex hausta aquae frigidae.

§. XXX.

Quaenam auxilia operiri ferant dolori capitis, *Symptomati curatio.* quando aliorum morborum symptoma (§. III.) est, non attinet dicere, cum iis apta curatione deinceps se etiam tollatur. Ad eum tamen, qui lues veneream sequitur, profligandum decocta lignorum odorifera passim proponuntur. Quibus si antimonium crudum addatur, eo valentiora evadere creantur. **MALPIGHIVS**, ut a **Cl. BECCARIO** accepimus, tanti faciebat decoctum ex lignis vulgo dictum, et ex putaminibus nucum, ut eo contumacissimas lues venereas, quae mercurii vim eluserant, saepius a se curatas testari solitus *) esset. Quod tamen non ita tenendum crediderim, ac si nunquam istiusmodi remedium spem fallere posset. Jam accidit quandoque, ut illud frustra detur; quod ubi contingit, et certa luis venereae non desunt indicia, ad hydrargyrosin, tamquam efficacissimum praesidium, properandum profecto est.

*) *Decoctum antiuenericum M. MALPIGHII.*

Rec. Antimon. crud. contus. et nodulo inclus. unc. IV. Rad. sarsaparill. elect. et incis. unc. iij. Putam. nuc. virid. unc. iij. M. Infund. per h. XXIV. in aq. font. lib. viij. super ciner. calidos. Deind. decoq. ad tert. part. consumt. Colat. colat. unc. viij. dentur ter in die per dies XX. aut XXX. non omisso decocto secundario pro potu ordinario.

§. XXXI.

§. XXXI.

*Quae cura-
tio conveni-
at dolori a
vermibus fi-
nus fronta-
les occupan-
tibus.*

Si de vermibus suspicio oboriatur, nares, aut
nus frontales, aut subcutanea alia loca incolentia
ii vapore humido, atque errhinis illinc elici
sunt, aut suffimentis ex *tabaci* foliis, et camp
rae pulvere crematis enecandi. Pulvere *tabaci*
nares attracto vermis expulsus est, vt narra
LITTRII fide CAMERARIUS a). In hunc finem
mus a VOGELIO b) proponitur naribus, atque
hiant excipiendus, ex foliorum absinthii, ma
bii, betonicae, florum centaurii minoris, singu
rum drachmis duabus, radicis angelicae, zedoari
succini, singulorum drachma vna, antimonii cr
vncia dimidia in puluerem redactis, et bene com
mixtis, carbonumque igni inspersis.

a) *Dissers. epistolar. XII.* b) *De cognoscend. et curand.
morb. §. 420.*

§. XXXII.

*Topica re-
media.*

Praeterea non hic reticenda sunt ea, quae extrin
secus sedando dolori admoueri solent. Epithemata
ex aqua rosarum, aut florum sambuci, et acq
fronti applicata, siue tepida, siue frigida, calorem
compescunt, discutiunt, reprimunt, et motum sae
guinis quodammodo temperant. Temporibus com
mode, praesertim in dolore conuulsivo, et spastico
illinitur vnguentum *populeon*, aut aliquid opii cum
camphorae, et croci tantillo in aqua reginae Haen
gariae solutum; aut aether vitriolicus, qui dolorem
sopit, et calorem imminuit. Verbenae succus, au
herba ipsamet contusa, et dolenti loco imposi
eicunque doloris causae prodesse creditur, quae
specifica esset. In nares etiam indi, atque attritu
cum magna leuaminis spe tincturam aliquam an
dynam, aut *balsamum vitae* HOFFMANNI *), aut
spiritum vini camphoratum iubent non nulli; et
eni

prim a nervis olfactoriis proxime delinitis reliquos quoque vim medicamenti persentire, non alienum ratione putant. Vniuersim vtilissime dolens locus plida, aut lacte tepenti, aut cineribus sacculo inclusis foueri potest. In hemicraniis periodicis, ante accessum aliquot horis, ad eum anteuertendum soleo theriacam cum galbano, et camphora, addito aceti momento subactam temporibus, et si qui frontali super dare. Resoluit enim, discutit, et sensum imminuit, vnde saepe tolerabilior, et citior accessio succedit.

*) *Balsamum vitae* HOFFMANNI.

Rec. Ol. deßillat. Lauendul.

Majoran.

Coryophyll.

Macis

Cinnamom. an. scrup. j.

Rutae

Succin. alb. ap. scrup. sem.

Citri e cortic. express. scrup. j.

Ambr. gryseae scrupul. sem.

Olea cum ambra, et balsami peruiani scrupulo uno misceantur, atque in spiritus vini rectificatissimi unciiis decem soluantur. Intern. datur a gutt. X. ad XX. ad nauseam, ad colicam, ad diarrhoeam. Extrinsecus ad roborandas, firmandasque partes.

§. XXXIII.

Silentio hic praeteriri non debet curatio, quam raro exemplo, magnoque ausu tentauit celeberrimus TISSOTIUS saeuissimae, et diuturnae cephalae in virgine triginta annorum, alioquin sana, et robusta, vt ruricolae esse solent α). Sedes autem, qua dolor acerbius saeuiebat, erat *angulus internus posticus ossis parietalis dexteri*, spatiumque occupabat, quale *asse texisset*. Vna vero *consentiebat totum anterius caput*. Nihil ei profuerant venae sectiones, nihil arteriotome, nihil balnea pedum tepida,

*Historia
rarae cura-
tionis.*

pida, nihil immersio totius corporis in frigida
nihil aquae gelidae stillicidium, nihil opium, ni-
setaceum. Leuamen tantummodo, sed breue pe-
ceperat, ex *cruentis tucurbitalis dolenti applicata* p-
ti; *paullulum diuturnius ex larga suppuratione, quae*
excitauit rantharides capiti impositae. Dolor
istum esse *externum* coniecit vir acutissimus, cui
que nihil *infra cutim*, et *musculos* esse cogitauit
quod *dolere posset*, locum *dolentem latu vulnere ad*
vsque crucis in modum incidit curauit, ut dis-
neruis cutaneis, aut musculosis sensus deleteretur.

eo momento, *que sectio peracta est*, dolor euauit,
et longa suppuratione inducta; *etiam qui antea*
caput affligebat, paullatim cessauit *). Verum ne-
mo, nisi qui tanti viri acre iudicium, et anatomes
penitioris scientiam possederit, audebat ad eiusmodi
chirurgiam se conuertere. Fortasse dato intrin-
secus lignorum, *ut vocant*, decocto, extrinsecus
vero litu mercuriali prudenter adhibito haerens
morbi causa dimoueri, resoluique simili in casu
posset, quin immiti, ancipitique experimento opus
sit. Saepe pertinax doloris fixi natura; et loci af-
fecti ratio, sagaxque omnium rerum examen ad sim-
plicem hanc, et simul efficacem medicinam, etiam
vbi nulla luis venereae suspicio subesset, non sine
boni exitus laude viam Clinicis aperuere.

a) *Epist. med. var. argum. p. 185. ed. Vener.*

*) Huc quodammodo referenda est observatio GAVAR-
SETTI (*De cancer. c. 3.*) Dolor capitis perpetuus et sym-
pathicus ex contuso pollice erat. Pollice audacter inuito
cessauit. Vid. HALLER. *Elem. Physiolog. T. 4. lib. X. sect.*
VII. §. XXIII.

§. XXXIV.

Diaeteti-
cum regi-
men.

Postremo hoc vnum addam, antiquissimis medi-
cinae proceribus opportunissimum generatim visum
esse, in quouis capitis dolore abstinere a cibo, aquam
bibere

bibere, caput tondere ad cutim; in eo, qui a causa calida sit, aqua frigida multa caput perfundere, vel rosam, et acetum ex aqua imponere; si vero frigus nocuerit, aut tenax, crassusque humor resolui debeat, caput calida fouere, perfricare, aut stillicidio submittere, deinde oleo calido inungere, et veste operire; pedes in balneum tepidum demittere, et nares errhinis purgare, saliuam apophlegmatizantibus prolicere, aluum subducere, et sinapi, aut cantharidibus, aut ferro candenti vlcera, vnde morbo exitus paretur, excitare a). Docuit etiam magister vsus in diuturno, et confirmato capitis dolore interdum licere balnea frigida experiri, neque inutile esse capillos in illis, qui raso capite erant, alere, et saepius pestere; quo auxilio ab assidua cephalaea liberatum vidi nobilem virum aetate florentem, habitu pituitoso, et obeso praeditum, mihi amicissimum. Praeterea magni interest in doloribus capitis pedes velare, caputque attollere; quae animaduersio etiam ad prophylaxin, praesertim literarum studiosis, pernecessaria est.

a) Vid. CORNEL. CELS. l. IV. cap. 2. n. 5. ad 160.

C A P V T II.

DE HYDROCEPHALO ET SPINA BIFIDA,

SIVE

AQVEO SPINAE TVMORE.

§. XXXV.

PROXIME venit *ὕδρονι Φαλον*, quia saepe id cum capitis dolore conjungitur, aut a paribus causis dimanat. Sic olim appellatum fuit morbi genus, in quo caput humore aqueo turget, intumescit, et prementi digito facile cedit. Hodie vero vno hoc

Vid. III. P. I.

C

nomine

pida, nihil immersio totius corporis in frigida
 nihil aquae gelidae stillicidium, nihil opium, ni-
 setaceum. Leuamen tantummodo, sed breue
 ceperat, ex *cruentis tucurbitulis dolenti applicatis*
ti; paululum diuturnius ex larga suppuratione,
excitauit xantharides capiti impositae. Dedit
 istum esse externum coniecit vir acutissimus,
 que nihil *infra cutim, et musculos* esse cogitauit
quod dolere posset, locum dolentem lato vulnere ad
vsque crucis in modum incidit curauit, ut dis-
neruis cutaneis, aut musculofit sensus deleteretur.
 eo momento, *que sectio peracta est, dolor euant-*
et longa suppuratione inducta; etiam qui antea
caput affligebat, paulatim cessauit *). Verum
 mo, nisi qui tanti viri acre iudicium, et anato-
 penitioris scientiam possederit, audebit ad ejusmodi
 chirurgiam se conuertere. Fortasse dato intrin-
 secus lignorum, *ut vocant, decocto, extrinsecus*
vero litu mercuriali prudenter adhibito haerens
morbi causa dimoueri, resoluique simili in casu
posset, quin immiti, ancipitique experimento opor-
fit. Saepe pertinax doloris fixi natura, et loci
 secti ratio, sagaxque omnium rerum examen ad finem
 plicem hanc, et simul efficacem medicinam, etiam
 vbi nulla luis venereae suspicio subesset, non sine
 boni exitus laude viam Clinicis aperuere. *

a) *Epist. med. var. argum. p. 185. ed. Venet.*

*) Huc quodammodo referenda est observatio GAV-
 SETTI (*De cancer. c. 3.*) Dolor capitis perpetuus et sym-
 pathicus ex contuso pollice erat. Pollicis audacter inu-
 cessauit. Vid. HALLER. *Elem. Physiolog. T. 4. lib. X. p. 171.*
 VII. §. XXIII.

§. XXXIV.

Diaeteti-
cum regi-
meni.

Postremo hoc vnum addam, antiquissimis me-
 dicinae proceribus opportunissimum generatim videri
 esse, in quouis capitis dolore abstinere a cibo, aqua
 bibenda

bibere, caput tondere ad cutim; in eo, qui a causa calida sit, aqua frigida multa caput perfundere, vel rosam, et acetum ex aqua imponere; si vero frigus nocuerit, aut tenax, crassusque humor resolui debeat, caput calida fouere, perfricare, aut stillicidio submittere, deinde oleo calido inungere, et veste operire; pedes in balneum tepidum demittere, et nares errhinis purgare, salivam apophlegmatizantibus prolicere, aluum subducere, et sinapi, aut cantharidibus, aut ferro candenti vlcera, unde morbo exitus paretur, excitare a). Docuit etiam magister vsus in diuturno, et confirmato capitis dolore interdum licere balnea frigida experiri, neque inutile esse capillos in illis, qui raso capite erant, alere, et saepius potere; quo auxilio ab assidua cephalaea liberatum vidi nobilem virum aetate florentem, habitu pituitoso, et obeso praeditum, mihi amicissimum. Praeterea magni interest in doloribus capitis pedes velare, caputque attollere; quae animaduersio etiam ad prophylaxin, praesertim literarum studiosis, pernecessaria est.

a) Vid. CORNEL. CELS. l. IV. cap. 2. n. 5. ad 160.

CAPUT II.

DE HYDROCEPHALO ET SPINA BIFIDA,

SIVE

AQVEO SPINAE TVMORE.

§. XXXV.

PROXIME venit *ὑδρονέφαλον*, quia saepe id cum capitis dolore conjungitur, aut a paribus causis dimanat. Sic olim appellatum fuit morbi genus, in quo caput humore aqueo turget, intumescit, et prementi digito facile cedit. *Hydrocephalon.* *Desfont.* Hodie vero vno hoc

Vol. III. P. I.

C

nomine

*Differen-
tiae.*

nomine plures morbi cum sede, tum effectis discrepantes comprehendi solent, in quorum aliquo nullus interdum exterior tumor apparet. Singulis autem commune est ab aliqua aquae, siue lymphæ coaceruatione oriri. Haec vel inter cutem, et pericranium, vel inter pericranium, et calvariam, vel intra cranii cauum effusa colligitur. Postremum contingit duplici ratione, nimirum vel ossibus cranii diductis, quod foetibus, et pueris fere accidit; vel iis minimè diductis, quod consistentis aetatis praesertim proprium est; quamquam non diffiteor, exempla suppetere adutorum, et senum, quibus interdum ossa cranii morbo diducta hiarunt. Id mali RAMAZZINIO, atque HAMBERGERO medicinae professoribus vndecunque praeclarissimis diuturno, et vehementi capitis dolore discruciatibus obuenisse ferunt.

§. XXXVI.

*Divisio in
externum, et
internum.
Descriptio
externi.*

Hinc prima Hydrocephali distinctio ducta est in *externum, et internum.* In externo, si humor primo loco (§. XXXV.) congeritur, tumor, inquit Cl. PLATNERVS, *ad immanem magnitudinem increscit, et per cutim ut in vitro, aut cornu humorem translucidum oculis spectandum exhibet: si altero (§. eod.), quod rarius euenit, caput non adeo intumescit, sed pressum sicut uter impletus, atque arcte constructus renititur a).*

a) *Institus. chirurg. §. 745.*

§. XXXVII.

*Internum
duplex.
Primi de-
scriptio.*

Interni duplex genus statuitur, vt supra (§. XXXV.) jam dixi; quorum alterum ex interno, et externo quasi compositum dixeris; quia in eo aqua cerebri interiora ita replet, et distendit, vt ossa etiam cranii extorsum urgeat, futuras diducat, sic vt deli-

scant, et tandem exterius profusa ingenti se prodant capitis tumore: idque praecipue in foetibus factum esse videtur, qui cerebro carere visi sunt prosectoribus: visi, inquam, sunt; non enim, eos cerebro ab initio vere caruisse, Cl. MORGAGNIUS putat, sed potius cerebrum ab aqua paullatim ita maceratum, dissolutum, liquatumque, ut per aliquod foramen, puta occipitis, siue spinae, demum effluerit; quod sane multo probabilius videtur:

§. XXXVIII.

Alterum vero, cum sine ossium cranii diuulsione fiat, nec ullo exteriori tumore manifestum se reddat, non apud omnes hydrocephali nomen obtinuit. Namque non desunt, qui existiment, ubi caput non tumeat, ibi hydrocephalon esse non posse. Plerique tamen, inter quos MORGAGNIO principem locum damus, non dubitandum a) censent, quin huic quoque malo idem nomen appropinquet conveniat: nam, cum multa aqua intra cranium sensim coaceruetur, et quotidie magis magisque crescat, si huic cedere, ut in tenellis, ossa possent, euentissimum est, tumorem capitis exterius etiam proditurum esse; quia pleraeque causae ex iis, propter quas in tenerorum infantum cranio aqua contrahitur, eadem prorsus in adultis existunt, ob quas in horum capite cumulat^{ur} *). Istud autem hydrocephali interni genus distingui potest in acutum, et chronicum; prius illud appello, quod celeri cursu, et cum febre non leui ad mortem properat; posterius, quod lento passu, et sine febre, aut leuissima, et vix sensibili enecat.

*Descriptio
alterius.*

a) *De causis et sedibus morborum etc. Epist. XII. n. 3.*

*) De hydrocephalo legendus IO. RUD. ZWINGERUS, qui in *Actis Helveticis*. Vol. I. c. I. non solum illius exempla collegit, sed etiam diligenter, et ordinate inter se comparauit.

*Piperis
usus.*

male digerentis pomeridianis horis accedunt. Bino
homines hemicrania ex stomachi imbecillitate labo-
rantes liberauit LANGIUS c) datis jejuno ventricu-
lo quouis mane ad octiduum piperis integri grana
duodecim, et desuper propinato aquae frigidae
scypho. Ego vero non semel miros effectus
potu aquarum medicatarum, in primis acidularum
martialium, editos vidi in hac mali specie.

*Aquae me-
dicatae.*

a) *Dissertat. 4.* b) *De caput. affect. in acut. in ejus
prax.* c) *Miscell. veritat. fasc. I. p. 68. 69.*

§. XXVII.

*Curatio he-
micrania
periodicae.*

Cum hemicrania periodice singulis diebus ad sta-
tas horas redit, abitque; febrem quotidianam lar-
vatam, vt dixi (§§. II. XVII.), propemodum aemu-
latur. Reapse videtur esse febris partialis, et to-
pica, vt vocatur BALLOLIO, quia pars dolore affe-
cta non solum vehementissime dolet, sed etiam ca-
let; arteriaeque temporum validius, et crebrius
mouentur, eo ferme modo, quo in febre accidit.
Nec rarum est, a leui frigore, aut horrore accessio-
nem incipere, quamquam in reliquo corpore ar-
teriae placide suos motus obeant. Hanc post sangui-
nis missionem, atque alui blandam, repetitamque
ductionem, quae saepissime vitari nequit, si sponte
non cesserit, felicissime tollit cortex peruuianus lar-
giori manu sumtus. Non raro antequam sangui-
nis copia imminuta fuerit, et primae viae expiatae
immature datus effectus suo caruit. Interdum he-
micrania adeo pertinax est, vt, nisi secta arteria
temporali, abigi a) nequeat. Plerumque tamen
sufficit post vnam vel alteram phlebotomiam
plethoricis, et diathesi inflammatoria laborantibus
jugularem venam incidere, cujus summam utilita-
tem in hoc affectu nedum antiquissimi medici,
rum etiam nuperiores, et praesertim CAROLVS

HA Taurinensis celebrarunt b). Hic ipse parem
rope effectum ex hirudinibus temporibus applici-
is se obtinuisse testatur.

a) PROSP. ALPIN. *Medicin. Aegypt.* l. 2. cap. 12. et
VDWIG. *Comment. de reb. in scient. natural. et medicin.*
est. Vol. 3. p. 535. b) *Constit. Taurin. alter.* p. 79.

§. XXVIII.

Aperientia, emmenagoga, anthysterica expo-
lat dolor is, qui ab obstructis viscerum abdomina-
lium, vterique vasis, aut ab hysteria, aut hypochon-
driasi simili ex causa progenita dependet. Anthel-
minthicis vero ille oppugnandus est, quemadmo-
dum suo loco docebimus, si lumbrici, aliue intesti-
norum vermes eum promouere videantur. Nerui-
na porro non praetermittantur, et sedantia, ut quae
opium habent, ubi spasmi se se prodant, et nimia
sit nervorum sensibilitas. Hinc laudantur pilulae
hystericae Antidotarii Bononiensis, triphera magna
cum opio, diascordium Fracastorii, theriaca Andro-
machi, philonium romanum, mithridatium Damo-
cratis, laudanum nepenthes Quercetani, liquidum
Sydenhamii, extractum opii gummosum Baumaeci,
castoreum, moschus, camphora, sal volatile, et
spiritus succini, oleum ejusdem, atque alia id genus.
MAGLIVIVS proponit pulverem de gutteta RIVE-
RI ad drachmas ʒ pondus cum decocto primulae
vis, quem tamen a multis inanibus, inutilibusque
purgatum hodie cuperent Medici sapien-
tiores, ac earum causa, uti virium medicarum ex-
ters, rejiciendus esset. In uniuersum temperatiora
sensibilioribusque accommodentur; qui-
bus, si rigidiori, et sicciori fibrarum natura
potatur, balnea tepida, et largior aquae purissimae
potatio conueniunt. Contra ubi fibrarum laxitas,
aut languor peccat, uti in temperamentis pituitosis,
habitu

*Aperientia,
emmenagoga
quando con-
ueniant?*

*Anthelmin-
thica ubi?*

Paregorica.

*Animadu-
er-
so.*

habitu cachectico, paralyfi, somnolentia, meris, et sensuum imminutione, praestant ea, quae blanda aromatica virtute pollent, quae leniter stimulant, quae roborant, imo etiam, quae exte-
secus imposita rubefaciunt et vesicas eleuant b).

a) De dolor. capis. in genere. b) HOFFMANNVS
systemat. T. 3. Sect. I. cap. V. §. 45.

§. XXIX.

Dolor a sero acri quomodo tractandus. Serosus humor, tenuis tamen, atque acer, qui
lis est, quem veteres salsum, aut biliosum vocabant
(§. XIII.), si alicubi constiterit, haeseritque, et dolor
Refrigerantia. calidum (§. III.) inferat, decocta herbarum refrigerantium, serum lactis, et lac ipsum requirit, neque
Lac. hoc in casu quidquam obstat HIPPOCRATIS auctoritas, lac caput dolentibus noxium asseuerantiam
Hippocratis monitum explicatur. nam hoc monitum intelligi, ut ego quidem arbitror, de eo debet capitis dolore, qui a laesa ciborum co-
ctione, ventriculique acida cruditate originem tra-
hit. Hanc quoque medendi rationem imperanda
Dolor a nimia sensibilitate quid postulet. arbitror in ea doloris specie, cui neruorum nimia sensibilitas, atque ataxia ex leui quavis causa
obnoxia esse consuevit. Neque tunc aliena habeantur opium *), laudanum liquidum SYDENHAMII, syrupus de meconio ejusdem, et reliqua, quae supra (§. XXVIII.) memoravi. Quod si quae opium continent, et somnifera sunt, non bene ferantur, ut interdum **) euenit, aut alia ibi proposita male cedant, iis substitui tuto possunt liquor anodyni mineralis HOFFMANNI, aether vitrioli, spiritus antepilepticus PEZOLDTI, emulsa ex feminibus figidis majoribus, et papaueris albi, aqua destillata ex floribus violarum, et papaueris rheados, vel nucum viridum cohobata, quibus blanda, et minime vis anodyna, et sedans.

*) Cum magna suspicio est sensus acutioris, ut leui-
cau

affa oriatur capitis dolor, qui ob eam *acutiem* ingens fit, narcotica confugiendum jubet **SALLOIUS** *Epith. 2. et lib. 1. et 43. lib. 3. ex BONETI* recensione.

*) Saepissime in foeminas, aut viros incidimus, qui ob peculiarem idiosyncrasiam loco quietis, et somni quietates, aestum, vertigines, ruborem faciei, nauseam, filias opium procreant. His igitur danda potius sunt anodyna, cujusmodi ea profecto sunt, de quibus supra memini. Cui virginem vestalem, cui duo, vel tria moschi grana illius dabatur; et foeminam aliam, quae somno non utebatur, nisi sumto singulis noctibus exiguo cochleari titrus antepileptici **RESOLUTI** ex haustu aquae frigidae.

§. XXX.

Quaenam auxilia operiri ferant dolori capitis; *Symptomati- curatio.* dando aliorum morborum symptoma (§. III.) est, non attinet dicere, cum iis apta curatione deinceps se etiam tollatur. Ad eum tamen, qui lues veneream sequitur, profligandum decocta lignorum odorifera passim proponuntur. Quibus si antimonium crudum addatur, eo valentiora euadere creantur. **MALPIGHIVS**, ut a **Cl. BECCARIO** acceptus, tanti faciebat decoctum ex lignis vulgo dictum, et ex putaminibus nucum, ut eo contumacissimas lues venereas, quae mercurii vim eluserint, saepius a se curatas testari solitus *) esset. Quod tamen non ita tenendum crediderim, ac si inquam istiusmodi remedium spem fallere posset, iam accidit quandoque, ut illud frustra detur; sed ubi contingit, et certa luis venereae non deest indicia, ad hydrargyrosin, tamquam efficacissimum praesidium, properandum profecto est.

*) *Decoctum antiuenercum* **M. MALPIGHII**.

Rec. Antimon. crud. contus. et nodulo inclus. unc. IV. pul. sarsaparill. elect. et incis. unc. iij. Putam. nuc. virid. e. iij. M. Infund. per h. XXIV. in aq. font. lib. viij. surcinq. calidos. Deind. decoq. ad tert. part. consumt. Col. colat, unc. viij. dentur ter in die per dies XX. aut XXX. et omisso decocto secundario pro potu ordinario.

§. XXXI.

§. XXXI.

*Quae cura-
tio conveni-
at dolori a
vermibus fi-
nus fronta-
les occupan-
tibus.*

Si de vermibus suspicio oboriatur, nares, au-
nus frontales, aut subcutanea alia loca incolenta
ii vapore humido, atque errhinis illinc eliciti
sunt, aut suffimentis ex *tabaci* foliis, et camp-
rae pulvere crematis enecandi. Pulvere *tabaci*
nares attracto vermis expulsus est, vt narrat
LITTRII fide CAMERARIUS a). In hunc finem
mus a VOGELIO b) proponitur naribus, atque
hiantie excipiendus, ex foliorum absinthii, mar-
bii, betonicae, florum centaurii minoris, singu-
rum drachmis duabus, radicis angelicae, zedoariae
succini, singulorum drachma vna, antimonii cru-
vncia dimidia in pulverem reductis, et bene com-
mixtis, carbonumque igni inspersis.

a) *Dissers. epistolar. XII.* b) *De cognoscend. et curand.
morb. §. 420.*

§. XXXII.

*Topica re-
media.*

Praeterea non hic reticenda sunt ea, quae extrin-
secus sedando dolori admoueri solent. Epithema
ex aqua rosarum, aut florum sambuci, et ac-
fronti applicata, siue tepida, siue frigida, calorem
compescunt, discutiunt, reprimunt, et motum san-
guinis quodammodo temperant. Temporibus com-
mode, praesertim in dolore convulsivo, et spastico
illinitur vnguentum *populeon*, aut aliquid opii cum
camphorae, et croci tantillo in aqua reginae Hen-
gariae solutum; aut aether vitriolicus, qui dolori
sopit, et calorem imminuit. Verbenae succus, et
herba ipsamet contusa, et dolenti loco imposi-
eiuscunq; doloris causae prodesse creditur, quod
specificum esset. In nares etiam indi, atque attra-
cum magna leuaminis spe tincturam aliquam a-
dynam, aut *balsamum vitae* HOFFMANNI *),
spiritum vini camphoratum iubent non nulli;

in a nervis olfactoriis proxime delinitis reliquos
 aque vim medicamenti perferre, non alienum
 ratione putant. Vniuersim vtilissime dolens locus
 oleo, aut lacte tepenti, aut cineribus sacculo in-
 clausis foueri potest. In hemicraniis periodicis,
 inter accessum aliquot horis, ad eum anteuertentem
 oleo soleo theriacam cum galbano, et camphora,
 subito aceti momento subactam temporibus, et si-
 mili frontali super dare. Resoluit enim, discutit,
 sensum imminuit, vnde saepe tolerabilius, et
 citior accessio succedit.

*) *Balsamum vitae* HOFFMANNI.
 Ol. destillat. Lauendul.

Majoran.

Coryophyll.

Macis

Cinnamom. an. scrup. j.

Rutae

Succin. alb. an. scrup. sem.

Citri e cortic. express. scrup. j.

Ambr. gryseae scrupul. sem.

Olea cum ambrā, et balsami peruiani scrupulo uno mi-
 stantur, atque in spiritus vini rectificatissimi uncias decem
 soluantur. Intern. datur a gr̃ss. X. ad XX. ad nauseam, ad
 epicum, ad diarrhoeam. Extrinsicus ad roborandas, fir-
 mandasque partes.

§. XXXIII.

Silentio hic praeteriri non debet curatio, quam
 raro exemplo, magnoque ausu tentauit celeberrimus
 TISSOTIUS saeuissimae, et diuturnae cepha-
 lalgiae in virgine triginta annorum, alioquin sana, et
 robusta, vt ruricolae esse solent α). Sedes autem,
 qua dolor acerbius saeuiebat, erat *angulus internus
 ossis parietalis dexteri*, spatiumque occupa-
 bat, quale *asse texisset*. Vna vero *consentiebat to-
 tum anterius caput*. Nihil ei profuerant venae se-
 ctiones, nihil arteriotome, nihil balnea pedum te-
 pida,

*Historia
 rarae cura-
 tionis.*

pida, nihil immersio totius corporis in frigida
 nihil aquae gelidae stillicidium, nihil opium, ni-
 letaceum. Leuamen tantummodo, sed breve per-
 ceperat, ex *cruentis tucurbitulis dolenti applicatis* per-
ti; paullulum diuturnius ex larga suppuratione, quae
excitauerunt rantharides capiti impostae. Dolor
 istum esse externum coniecit vir acutissimus, cui
 quae nihil *infra cutim, et musculos* esse cogitant
quod dolere posset, locum dolentem lato vulnere ad
usque crucis in modum intidi curauit, ut dis-
neruis cutaneis, aut musculofit sensus deleteretur.
 eo momento, quae *sectio peracta est, dolor euant-*
et longa suppuratione inducta; etiam qui antea
caput affligebat, paullatim cessauit *). Verum ne-
 mo, nisi qui tanti viri acre iudicium, et anatomae
 penitioris scientiam possederit, audebat ad eiusmodi
 chirurgiam se conuertere. Fortasse dato intrin-
 secus lignorum, ut vocant, decocto, extrinsecus
 vero litu mercuriali prudenter adhibito haerens
 morbi causa dimoueri, resoluique simili in casu
 posset, quin immiti, ancipitique experimento opor-
 tit. Saepe pertinax doloris fixi natura; et loci af-
 fecti ratio, sagaxque omnium rerum examen ad sim-
 plicem hanc, et simul efficacem medicinam, etiam
 ubi nulla luis venereae suspicio subesset, non sine
 boni exitus laude viam Clinicis aperuere.

a) *Epist. med. var. argum. p. 185. ed. Venet.*

*) Huc quodammodo referenda est observatio GAVI-
 SETTI (*De cancer. c. 3.*) Dolor capitis perpetuus et sym-
 pathicus ex contuso pollice erat. Pollice audacter inulso
 cessauit. Vid. HALLER. *Elem. Physiolog. T. 4. lib. X. §. 18.*
VII. §. XXIII.

§. XXXIV.

*Diaeteti-
cum regi-
men.*

Postremo hoc vnum addam, antiquissimis medi-
 cinae proceribus opportunissimum generatim visum
 esse, in quouis capitis dolore abstinere a cibo, aquam
 bibere

bibere, caput tondere ad cutim; in eo, qui a causa calida sit, aqua frigida multa caput perfundere, vel rosam, et acetum ex aqua imponere; si vero frigus nocuerit, aut tenax, crassusque humor resolui debeat, caput calida fouere, perfricare, aut stillicidio submittere, deinde oleo calido inungere, et veste operire; pedes in balneum tepidum demittere, et nares errhinis purgare, salivam apophlegmatizantibus prolicere, aluum subducere, et sinapi, aut cantharidibus, aut ferro candenti vlcera, vnde morbo exitus paretur, excitare a). Docuit etiam magister vsus in diuturno, et confirmato capitis dolore interdum licere balnea frigida experiri, neque inutile esse capillos in illis, qui raso capite erant, alere, et saepius pectere; quo auxilio ab assidua cephalaea liberatum vidi nobilem virum aetate florentem, habitu pituitoso, et obeso praeditum, mihi amicissimum. Praeterea magni interest in doloribus capitis pedes velare, caputque attollere; quae animaduersio etiam ad prophylaxin, praesertim literarum studiosis, pernecessaria est.

a) Vid. CORNEL. CELS. l. IV. cap. 2. n. 5. ad 160.

CAPUT II.

DE HYDROCEPHALO ET SPINA BIFIDA,

SIVE

AQVEO SPINAE TVMORE.

§. XXXV.

PROXIME venit *ὕδρονέφαλον*, quia saepe id cum capitis dolore conjungitur, aut a paribus causis dimanat. Sic olim appellatum fuit morbi genus, in quo caput humore aqueo turget, intumescit, et prementi digito facile cedit. Hodie vero vno hoc

Vd. III. P. I.

C

nomine

*Differen-
tiae.*

nomine plures morbi cum sede, tum effectis discrepantes comprehendi solent, in quorum aliquo nullus interdum exterior tumor apparet. Singulis autem commune est ab aliqua aquae, siue lymphae coaceruatione oriri. Haec vel inter cutem, et pericranium, vel inter pericranium, et caluariam, vel intra cranii cauum effusa colligitur. Postremum contingit duplici ratione, nimirum vel ossibus cranii diductis, quod foetibus, et pueris fere accidit; vel iis minime diductis, quod consistentis aetatis praesertim proprium est; quamquam non diffiteor, exempla suppetere aultorum, et senum, quibus interdum ossa cranii morbo diducta hiarunt. Id mali RAMAZZINIO, atque HAMBERGERO medicinae professoribus vndecunque praeclarissimis diuturno, et vehementi capitis dolore discruciatibus obuennisse ferunt.

§. XXXVI.

*Divisio in
externum, et
internum.*

*Descriptio
externi.*

Hinc prima Hydrocephali distinctio ducta est in *externum, et internum*. In externo, si humor primo loco (§. XXXV.) congeritur, tumor, inquit Cl. PLATNERVS, *ad immanem magnitudinem increscit*, et percutim *ut in vitro, aut cornu* humorem translucidum oculis spectandum exhibet: si altero (§. eod.), quod rarius euenit, *caput non adeo intumescit, sed pressum sicut uter impletus, atque arcte confritus renititur a).*

a) *Institus. chirurg. §. 745.*

§. XXXVII.

*Internum
duplex.*

Primi descriptio.

Interni duplex genus statuitur, ut supra (§. XXXV.) jam dixi; quorum alterum ex interno; et externo quasi compositum dixeris; quia in eo aqua cerebri interiora ita replet, et distendit, ut ossa etiam cranii extorsum urgeat, futuras diducat, sic ut deli-

scant,

scant, et tandem exterius profusa ingenti se prodat capitis tumore: idque praecipue in foetibus factum esse videtur, qui cerebro carere visi sunt profectoribus: visi, inquam, sunt; non enim, eos cerebro ab initio vere caruisse, Cl. MORGAGNIUS putat, sed potius cerebrum ab aqua paullatim ita maceratum, dissolutum, liquatumque, ut per aliquod foramen, puta occipitis, siue spinae, demum effluerit; quod sane multo probabilius videtur:

§. XXXVIII.

Alterum vero, cum sine ossium cranii diuulsione fiat, nec ullo exteriori tumore manifestum se reddat, non apud omnes hydrocephali nomen obtinuit. Namque non desunt, qui existiment, ubi caput non tumeat, ibi hydrocephalon esse non posse. Plerique tamen, inter quos MORGAGNIUS principem locum damus, non dubitandum a) censent, quin huic quoque malo idem nomen approprie conveniat: nam, cum multa aqua, intra cranium fissum coaceruetur, et quotidie magis magisque crescat, si huic cedere, ut in tenellis, ossa possent, euentissimum est, tumorem capitis exterius etiam proditurum esse; quia pleraeque causae ex iis, propter quas in tenerorum infantum cranio aqua contrahitur, eadem prorsus in adultis existunt, ob quas in horum capite cumulat^{ur} *). Istud autem hydrocephali interni genus distingui potest in acutum, et chronicum; prius illud appello, quod celeri cursu, et cum febre non leui ad mortem properat; posterius, quod lento passu, et sine febre, aut leuissima, et vix sensibili enecat.

*Descriptio
alterius.*

a) De causis, et sedib. morb. etc. Epist. XII. n. 3.

*) De hydrocephalo legendus IO. RUD. ZWINGERUS, qui in *Actis Helvetic. Vol. I. c. I.* non solum illius exempla collegit, sed etiam diligenter, et ordinate inter se comparauit.

§. XXXIX.

Causa proxima.

Ex his patet, causam hydrocephali proximam in aquei humoris lente effusi congestione, sensim facta consistere, siue partes capitis externas, siue internas tantum, siue utrasque simul repleuerit.

Remotae.

Remotae vero causae non aliae videntur, quam sequentes, venarum nempe tam sanguinem, quam lympham e capite, et cerebro reuehentium obstructio; compressio ab vteri ore in partu, aut a funiculo umbilicali circa collum ducto; vasorum absorbentium actio deperdita; polypi; tumores glandularum colli; vasorum lymphaticorum ruptio; contusiones; malus corporis habitus; cacoehymia; serosa colluies, et totius corporis laxitas, atque atonia, achores, tinea, et scabies retropulsa, suppressa urinae, et sudoris excretio, aliaque id genus.

§. XL.

Quodnam hydrocephalum internum vere?

Serum in ventriculos cerebri, anteriores praesertim, effusum, congestumque proprie ad internum pertinet hydrocephalum: nam alibi, uti intra duram, et piam matrem, aut intra has, et cerebrum collectum, et stagnans apoplexiam, et soporosos rectius affectus, quam verum hydrocephalum videtur inferre posse. Congestionem autem istiusmodi complures peculiare causas conferre possunt, quas modo percurram.

Hydatides.

Frequentior, et praecipua fortasse est hydatidum in plexu choroide, aut alibi intra cerebrum genitarum disruptio.

§. XLI.

Enumeratio aliarum causarum.

Vitia etiam tum *infundibuli*, tum *glandulae pituitariae* ad id apta a Cl. MORGAGNIO creduntur. Etsi enim VIEVSSENIVS, RIDLEYVS, et LIEVTAVDIVS cauum esse *infundibulum* negauerint, ipse tamen a veterum sententia se dejici passus nequaquam

quam est, et ratum, firmumque habuit, serum ventriculorum per infundibulum deferri ad glandulam pituitariam, atque ab ea absorberi. Quoniam vero nihil certi de infundibuli cauo per experimenta, atque injectiones *) ob tenerrimam partis structuram, et tenuitatem statui potest, nec quidquam adhuc constet, SABATIERIO a) optimo iudice, de vera glandulae pituitariae fabrica, et natura; cur MORGAGNIO summo in rebus anatomicis viro non licuerit suo de hac quaestione arbitrato uti?

*) Nuper infundibulum cauum esse contendit CL. MURRAY, anatomes professor Vpsaliae, ex eo quod in cerebris humanis frigore congelatis offenderit aquam gelu concretam, in infundibulum penetrantem. In eo etiam portionem sanguinis e ventriculis delapsam, non deest, qui obseruarii. At MURRAYO aduersantur CL. GIRARDII anatomes in Parmensi Lyceo professoris repetita experimenta, et tentamina, quibus nunquam potuit concretam gelu aquam in infundibulo deprehendere. Neque satis tutum, rationique consonum esse videtur ex eo, quod sanguis in infundibulo repertus sit, protinus concludere, cauum id naturaliter esse; quia sanguinis, e vasis suis licet elapsi, vis, impulsus, et grauitas tanta esse potest, vt nouum in mollissimo corpore sibi spatium faciat, quemadmodum in medullari cerebri reliqua parte, vbi nullum cauum secundum naturam existat, factum esse a sanguine e suis vasis egresso non semel et nos comperimus, et medicae, et anatomicae obseruationes testantur. Adde, cum GIRARDII obseruationibus consentire etiam diligentissimas disquisitiones, quas nuperrime euulgauit VINCENTIVS MALACARNEVS de cerebri anatome optime meritis. Is experimenta CL. MURRAYI repetens, nullum cauum in infundibulo potuit inuenire. Quare satius erit hanc quaestionem tempori adhuc decernendam relinquere. Sed demus, infundibulum cauum non esse. Attramen ex eiusdem laudati MALACARNEI (*Delle osservazioni in chirurg. Part. 2. p. 45.*) obseruationibus constat, infundibulum, et glandulam pituitariam venis lymphaticis quam plurimis instructam esse, ita vt ille non dubitet, eam in classem glandularum lymphaticarum referre. Hinc sequitur, lympham e ventriculis cerebri per venas lymphaticas ad infundibulum,

lum, et glandulam pituitariam vehi, atque inde in commune receptaculum duci. Si lymphæ refluxum istum aut ab obstructo infundibuli cauo, si est, aut venis lymphaticis ejus infarctis, aut compressis impediri cogites, nonne infundibuli, et pituitariæ usus erit idem?

a) *Traité complet d'Anatom. T. I. p. 498.*

§. XLII.

*Morgagni
Actiologia.*

Itaque concedamus MORGAGNIO, et Veteribus hypothesin de infundibuli, et glandulæ pituitariæ usu. Vtriusque vitia, unde hydrocephalon nasci possit, non valde inter se differre, facile quisque intelliget. Et quod attinet ad glandulam pituitariam, primum consideranda est, inquit ipse, et glandulæ hujus constitutio, ob quam nec aquam recipere, nec eam transmittere queat; nimirum si ipsa deficiat, ut quandoque accidit; si obstruatur; si scirrhusa euaserit; si destructa, et consumpta sit; aut talem aqua ipsa transmittenda spissitudinem, et densitatem acquisiuerit, ut per glandulam trajici nequeat; aut si in eam ingrediatur, ei egredi minime liceat; aut tali acrimonia peccet, ut infundibuli extremos tubulos irriteret, et spasmo fortasse induceto occludat; quod tamen non facile largientur ii, qui nerueam, medullaremque fibram irritabilitatis vi, siue sese ad stimulum contrahendi facultate carere, per experimenta didicerunt. Præterea infundibuli ipsius obstructio, aut fornicis cum laterali ventriculorum basi coalitus, aut validissima compressio efficient etiam, ne e ventriculis ad glandulam pituitariam aqua iter apertum inueniat.

§. XLIII.

Continuatio.

Atqui, animaduertente eodem Cl. MORGAGNIO a), non semper, quamquam glandula pituitaria vitio aliquo affecta deprehenderetur, in ventriculis cerebri

bri plurima aquae collectio reperta est: et contra, illaesa integraque glandula, plurimum quandoque aquae eisdem repleuit. Ergo aliae viae ponantur necesse est, ut idem concludit, per quas serum, quo madent ventriculi, absorbeatur. Si hae obstruantur, aut quacunque alia de causa suo munere fungi nequeant, serum coaceruatur, etsi glandula pituitaria recte se habeat. Si vero pateant, et nihil eis desit, quo ad actionem absoluendam indigent, licet glandula illa vitata fuerit, non tamen tanta fiet feri accumulatio, quanta ad hydrocephalum opus est. Itaque verisimillimum est, tum ejusmodi affectum gigni, cum serum copiosius in ventriculos per arterias exhalantes, aut poros inorganicos emittitur, quam per glandulam pituitariam, aliasque vias, nempe per venas lymphaticas absorbentes recipiatur b).

a) *De sed. et caus. morb. Epist. IV. n. 36.* b) *Id. ibid. Epist. XII. n. 3.*

§. XLIV.

Aliud non nunquam vitium hydrocephalo inter-
no superuenit, videlicet aqueus spinæ tumor, quem <sup>Spina bi-
fida, siue tu-
mor aqueus
spinæ.</sup> nostri *spinam bifidam* vocant. Innascitur hic verte-
bris, atque ex tumente medulla spinali videtur for-
mari. Quilibet spinæ locus hujusmodi malo ob-
noxius est, sed magis inferior lumborum sedes, et
superior ossis sacri pars. SNIPIVS, et SWAGER-
MANNIVS, ut refert PORTALIVS a), tumores hu-
jusmodi viderunt etiam in ceruice, caput magni-
tudine aequantes; nec tamen ullam siue superio-
rum, siue inferiorum partium paralyfin adjunctam
habebant *).

a) *Mémoire de l'Acad. Royal. des Scienc. de Paris an. 1770. 1771. p. 36.*

*) Hujusmodi tumorum delineationes videri possunt
apud RYVSCHIVM *annot. 34. fig. 36.*

§. XLV.

*Notae bo-
rum tumo-
rum.*

Tumores hi extrinsecus prominent, colore sunt naturali, tactui molles, pro vario aegri positu magis, vel minus distenti, aqua pleni, atque admota ex aduerso candela translucidi, quia aqua in iis collecta plerumque limpida est. Si summis digitis premantur, diuisi, et dehiscences in medio inueniuntur. Eorum originem Cl. PLATNERVS a) explicat in hunc modum: cum in *anterioribus cerebri ventriculis* confluit, et exuberat aqua, haec paullatim per *aquaeductum* SYLVII in *tertium ventriculum* descendit, et ex hoc, si nullus pateat in infundibulum *exitus*, per *valvulam maiorem cerebri* prorumpit in *quartum*. Exinde demum sibi viam aperit in medullae spinalis thecam. Id in ipso partu, in quo caput ab vteri ore valentius comprimitur, per saepe contingit.

a) *Instit. Chirurg.* §. 748.

§. XLVI.

*Aqua vel a
cerebro in
spinam de-
scendit, vel
in spina ipsa
congeritur.*

In hoc ipso spinae cauo non tantum ea congeri potest aqua, quae a cranii interioribus partibus defluit, verum ea quoque, quae intra spinam secerni consuevit *). Hinc modo vtriusque hydrops simul concurrit, modo alterius solum, nempe *hydro-rachitis* tam in foetibus, atque infantibus, quam in pueris, adultisque observatur, sed in illis multo frequentius, vtpote quibus vertebrarum ossa non secus, ac cranii ejusmodi vere sunt, vt facile cedere possint, et reapse cedant.

*) Sedem aquae in spina bifida collectae Cl. PORTALIVS observationibus anatomicis confusus in eo esse contendit canali, qui per omnem spinalem medullam decurrit, quique a COLVMBO, et CAROLO STEPHANO descriptus jam fuit, etsi a recentioribus ferme obliuioni traditus, vel negligenter praeteritus: putatque canalem hunc eo
consilio

consilio a natura datum, ut medulla spinalis alterne attolli, siue intumescere, et deprimi, siue subsidere, ut cerebrum, possit. *Mémoire de l'Acad. Roy. des Scienc. de Paris de l'an. 1770. 1771.*

§. XLVII.

Dehiscentibus igitur modo paucis, modo pluribus spinæ vertebrais, atque aqua medullæ spinalis inuolucra vrgente, modo minor, modo major, in posteriore spinæ parte tumor erumpit mollis, præsertim in medio, aqueus, plerumque pellucidus hydatidis instar, interdum semiopacus, hydrocephalo, ut dictum est, non absimilis *). Dehiscunt vero, inquit Cl. MORGAGNIUS a), (quem, quoad possumus, libenter sequimur) ibi potissimum, ubi *sedes futura est processuum, quos spinas vocant, non tantum, ut credunt, quia ibi tunc ossa disjuncta sunt, nam etiam a lateribus sejuncta, qua ad vertebrarum corpora annectuntur, sed insuper* (ut ipse arbitratur) *quia longe minor ad spinarum sedem, quam a lateribus, resistentia est impostorum musculorum, et tendinum.* In foetu enimvero pars canalis spinæ, ubi posterius officula vertebrarum coeunt, mollissima est; nam solis ferme communibus integumentis obuoluitur, neque ossea, sed tantum cartilaginea est, eoque tenuior, et mollior, quo foetus a maturitate magis distat.

Quomodo dehiscant vertebrae.

*) Varia profecto esse potest, ut tradidi, spinæ bifidæ magnitudo. Sed in foetibus vtero contentis, aut in recens natis modo nucis juglandis, modo rapæ mediocri magnitudinem aequare dicitur.

a) L. c. *epist. XII. n. 9.*

§. XLVIII.

Verum haud desunt qui spinam bifidam deriuandam existiment a compressa medullæ spinalis laterali parte, unde nerui egrediuntur; eo quod interdum cum paralyfi artuum conjunctam eam videntur.

Aliae opinionones.

runt. At hi falli profecto videntur, cum vt plurimum, aut certe frequentius paralysis saltem vera, et perfecta absit, aut serius ipsi spinæ bifidæ superueniat. Imo SWAGERMANNIVS a) animaduertit, paralyfin in lucem editis consequi tantum post partum, accedente aliqua causâ procatarctica. Alii demum, vt HEVERMANNIVS b), causâ cum hydrocephali, tum spinæ bifidæ in malam, et præter modum incommodam foetus in vtero positionem rejiciunt. In nimia enim dorfi, lumborumque ad anteriora inflexione vertebrae posterius duci, in tumoremque protuberare sibi non sine veri specie persuadent.

a) *De Hydrocephalo, et spina bifida Amstelod. 1767.*

b) *Vermischte Bemerkungen und Untersuchungen etc. p. 304. vid. LVDWIG. comment. de reb. etc. vol. XV. p. 309.*

§. XLIX.

Cur inferior ossis sacri pars non frequentius tumoribus bisce obnoxia sit.

Iam (§. XLIV.) superiorem ossis sacri partem ejusmodi tumoribus interdum corripì indicauimus. At, quia inferior, exteriorque ejus pars, quæ RVYSCHIO obseruante, secundum naturam quodammodo hiat; non tamen eisdem frequentius obnoxia est; causâ quaerit MORGAGNIUS modo laudatus, eamque esse opinatur, quod crassioris meningis tubus, equinam medullæ caudam cum aliqua aquæ copia, vel secundum naturam continens, ad infimam, hiantemque partem non exporrigitur; fieri tamen interdum, vt morbidæ aquæ vi deorsum vrgeatur, illucque tandem productus extrorsum protuberet, atque ejusmodi tumorem *) faciat.

*) *De Aqueis spinæ tumoribus legi merentur dissertatio FRID. ORTHII de quibusdam Tumor. tunic. externis sub præsidio IO. SALZMANNI habita, et Programma Cl. PLATNERI morb. nov. ann. 1754., et quæ habet Cl. TREWIVS hac super re in Commærc. Litterar. ann. 1741. hebdomad. 20. & 21.*

Diagno-

D i a g n o s i s.

§. L.

Externi hydrocephali notas jam supra (§§. XXXV, XXXVI.) retulimus. *Interni* vero primum genus (§. XXXVII.) dignoscitur, si caput cum aliqua duritie intumuerit, frons ipsa promineat, futurae laxius nectantur *), oculi torui sint, prominuli, humentesque. Item si in mollibus ossium cranii commissuris, praecipue in ea, quae inter occiput, et bregma est, tumores emineant, excrescantque, ut tandem e capite propendere a) videantur.

Notae externi, et interni hydrocephali.

*) Interdum etsi in teneris pueris ab initio morbi futurae diducantur, ossaque cranii laxius colliguntur, aetate tamen prouectiore ita coalescunt, ut capitis tantum magnitudo aucta cernatur. Exemplum referuntur in Dissertatione de *Hydrocephalo interno* ann. 45. Cl. EKMARI, quam infra allegabo.

a) PLATNER. l. c. §. 746. vid. RVYSCH. *observ. anat. chirurg. observ. LII. p. 69. fig. 45. et M. AVREL. SEVERIN. De abscess. nouiss. observat. cap. IX.*

§. LI.

At difficilius est alterum interni hydrocephali genus (§. XXXVIII.) cognoscere, cum nullis exterioribus se signis prodant. In eo autem ex PETITII a) fide, et experientia saepissime haec occurrunt: antecedunt plerumque in pueris difficilis dentium eruptio, aut eorum dolor, verminosae affectiones, lymphae vitia, glandularum conglobatarum obstructions, spasmi, et neruorum distentiones. Neque valde ab his differunt, quae adultis hydrocephalo interno affectis obueniunt. Quicumque autem fuerint huiusmodi malo impediti, leuibus oris, labiorum, palpebrarumque spasticis motibus crebro corripuntur, dentibus identidem strident, labia sibi commordent, nares scalpunt veluti ii, qui a ver-

Secundi generis hydrocephalum internum qui cognoscantur?

mibus

mibus excruciantur, pallent, moerent, languent, aluum habent modo fluidam, modo adstrictam, oculos liuidos, pupillamque dilatatam, siue, vt vocant, mydriasin. Quod si fiant hebetes, et facile in soporem inclinent, memoria pereat, sensusque cum capitis grauitate obnubilentur, non solum de interno hydrocephalo certius iudicare, sed etiam proximam poteris perniciem praesagire.

a) *Mémoir. de l'Acad. Royal.* 1718. p. 121. Similia recenset SWIETENIVS §. MCCXVIII.

§. LII.

*Fothergilli
observationes
ad diagnosin.*

Non praetermittam hic commemorare quae ad rem habet JO. FOTHERGILLIVS a). Is enim iteratis, multisque obseruationibus practicis edoctus, non dubitat affirmare, internum hydrocephalum raro fieri ante tertium aetatis annum, vt plurimum vero intra quintum, et decimum, rarissime demum tardius *); saepe in ea aetate sub dentitionis, aut verminosae affectionis specie, quemadmodum paulo ante (§. LI.) ex PETITI testimonio monuimus, ludere, donec auctis symptomatibus eo perueniat, quo remediis nullum locum relinquat, aut certe non obtemperet. Signa tamen, quibus innotescere potest, esse in primis cephalalgiam, dolores crurum, somnos breues, et turbulentos, pulsus inaequales, et inconditos, palpebrasque oculorum ita diductas, vt albugineae magna pars detecta appareat. Nos quoque, si nostram experientiam adducere fas est, similia admodum obseruauimus, et praecipue quando jam malum adoleuit, et summum attigit culmen, atrocissimos capitis dolores, modo vniuersim diffusos, modo ad partem vnam hemisphaerii instar restrictos, coma vigil, perpetuos questus, tremores artuum, mentis emotiones, et, quod maxime velim attendendum, aphoniam subinde recurren-

*Confirmatur nostra
experientia.*

currentem, siue loquendi impotentiam identidem redeuntem, et decedentem: pulsus autem modo raros, et magnos, modo celeres, et paruos, et summopere varios, modo etiam frequentes, et febriles **).

a) *Medical observations, and inquiries by a society of Physicians in London* Vol. IV. p. 40. Vid. excerptum in *Commentar. de reb. in scient. natural. et medic. gest. Vol. XVIII. p. 390. 392.*

*) Rarum exemplum hydrocephali interni chronici cum sectione cadaueris, quod in puella sex mensium se prodere incepit, et vsque ad annum aetatis quadragesimum quintum, in quo repente ipsa obiit, perstitit, videatur in dissertatione quadam CAROLI D. EKMARE, quam iste sub praesidio SAMVELIS AVRIVILLII publico examini submitit Vpsalæ 1. Iun. 1763. Exstat in *Theſaur. Dissertation. SANDIFORTII* Vol. 2. pag. 325.

*) Hydrocephali interni, et acuti, vt illud a lento, et chronico distinguam, historiam etsi breuem, et non absolutissimam, qualem accepi ex ore ejus, qui curationi praefuit, cum sectione cadaueris hic referre non erit inutile. Puella quadriennis, caput habens magnae molis, temperamento sanguineo, et bono corporis habitu praedita, antehac tussi rheumaticae pluries obnoxia, coepit de dolore capitis subinde conqueri. Quadam die repente subriguit, et post frigus, et horrorem incaluit non exigua febris prehenſa. Ducta ei aluus est eccoproſtico antiphlogistico; sed febre adhuc proſequente, miſſus poſtea etiam e vena ſanguis. Febris interdum inaequaliter incedens ſaepe inualeſcebat, et viciffim ſe ſe remittebat, numquam ad apyrexiam perueniens. Poſt miſſum ſanguinem melius habuit, ita vt non modo paulatim febris euaneſcere videretur, verum e lecto etiam ſurgeret, cibumque et appetere, et paullo largiorem per aliquot dies aſſumeret. At dolor capitis numquam eam penitus reliquit, nec pulſus ad naturalem omnino motum rediit: inaequaliter enim, et celerius micabat. Tandem quatuor ante mortem diebus febris iterum acceſſit, auctusque eſt capitis dolor ſic, vt primum deliraret, deinde motibus conuulſiuis faciei, et demum artuum ſubinde corripere. Poſtremo reſoluta et vno corporis latere, ſtertens, et ſenſibus orbata vixinti quatuor amplius horas tranſegit, et nequidquam iuuantibus

bus epispasticis, antiphlogisticis, et revellentibus quibus-
cunque medicamentis, misere vitam cum morte commu-
tauit, die nimirum decima septima, ex qua morbus inci-
pere visus est; quarta vero, ex qua febris et capitis dolor
recruduit. Sectioni anatomicae ejus cadaver opportunè
ab obitu tempore traditur. En quae parentum defuncti
amicissimus KAVINA, strenuus militum praetorianorum
chirurgus primarius in ea inuenit, mihiq; scripto retulit:
Aperto cranio, dura mater densa, et colore subcaeruleo,
viri esse in pueris ob cerebri molem, et vasorum subter po-
sitorum transparentem nigredinem soler, apparuit. Ejus
vasa sanguinea, itemque piaë matris, et cerebri ipsius tur-
gida admodum, et sanguine plena, et prae ceteris sinu-
omnes venosi, qui praeter modum eo tumebant. Retra-
ctis meningibus exterior sinistri anterioris cerebri lobi fa-
cies obtegebatur concreto tenui quodam humore trans-
lucido, et flatu, qui gelatinam aemulabatur. Ventriculis
magna vis aquae inerat, qua turgebant. Haec in capite.
Thorax deinde resecratus est. In anteriore pulmonis dex-
teri parte mox occurrit tuberculum, ex quo secto, et ex-
presso aliquid humoris lymphatici prope ad drachmas duas
prodiit. Supra eundem pulmonem concreuerat mucosus
humor quidam flavescent gelatinosus. In sinistro pulmo-
ne duo reperta tubercula fuere, quae pus foetidum ex-
pressa fundebant. Extrinsecus ejusdem faciem foedabat
macula violacea nigricans. Vasa pulmonica vix quidquam
sanguinis continebant. Auricula vero dextera polypo
magno occupabatur, et eo maxime intumuerat. Abdomen
non fuit dissectum. Haecenus KAVINA.

§. LIII.

*Hippocrasis
descriptio.*

Nemo autem accuratius HIPPOCRATE descrip-
sisse hunc morbum videtur; nam hisce verbis eum
expressit: *si aqua in cerebro fuerit, dolor acutus per
incipit, et tempora emergit, alias alio loco; et rigor,
et febris alias, et regiones oculorum dolet, et caecutit,
et pupilla finditur, et ex uno duo se videre putat, et
si surrexerit, vertigo ipsum corripit, et ventum non
sustinet, neque solem, et aures tinniunt, ac inter au-
diendum strepitu offenditur, et vomit salivam, et
pituitam, quandoque etiam cibos, et capitis cutis ex-
tenuatur,*

~~timetur~~, et contactu gaudet a). Quae omnia fere eadem sunt cum iis, quorum ex PETITI, aliorumque observationibus mentionem fecimus. Tum autem ista plerumque obseruanda occurrunt, quando repente morbus circa pubertatem corripit, ut saepe nos ipsi vidimus. Animaduertendum tamen est, nullum ex hisce signis (§§. LI. LII. LIII.) pathognomonicum esse, neque ex iis aliquid colligere singillatim licere; sed oportere, ut, nisi omnia, plura saltem vna conueniant, et antecedentia cum consequentibus exacte consentiant. Singula enim aliis, atque aliis morbis, et causis communia esse possunt. Interdum etiam dolorem abesse, aut sensum potius grauitatis, quam doloris excitari, magisque in veternum aegros procliues esse, interdum contra; prout lentius aqua congeritur, aut celerius effunditur; prout copia magis, aut acritudine laedit *).

a) *Lib. II. de morb. n. 15. edir. Marinell.*

*) Exstat IO. RVD. ZWINGERI in *Act. Helvet. Vol. I. Cap. I. dissertatio de hydrocephalo* lectu dignissima, in qua non solum illius exempla vndique collegit in vnum, sed etiam diligenter, et ordinate inter se comparauit auctor.

§. LIV.

Qui aqueis spinae tumoribus laborant, his quandoque pedes resoluuntur. Sed tunc, si recens nati, aut infantes fuerint, pedes, siue crura incuruantur ~~tumoribus~~, et plerumque interiora respiciunt, quia in eo positu, quem in vtero tenuerant, remanent, et simul macie ob nervorum vim deficientem tabescent. Si serosa colluies soli spinali medullae insideat, superiora, de quibus paullo ante retulimus, hydrocephali signa desiderantur. Si vtri-
 que loco, illa cum his concurrant necesse est. Praeterea si casu, aut data opera tumores isti aperiantur, et lympham effundant, sicque caput leuetur,
 aut

Signa spinæ bifidae.

aut detumescat, aut, cicatrice obducta, iterum turgeat, excrescatque, certum indicium habebis communem esse vtriusque morbi, videlicet spinæ bifidae, atque hydrocephali sedem, et causam.

Prognosis.

§. LV.

Recens, aut incipiens hydrocephalum externum.

Hydrocephalum externum, atque ex caussis evidentibus ortum inter initia curatu non admodum difficile est. Vbi vero inueterauit, et cum malo corporis habitu complicatur, vix vlllo potest artis

Internum.

Spina bifida.

Incisio tumoris aqualis mortifera.

auxilio tolli. Internum quoque omnem fere spem adimit curationis. Spina vero bifida non diu trahitur; ea enim impliciti breui intereunt, eoque citius, quo magis arte eos volumus adjuuare. Incisio tumoris mortifera est, quidquid contra non nulli in ejus commendationem excogitauerint. Exitium autem ab aëre potius ingrediente, quam a nervorum laesione repetendum arbitratur SWAGERMANNIVS a).

a) L. c.

Curatio.

§. LVI.

Excreciones omnes promouendae.

Vt hydrocephali externi curatio chirurgiae committenda est *), sic a Medicis requirenda quae interno subueniat. FOTHERGILLIVS a) talem ab initio esse debere ait, qualis vermibus adhiberi solet, sed vt proficua euadat, excretiones singulas prouocandas esse. His enim vasa venosa, id est lymphatica, ob inanitionem bibaciora sunt, humoremque intra cranium, et intra cerebrum effusum avidius resorbent. Diuretica in primis, et alium laxantis proponit GVILIELMVS WATSON, quorum praestantiam comprobant facta pericula b).

*) Externi

*) Externi curati exempla videantur apud CAROLVM PISONEM *de serosa colluvie* P. I. *sect. 2. cap. 1. pag. 42.*, apud MORGAGNIUM l. c., aliosque. Cl. CALLISENIUS paucis se expedit de externi hydrocephali chirurgica medela. *Morbus*, inquit, *jam adultus medelam plerumque spernit; sentanda tamen est curatio medicamentis topicis efficaciter discutientibus, et roborantibus, vinctura simul prudenter adhibita: quibus solis, nihil efficientibus scarificatione, vel vesicatorio, vel setaceo, subducendus est humor. Instit. Chirurg. hodiern. p. 114. §. CCXCIII.* Sed his manum addat interior curatio.

a) L. s. b) Observationes referuntur etiam in *Comment. de reb. in sciens. natur. et medic. gest. Vol. XVIII. p. 392. et p. 403.*

§. LVII.

Itaque aluum ducere oportet jalapio, syrupo de *Quibus al-*
 spina ceruina, de cichoreo cum rhabarbato, de *vus laxanda.*
 manna, aliisque, quae serosos humores euacuant;
 atque ista pluries, interposito aliquot dierum inter-
 vallo, subinde iterare. Mediis autem diebus intrin- *Diuretica.*
 secus dare ea, quae aperiunt, vrinamque mouent,
 uti sunt oxymel, aut vinum scilliticum; aselli prae-
 parati; liquor cornu cervi succinatus; tinctura
 tartari, antimonii, succini; succus petroselini, aut
 lupulorum; gummi ammoniacum; decocta ex radi-
 cibus *diureticis*, praesertim curcumae, et rubiae
 tinctorum; ex ligno sassafras, junipero, guaiaco;
 conserua baccarum juniperi, fructuum cynosbati,
 siue rosae caninae, atque alia hujus generis. Nec *Mercurialia.*
 alienum est cinnabari, et mercurio ipso uti, si res
 postulat, imo, cum summa atonia solidarum par-
 tium, inersque natura malum foueat; tonicis, et *Tonica.*
 roborantibus.

§. LVIII.

Si tumor capitis, ubi adest, discuti his coepit, ex- *In eo, quod*
 trinfecus etiam fricatione subinde, aut fotibus aro- *cum externo*
 maticis, aut emplastris impositis quod superest re- *conjugitur,*
quae exterior
curatio com-
feras.

'Spina bifida non operianda.

Setaceum nuper propositum.

solui debet; et praesertim fascia idonea flaccescens caput firmari. Vtiliter quoque occiput conciditur, aut ferro ignito aduritur, aut contortus sericeus funiculus per cutim, quae in posteriore colli parte est, trajicitur, vt diutissime pus moueatur (setaceum nostri vocant), aut cantharidibus lata ulcera alicubi excitantur. Tumores autem spinae, aut ossi sacro adnati ne sectione aperiantur, cauendum est. Cito enim post sectionem, aqua affatim effluente, convulsiones, deinde mors, vt monuimus, subsequuntur. Imo curandum etiam est, RVYSCHIO tradente, ne sponte etiam disrumpantur. Idcirco admodum suadentur tonica, et adstringentia. Vt ergo sectio adeo noxia vitari posset, et nihilominus aquam sine discrimine educeret, nuperrime in thesi quadam publica, cui titulus: *An spinae bifidae setaceum?* sectioni praefereendum *setaceum* proposuit MATHEYVS a), cautione adhibita, vt funiculus foramen pene oppleat, nec sinat, nisi guttatim, aquam exstillare. Itaque huiusmodi consilium, vtpote quodammodo rationi consonum, tentandum plane videtur. Quid enim in tanta opis inopia non expectandum?

a) *Séance publique de la Société Royale de Médecine de Paris tenue le 9. Décembre 1779. p. 32.*

§. LIX.

Hydrocephalum in seruum acutius nulla ope laesur.

In ea autem hydrocephali interni speciei, quam (§§. XXXVIII. LII.) descripsi, et acutam et vehementem vocavi, nullum artis efficacius auxilium quidquam vnquam profuisse, experientia didici. Nihil, etsi febris vehemens, et capitis dolor vrgeret, solatio fuere sanguinis missiones, hirudinum, cucurbitularum, aut cantharidum applicatio, balnea, fots, epispastica pedum plantis admodum, aliis-

ne partibus, nec ipsa resoluentia, nervina, paregorica, aut alia cuiusvis facultatis.

§. LX.

Generatim dietetico potius regimine confidendum est, ne morbus incipiens celerius prouehatur ad ultimum gradum, vel jam prouectus citissime enecet. Itaque magni interest a glutinosis, pinguibus, acidis quibuscunque abstinere, leui exsiccantique cibo vti, parcissime bibere, decoctum radicis contrayeruae, vel corticis ligni sassafras, vel radicis sariaeparillae, aut bardanae in leuiori morbi pigrioris gradu, et spem aliquam adhuc salutis relinquente, potui dare, leniter exerceri, in aëre sicco, puriori, montano versari, et degere *).

*) Non erit inutile, nec inuicundum consulere *Dissertationem de hydrocephalo, quam pro gradu Doctoris defendit IOHANNES HENRICVS GAUDELIVS, Göttingae, 16. Decemb. 1763. Exstat in Thesaur. dissertat. Cl. SANDIFORTHII Vol. 2. p. 337.*

CAPUT III.

DE AGRYPNIA, SIVE PERVIGILIO.

§. LXI.

Longam, et praeter naturae modum protractam *Definitio agrypniae.* vigiliam, ex qua vires corporis animati, et praecipue ejus functiones laeduntur, *Αγρυπνία* *), * *Agrypnia.* pervigilium, et vigiliationem vocamus, vt a naturali, breui, atque innocua distinguatur.

§. LXII.

Pendere ipsa videtur ab eo *sensorii communis statu, qui in vigilantibus esse consuevit, sed violento magis, magisque perstanti, et continuato. In re obscurissima fas erit, vt aliqua hujusmodi status* *Hypothesica explicatio.*
D 2 imago

imago adumbretur, effingere, cerebri fibras ita tendi, aut moueri, vti tenduntur, aut mouentur, quando sensationibus recipiendis, reliquisque animi functionibus promte; et viuide obeundis paratissimae sunt, neque proinde relaxari, aut conuiuiscere posse, prout ad somnum requiritur, nisi aeger rime *). Itaque omne id, quod *sensorium commune* tendere, vellicare, aut quocunque modo commouere, atque exagitare diu potest, poterit etiam causam asserre agrypnae.

*) Quamquam *irritabilitatem Hallerianam* a nervis abesse plurima experimenta cum HALLERI, CALDANII, FONTANAE, tum aliorum percelebriorum virorum capta in viuus experimenta demonstrauerint; nihilo tamen secus nervorum vis, atque actio concipi haud potest, nisi in eis, eorumque origine motus quidam, quicumque demum in fuerit, mente saltem, sin minus sensibus, percipiendas constituatur. Apposite admodum Cl. GAVBIVS, (*Patholog.* §. 524.) *verosimillimum*, inquit, *est, systema nervosum, qua sensui praest, vi quadam motrice animari, vitali, muscularique forsitan aequiparanda, qua agente stamina ejus tendi, rigescere, surgere, concipiendis ad irritamenta oscillationibus aptari queant, vicissimque remitti, ac flaccescere, cum oriatur. Nec refert, utrum a spiritu, quem vocant, animalis per nervos diffuso, eandem repetat, an quoquo glorio modo ab ortu putes inditam, necumque in re obscura opinando nihil augureris; et reliq. usque ad §. 526. ubi demum prosequitur: Quamquam igitur quae in sensoriis ciuntur agitationes, motibus musculorum longe minus manifestae sunt; facit tamen summa medullarum nervosarum teneritudo, ut haec vel grauius etiam, certe nihilo leuius, ab immodica exercitatione affici, mutarique debeat, quam muscoli ab excessu motus animalis; nec dispares inde contrahere laesiones. Molliissima nimirum stamina, quobis demum modo frequentius, diutius, vehementius commota, inter se attritu lassantur, tonum amittunt, tremores irregulares iniussos concipiunt, concitantque praeter ordinem in vicinis, spasmus velut obtingunt, vis ipsa nervosa elanguescit, dissipatur. Ex quibus, nisi tempestiua requie leuantur, sensuum externorum, internorumque hebetudo, impotentia, idearum confusio, somni turbulenti, pernickilium, imaginatio deprauiata, delirium, furias.*

tuistas. An et quae musculis assiduo labore euenit siccitas, rigiditas, in his quoque organis nasci potest, qua facile vitium in facultates mentis ante tempus inuehatur? Neque a GAVBIO dissentiant alii, et in primis BIENVILLIVS, qui, ubi caussarum alteram, a qua nymphomaniam, siue furorem veterum deriuat, nempe nimiam sensibilitatem commemorat, ita scribit: celle qui vient du vice des fibres nerveuses des parties organiques, qui reçoivent une vibration plus vive, soit par leur delicateffe, ou leur tension, soit par la delicateffe et la tension reunies l'une à l'autre, ce qui leur donne une sensibilité bien plus vive. Nymphoman. p. 51. Amsterdam. 1772.

§. LXIII.

Cujusmodi sunt animi pathemata acriora, nimia neruorum sensibilitas, sanguinis insolita agitatio, in cerebrum validior impulsus, acritatum varia genera, dolores, inedia, ventriculi irritans repletio, flatus, cruditates, hypochondriaca, hysterica, melancholica passio, sanguinis densatio, siccitas, aut inflammatoria diathesis, febris, viscerum quorumcumque labes, et cum cerebro consensio, solidarum partium rigiditas, et senectus. *Caussae.*

§. LXIV.

Saepeffime igitur *secundaria* est, aut *symptomatica*. *Differentiae.* Interdum tamen *primaria* occurrit, ac proinde peculiari sermone egebat. Hinc variae differentiae permanent, quot nimirum caussae eam efficiunt. *Secundariam* et *symptomaticam* denotant praegressi, aut praesentes morbi, quos subsequuta est, vel uti symptoma comitatur. *Primaria* vero ex accurato examine eorum omnium, quae antecesserunt, et una conjunguntur, facile patebit, praesertim si *secundariae*, aut *symptomaticae* signa deficient. plurimum ad id conferet caussarum, quas recensuimus, praesentium, aut absentium apta consideratio.

P r o g n o s i s.

§. LXV.

*Effecta a-
grypniae.*

Agrypnia ex leui, et fortuita caussa, cito, et facile discutitur. *Secundaria* non ita; nec *symptomata* vt plurimum desinit, nisi morbo principe, qui eam inducit, deuicto, aut valde mitescente. Quae hypochondriacos, aut hystericas insectatur, etli plerumque expers periculi, diutina tamen, et pertinax esse consuevit. Quacumque vero ex caussa oriatur, si diu trahitur, capitis grauitatem, dolorem, anxietatem, moerorem, lassitudinem, dyspepsiam, anorexiam, maciem, delirium, maniam, phrenitidem, apoplexiam, vertiginem, neruorum distentionem, aliaque pessima mala, vnde exitium superueniat, post se arcessit. Jure igitur, et merito scripsit HIPPOCRATES: *Somnus, et vigilia, utraque modum excedentia, malum a). A vigilia conuulsio, aut delirium, malum b). Peruigiles cum aliis signis, in conuulsionem tendunt c).*

a) Aph. 3. sect. II. b) Aph. 18. sect. VII. c) Conc. n. 20.

C u r a t i o.

§. LXVI.

Vt in quolibet morbo, sic in agrypnia curanda semper ad caussarum diuersitatem respicere oportet. Quod attinet ad *secundariam*, et *symptomasticam*, de utraque nihil addam iis, quae sparsim alibi jam tradita sunt, tradenturque etiam deinceps opportunis locis. Tollitur autem, mitigatis, aut penitus domitis morbis, quorum ea effectus est. *Primariae* vero generatim omnia, quae humectant, refrigerant, et temperant, accommodatissima perhibentur. Balnea ideo tepida, in quae aut pedes, aut vniuersum corpus demittantur, saepe contumacissimas

Humectantia, et refrigerantia.

Balnea.

simas

firmas vigilias arcent. Quibusdam remedio est a *Abstinensia*
coena abstinere, aliis coena vti, non nullis aliis, an- *a coena.*
tequam cubitum eant, aquam frigidam, aut emul- *Aqua fri-*
sionem, quam vocant, aut lac, aut ejus serum bi- *gida.*
bere.

§. LXVII.

Sed si plethora, aut sanguinis feruor excedat, aut *Sanguinis*
suppressae euacuationes antecefferint, aut timor *missio.*
inflammationis immineat, proficuum est sanguinem
mittere. Primarum viarum cacochylia lenia ecco- *Purgatio.*
protica postulat. Molestae animi curae fugantur *Atque alia*
jucundo amicorum sermone, musicis concentibus, *auxilia.*
corporis exercitio, labore, peregrinatione, vino,
anodynis, opio. Neque silendum est, aliquando
moderatum veneris vsum vegetioribus, et conti-
nentissimis profuisse.

§. LXVIII.

Nimia sensibilitate praeditis, aut animo anxiiis *Paregorica.*
paregorica, et sedantia opitulantur, de quibus plu-
ries jam retulimus. Praecipue in his eminent flo-
res nymphaeae, violarum, et papaueris rhoeados,
camphora, moschus, liquor anodynus mineralis
HOFFMANNI, capita papaueris albi, syrupus de me-
conio SYDENHAMII, ejusdemque laudanum liqui-
dum. Matronam noui, cujus tanta erat sensibili-
tas, vt nunquam somno indulgeret, nisi guttas vi-
ginti, aut triginta liquoris anodynini mineralis ex
aquae frigidae haustu cubitum itura assumeret; id-
que jam a multis annis experiebatur. Qui e sto- *Stomachica.*
machi imbecillitate, malaque ciborum coctione vi-
gilant, his amaricantia, et roborantia, vt vocant
stomachica, somnum conciliant. E gratiori mor- *Convalescen-*
bo, in quo caput vehementer aegrotauit, conuale- *tibus quae-*
scentes non raro permolesta vigilia tentantur. His *nam remedio*
interdum assae foetidae, aut sagapeni, aut galbani *sint.*

tantillum vesperi datum, et ad aliquot dies prudenter repetitum somnum restituit; frequentius tamen paullo liberalior victus, quo scilicet sanguis, reliquique humores nouo, recentique succo temperentur, et paullatim resarciantur.

§. LXIX.

*Regimen
diaeteticum.*

Ceterum in peruigiis ejusmodi, praesertim primariis, exulare debent omnia, quae morbi causas fouent; itemque calefacientia, liquores fermentati, decoctum *café*; quod tamen neque omnibus nocet, neque desunt, quibus contrarium effectum pariat. GUILLELMVS PISO narrat, nobilem foeminam solo potu *café* ad somnum se componere fuisse solitam. Somno itidem arcessendo vniuersim conferunt aquae leniter cadentis murmur, dulcis loquentium, aut legentium susurrus, aut contra summa circumquaque procurata quies, et silentium.

CAPVT IV.

DE APOPLEXIA.

§. LXX.

* *Apoplexia.*

Contrariam agrypniae affectiones aggredimur explicare, *Ἀποπληξία* *) nimirum, variosque soporis, stupiditatisque gradus. Sed, antequam ultra proueamur, animaduertendum censeo, *apoplexiam* diuersis saepe nominibus comprehendi solitam esse a scriptoribus. Atque vt aliqua hujusce variationis nominum adducam exempla, praenotabo, ab HIPPOCRATE alicubi a) *aphoniam*, a C. CELSO *neruorum resolutionem* b), a JOD. LOMMIO *morbum attonitum* c), ab aliis *apoplexiam* etiam, *fiderationem*, *percussionem* d), a nostris vulgo *colpo*, *gocciola*, *accidente* eam appellitari.

a) *Lih.*

a) *Lib. IV. de vict. ratione, et aph. 51. sect. VI.* b) *Lib. III. cap. 27.* c) *Observ. med. l. II. p. 81.* d) *IO. BAPT. MOLINARIUS De Apoplexia sect. I. §. 3.*

§. LXXI.

Apoplexia autem idem sonat, ac latinis *percussio*, ^{Nominis significatio.} unde fortasse profluxit *ictus sanguinis*, quo ad eam significandam vsi sunt *SEXT. AVRELIVS VICTOR* a), atque *EVTROPIVS* b) de morbo *LVCII VERI* mentionem facientes. Percussi enim veluti fulmine subito concidunt, et resoluuntur, qui ea correpti fuere c). *C. CELSVS* de ea loquens, *interdum*, inquit, *tota corpora, interdum partes infestat. Veteres auctores illud ἀποπληξίαν **, *hoc παραλύσιν ***) ^{* Apoplexiam. ** Paraly-} *nominauerunt, nunc utrumque παραλύσιν appellari* ^{fin.} *video* d). Proxime ad *C. CELSI* mentem accedere videtur *ARETAEVS*, ubi scripsit: *Apoplexia, paraplegia, parēsis, paralysis omnia genere eadem sunt; aut enim motionis, aut tactus, aut utriusque defectus est; interdum et mentis, interdum et reliquorum sensuum. Sed apoplexia totius quidem corporis et sensus, et mentis, et motionis resolutio est e*). Verum non solum vniuersi corporis resolutioni, sed aliquarum etiam partium paralyti nomen apoplexiae tributum est cum ab *HIPPOCRATE*, tum ab ejus discipulis, ut videre est, ubi linguae, aut brachii, aut partium vnius lateris, aut corporis, aut cruris *apoplexiam* memorat f).

a) *Marco Antonin.* b) *Histor. Roman. l. VIII.* c) *COEL. AVRELIAN. Acut. morb. l. III. cap. V.* *NICOL. PISO l. I. cap. 16.* d) *Lib. III. cap. 27.* e) *Lib. I. cap. 7.* f) *Aph. 40. sect. VI. Proreth. l. 2. c. 10. Coac. Praenot. ex DVREXI recension. p. 215. n. 13.*

§. LXXII.

Ut nomina apoplexiae, sic definitiones ab aucto- ^{Definitio.} ribus traditae discrepant inter se. Sed neque *ARE-*

Apoplexiae **TAXI** (§. LXXI.); neque aliorum definitione fati-
legitimae, et eam a syncope; aut a morte ipsa discriminari an-
uniuersi cor- maduertunt plerique a) ex neotericis, nisi respirati-
poris. nem, et cordis motum superstitem adjunxeris. Quae
 propter *fortem* apoplexiam, siue *legitimam*, atque
uniuersi corporis rectius sibi videntur definire *sui-*
tam sensuum cum internorum, tum externorum,
tuumque a voluntate pendentium abolitionem, super-
stite cordis micatu, et respiratione, sed interdum
brevi, ut fere in ipsa accessione defuisse videatur. In
 ea enim, quam *fortissimam*, seu vehementissimam
 vocant, nemo non nouit vtramque, cordis nempe,
 et respirationis actionem suppressi, atque extingu-
 ac proinde eodem prope momento, quo morbus
 iste adoritur, vitam omnem deleri, aut sic imminui,
 vt prorsus deleta videatur. Quaecumque demum
 fuerit haec sensuum, et motuum cessatio, aut inter-
 ceptio, eam cerebri, neruorumque praecipua culpa
 fieri oportet, vt a morte, aut syncope, quae ab aliis
 causis, vitiisque praecordiorum pronascitur, op-
 portune segregetur.

a) SWIETEN. §. 1008.

§. LXXIII.

Definitio
Morgagnii.

Jure igitur apoplexia visa est Cl. MORGAGNIO in-
timorum, qui in cerebro fiunt, motuum (cum vigiliis
mouemus, sentimus, cogitamus) repentina, aut certe cele-
ris imminutio, tanta interdum, ut proxime ad cessationem
accedat, aut in cessationem continuo transeat a). Statur
 enim uero ac corripit, quando exquisita, et vehemen-
 tissima est, vel omnem vitam adimit, vel cordis, at-
 teriarumque motum plus, minusue perturbat; re-
 spirationem reddit difficilem, variam, magnam, in-
 ram; inaequalem, et plerumque cum stertore, et
 roncho conjunctam; sensum, et motum animale
 penitus aufert, vel horum leuissima relinquit indicia.

Hic vehe-
mens, et for-
sis intelli-
tur.

a) De sed. et caus. morb. Epist. II. n. 5.

§. LXXIV.

§. LXXIV.

Qui igitur hujusmodi morbo proster nitur, pro- *Descriptio*
 inde dormientis, stertentisque hominis speciem *apoplectici.*
 hibet, membris prolabantibus, ac resolutis; ore
 lante, et spumam interdum emittente; oculis mo-
 do apertis, languidis, et saepe conuulsis, modo om-
 nino clausis; facie quandoque turgida, coloratiore,
 aliquamdiu sanorum simili, quandoque cito subsiden-
 te, et pallore suffusa, calore alias superstita, alias a)
 leperdito. Animaduertendum insuper est, saepissime
 in vno latere corpus conuelli, dum in altero resol-
 utur, aut resolutum jam est, sicque aliquamdiu per-
 stare, antequam vniuersum sensu, motuque priuetur.
 Quod ita crebro incidit, vt Clinicorum vix quem-
 piam esse putem, qui centies illud non obseruauerit.

a) IO. BAPT. MOLINAR. l. c.

§. LXXV.

Causa proxima vel satis ex §. LXXIII. patuit, vel *Causa pro-*
 in ablato consistit commercio, quod inter corticem *xima.*
 cerebri, ejusque medullam, aut inter medullam, et
 reliquas corporis partes sensui saltem, et motui vo-
 luntario dicatas intercedit; quaecunque demum cre-
 datur istius commercii obscurissima ratio. Quae vero *Causae,*
 hujusmodi commercium abrumpunt, et tollunt, mul- *quae proxi-*
 tae, et variae esse possunt causae; at commodissime *mas effi-*
 diuiduntur in eas, quae sensibus imperuiae sunt, et *ciunt.*
 tantum conjectura, et cogitatione effingi, et com-
 prehendi possunt; atque in eas, quae sub sensus ca-
 dunt, et per anatonem intra cranium deteguntur,
 quaeque plerumque in sanguine, aut ejus sero con-
 sistunt, nonnunquam in aliis, sed rarioribus vitiis a).

a) MORG. l. c. ep. II. n. 5.

§. LXXVI.

Vt vero ab iis exordiamur, quas apoplecticorum *Causae per*
 anatome reuelauit, certissimum est ex WILLISII, *anatonem*
 WEPFE- *indagatae.*

WEFFERI, VALSALVAE, LIEVTAVDII, MORGAGNII a), aliorumque observationibus; caput in daveribus eorum, quos apoplexia exstinxit, plerumque tumidum repertum esse; vasa omnia tam meningum, quam cerebri, cerebelli, et medullae longatae sanguine congesto plena, et praeter normam turgentiora; plexum choroidem varicibus distentum, aut decolorem, hydatidibusve scatentem sanguinem, aut serum, aut utrumque simul effusum in ventriculis, in ipsamet cerebri medulla interdum cauum, ubi nullum natura posuit, formans, intraque meninges, et cerebrum collectum; aquam item intra calvariam, vel intra duram et pia materem, copiosiore ad basin cranii, quae saepe in tubum spinalem penetraverit; *glandulas* quamdam speciem aquae loco omnia cerebri caua opplentem; vlcera *); puris effusiones; abscessus; tumores varii generis cerebrum, cerebellum, medullamue oblongatam occupantes; glandulam pinealem mole auctam, et praeduram; velamenta cerebri nimis tensa, aut contra nimis laxa, aut alter labefacta; cerebrum ipsum modo flaccidum, modo corruptum, aut durius, solidiusque, quam par est; aërem euolutum, extricatum, cerebri vasa obstruentem, vel intra cerebrum, ejusque inugera adactum b); et demum variam horum vitiorum complicationem, quae frequentissima esse consuevit. Inuentas etiam in vasis meningum, earumque sinibus polyposas sanguinis concretiones rerunt plerique; at Cl. MORGAGNIO nimis paucae et rarae ejusmodi observationes, et saepe cum alii vitiis conjunctae visae sunt, ut valde dubitarum solae pro apoplexiae causis haberi possent.

a) Vid. WILLIS *De cerebr. anat. et morb. convuls.* De anim. Brutor. P. 2. cap. 2. de apoplexia. IOH. IACOBUS WEFFERI *Historia apoplectic. cum alior. celebr. medic. obser.* variis

tion., *historique variis.* Venet. 1759. BONETTI *sepul-*
chris. anatomic. lib. 1. sect. 2. MORGAGN. *opor. citat.* Ep,
 [l. IV. et V. LIEVTAUD. *Précis de Médecin.* l. 1. des ma-
ladies de la tête p. 181. *Histor. anatomic. Médic.* T. II. l. 3.
 *) in scorbuticis praecipua viscera hujusmodi observata
 sunt a CL. BOUCHIERO, *Observat. de apoplex.* Vid. *Re-*
ueil d'Observat. de Médec. T. 46. p. 444.
 b) MORGAGN. l. c. *epist.* V. MOLINAR. l. c. c) *Epist.*
V. n. 23.

§. LXXVII.

Ista quidem (§. LXXVI.) praecipua sunt vitia, *Externas*
causae vio-
lentes.
 nae in apoplecticorum capite inuenta ad apople-
 iam inducendam sufficere haecenus sine controuer-
 ia et credita fuerunt, et rationis, experientiaeque
 ulcimento firmantur. Reliqua porro, quae exter-
 na vis intulit, per se ita manifesta videntur, ut ne-
 mo de iis dubitare debeat: a causis enim violen-
 tis, atque evidentibus permanant, et sensibiles
 ioxas, laesionesque capiti, et cerebro illatas osten-
 unt. Ad horum igitur classem pertinent validae
 apitis concussionēs; ictus; vulnera alte penetran-
 tia, calvariae fracturae, comminutiones, fissurae,
 liqua ejus particula depressa; aliaque id genus.

§. LXXVIII.

Nonnulla alia supersunt, quae intus genita, non *Causae*
aliae inter-
nae iidem
animaduer-
sae.
 imentalia videntur, ut certo affirmari possit, per
 sola vnquam ad apoplexiam satis idonea fuisse.
 hujusmodi dicuntur mala capitis conformatio; exo-
 ses interiora versus protuberantes; futurarum
 solitio; durae matris aucta crassities, aut rigiditas;
 la messoria cartilagineam, aut osseam naturam
 lepta *); calculi sinibus, praesertim *longitudinali*,
 geniti; vasorum et sinuum concretio; varicosa,
 que aneurysmatica dilatatio; carotidum ossea, aut
 rtilaginea durities; jugularium venarum compres-
 sio,

fio, aut innituta, et coarctata praeter naturam diametros **).

*) Vid. MORGAGN. *Epist. anatom. medic.* III. n. 41.

**) In actis Academiae R. Scientiarum Suevicae 1757. Vol. XVIII. PETRVS ZETEMALVS refert de eadem adolescente, qui, dum saepius deorsum et sursum per tonis ludens deprimeret, et eleuaret, collo nimirum per collare constricto, subito concidit vere apoplectico. Laxato vero collari, et vena secta ad se feliciter restitutis sensibus et motibus, quos omnino perdidit.

§. LXXIX.

Laesio cerebri interdum non conspicua.

Itaque cum ista omnia (§§. LXXVI. LXXVII.) manifestissime ostendant, in apoplexia cerebri ejusque appendices obrui quodammodo, aut laesum factari, vt non amplius suis muniis paria sint; ab hoc dum haudquaquam erit conjicere, quid simile terrerimam, mollissimamque ejus substantiam esse quoque perpeffam, quando in capite apoplexia defunctorum nihil vitii indagatorum oculis apparet, quod praesertim in iis videri solet; qui ex capitis concussione, validaque cerebri commotione perierunt, aut apoplexia ex febris intermittenti perniciose sublati sunt, in quorum cerebro plerumque nullum noxae signum deprehendi, auctor est IO. HENRICVS RAHNIVS a); vt nihil de iis dicam, quos nervorum distentio, aut rigor fastulit; cum de his infra opportunior erit disceptandi locus.

*) Prae ceteris Cel. ANTON. VALLISNERIVS experientia medica constare ait, in compluribus apoplecticorum daveribus nullam quandoque apparuisse, stupentibus acrius profectibus, vel minimam laesionem sine inflammationibus, siue in corticali, aut medullari cerebri, siue in ventriculis, siue in vasis sanguiferis, aut lymphaticis, siue in vilo alio cerebri, et capitis loco. *De usu et abuso delle bevande, e bagnature calde, o fredde. Modena. 1745.*

a) *De viro capis. et abdominis consensu. p. 78.*

§. LXX

§. LXXX.

Ex his vero, si quid conjectura valeo, rationi *Conjectura de causis remotis.* consentaneum videtur, quidquid vasa meningum, et cerebri nimium replere, distrahere, obstruere, frumpere, dilacerare, arrodere, comprimere, atque adeo sanguinis, humorumque ejuſius generis circuitum per eas partes vigere, retardare, vel saltus sufflaminare potest; aut intimam cerebri fabricam, structuramque quocunque modo subvertere, posse id etiam efficere, ut apoplexia facile, et cito accedat. Quo referuntur plethora, vberior sanguinis ad caput appulsus, aut vehementior ejusdem motus, nimia ejus cohaerentia, et segnities, quam *lentorum* dicunt, phlogistica diathesis, noxia crassitas, et multiplex acrimonia irritans, et ferme dissolvens; serosae partis excessus, aut inopia, iners debilitas, et laxitas, aut contrariae totius encephali affectiones; et demum vis extrinsecus illata.

§. LXXXI.

Praeterea doctissimis, celeberrimisque medicinae *An inopia sanguinis et arteriarum ad caput tendentium interceptio Apoplexiae causa esse possit.* magistris a) aptissimae ad apoplexiam causae visae sunt hinae aliae, videlicet inopia sanguinei laticis, at tanta, ut ad cerebrum ea, qua opus est, copia non fieri possit, et viarum ea interceptio, qua illius ad cerebrum transitus occludatur. Quod ad primam attinet, anceps haereo, num deficiens sanguinis copia, vndeunque ea sit, siue a defectu alimenti, siue ab evacuationibus immodicis, siue ab haemorrhagia, aut sauciatis arteriis ad cerebrum tendentibus, synopae potius, quam apoplexiae causam praebet. Nec satis teneo, an ex ejusmodi causis occurrentes apoplexiae definitioni (§. LXXII. LXXIII.) respondeant, ejusque phaenomena experiantur, quae in ejusdem descriptione (§. LXXIV.) exposuimus. Quod ad alteram, non videtur arteriae alicujus ad cerebrum

cerebrum sanguinem ferentis obstructio, aut coactio, siue concretio impeditura, ne per reliquas aperturas, et liberas ad cerebrum tantum feratur, quantum ad ejus functiones aliquo modo sustinendas perficiendasque necesse est. Quam quidem res anatomicae observationes luculenter *b)* demonstrant. Hypotheticum enim omnino censere, et facillime inauditum, arterias carotides, vertebrales, et cervicales, una simul omnes obstrui, et claudere; cum nulla unquam, quod sciam, haecenus sectio anatomica id perspicue compertum, comprobatumque sit. Quod si istud etiam possibile unquam foret, non tamen, ut arbitror, certo constaret, hominem apoplexia correptum *c)* periisse; quod facile cuilibet in pathologicis bene versato patet. Neque deum iis possum assentiri, qui, cum a compressione cerebri sensus aboleri, et remota compressione restitui viderint, mox concluderunt, omnem apoplexiam a sola cerebri compressione deducendam esse. Nimirum enim varia, et multiplex est caussarum, a quibus proficisci eam posse ostendimus, ratio.

An cerebri
compressio
semper praesens
sit.

a) BOERHAAV. SWIETEN. VOGEL. etc. *b)* WILLIS *De Apoplex.* et BAYLE. *Tract. de Apoplex.* c. 14. *c)* WILLIS *apud BONET. in not. ad observ. ANDR. LAVRENTII de contrariis. anatomic. p. 803.*

§. LXXXII.

Aliae remotiores causas.

Remotioribus quoque causis accenseri debent alia quaedam corporis vitia, e quibus apoplexiae saepe ortam narrant; videlicet ossa aortae rigiditas, aut ejusdem ex quacunque causa minor amplitudo; organici praecordiorum, aut abdominalis morbi; asperae arteriae praefocans strangulationes tumores magni, et duri collo, aut jugulo adnati itemque morbi quidam, ut bronchia obstructa, hydrops pectoris; calculi cystidis felleae *); aliae

Ætiones hystericae; partus laboriosior, et protractus; dolor acutissimus per chirurgiam alicubi excitatus; epilepsia frequens; scabies; exanthemata; arthritis; pedum oedemata sponte intro versa, aut retropulsa; lochiorum, et lactis in puerperis e mammis subita retrocessio; aut haemorrhoidum, mensium, euacuationum criticarum, vel consuetarum suppressio, emanatio, aut omissio; ischuria tum vera, tum spuria; ulcerum, et fomiculorum exsiccatio, aliaque hujusce generis.

*) Non desunt qui cystidis felleae calculos apoplexiae auctores accusant, suis, atque aliorum prolatis observationibus, qui eos in apoplecticis inuenerunt. Vid. *Ephem. N. C. Cent. IV. observ. 169.* Quarum numerum auget tam propriis, quam ab aliis depromptis Cl. MORGAGNIUS *Epist. anat. med. IV. n. 13. V. n. 6, 19.* At WEITBRECHTVS (*Comm. Litt. ann. 1734. hebd. 9. n. 2.*) cum in apoplectico decem lapillos cysticos, et quidem acutos, et angulares, et duros, et duos inter eos non paruos offendisset, quaesivit, an ab his apoplexia illa orta esset? Responditque, sibi hiatum in tanto ratiocinio relinqui, quem supplere non ausus est; neque MORGAGNIUS ipse (*Epist. anat. medic. III. n. 5.*) supplet, conuenitque cum WEITBRECHTI judicio, excepto tamen casu, in quo calculi fellei dolores atrocissimos inducant, ut in casu a FRID. HOFFMANNO (*Med. System. Ras. T. 4. P. 2. sect. 1. cap. 7. Thef. Pathol. §. 10.*) descripto. Inductis enim spasmodicis in ventre contractionibus sanguis ad superiora propellitur, aut ibidem consistit.

§. LXXXIII.

Speciatim vero quaedam corpus quodammodo ad morbum hunc idoneum reddere obseruantur. Cistias ~~pop~~egumenas vocant. Sub harum censum veniunt ortus a parentibus apoplexia defunctis, infantia, sed multo saepius senium, aetas, in primis a quadragesimo anno ad sexagesimum usque, caput ingens, collum breue, corporis sanguinea, vel phlegmatica temperies, obesitas*), vita deses, aut assiduus studiis dedita, somnus protractior, lautae epulae,

et locorum palustrium, aut etiam aëri leuiori, et tenui nimis fruentium habitatio.

*) Apoplexiam a venis per adipem nimium compressis ortam refert SCHWENKE. *Haemar.* p. 22. et 23., et etiam commemorat HALLERVS. *Elem. Physiolog.* T. IV. lib. X. *seß.* VII. §. XIV. mihi p. 203.

§. LXXXIV.

Causae pro-
catarticae.
** Prophasis.*

Homini autem sic (§. LXXXIII.) ad morbum veluti disposito occasionem, siue *πρόφασιν* *) porrigunt, vt apoplecticus concidat, validiores corporis exercitationes, immoderata, post epulas praecipue, saltatio; vini, et spirituum ardentium abusus; sternutamentum, aut tussis frequens, et magna; *venus* furens; ardentissimae febris concitator motus; balnei, aut laconici calor; ira; terror; metus; tristitia; perspiratio repente cohibita; multa spiritus in tubis inflandis, aut aluo deponenda *a)*, aut foetu edendo *), aut vociferando contentio; primarum viarum cruditates; alimenta crassiora, et pingua; supinus decubitus; largior aquarum medicatarum, praesertim senibus, aut pituitosis hominibus, potus; ventriculi nimia repletio; vterus praegnans, aut insigniter tumens; emetica fortiora **), et graues, diutinaeque animi curae. At speciatim apoplexiae fauent venti austrini, et boreales vicissim flantes; hiems pluuiosa; coelum nubilum; calor, et frigus alternatim, et repente variantes, sibi que succedentes; quae postrema BAGLIVIO, LANCISIO, aliisque testantibus in caussa saepissime sunt, vt quasi epidemice interdum grassari apoplexia videatur.

a) Virum inter alium deponendam apoplexia fortissima abreptum narrat MORGAGNIUS. Idem vidit, et sectione comprobauit VALSALVA. *Vid. Morg. epist. anat. med.* XIII n. 19.

*) ADVLPHVS inter ceteros lethalem apoplexiam ex rupto plexu choroide vidit in muliere, quae intempestive fortio-

fortioribus nifibus partum accelerabat. *Aët. N. C. T. I. obferv. 241.* Atque ex hac cauffa faepe periiffe puerperas, quae repente in partu obeunt, non fine veri fimilitudine putauerim.

**) Emeticorum vsum in praedispositis ad apoplexiam perniciofum oftendit obfervatio de Antonio Tita, quam habet Cl. MORGAGNIUS *Epift. anat. med. III. n. 11.* Quod ego quoque non femel (proh nimium!) obfervavi.

§. LXXXV.

Sunt quaedam etiam venena, quae vel faniffimos, imparatiffimosque in lethalem apoplexiam praecipitant, recondita adhuc, vel certè obfcuriffima intimam cerebri, neruorumque texturam labefactandi potentia *). Inter haec primas tenent opium, hyofcyamus, ftramonium, vtraque cicuta, nicotiana, et praecipue ejufdem fumus **) largiter fuctus, crocus, aliaeque narcotica; item boletorum quaedam species; cloacarum, fodinarum, puteorum, speluncarum, fepulcrorum putridi, phlogiftici, inflammabiles, aut aliter mephitici halitus, repente erumpentes; vapor carbonum ighitorum ***), musti, et cereuifiae fermentantis, in loco claufo coërcitus; aër, vt vocant, *fixus* e varia corporum efferuefcientium miftione extricatus, ifque varius, et multiplex pro varietate rerum commixtarum, atque ebullientium, vti *nitrofus, vitriolicus, acetofus etc.*; et demum ipfaemet fulminea ignis electrici explofio.

*Venena
narcotica.*

*Venenati
halitus.*

*) Quibus autem placet per haec irritabilitatem cordis primo deftrui, non videbitur inde enafci apoplexia, fed potius fyncope cardiaca.

**) Nicotiana, fiue *tabacum* eft planta acris, emetica, et fimul narcotica. Ad hyofcyami species fpectat. Qui noxas ab ejus pulueris, aut fumi vfu inductas fcire cupit, confulat TISSOTIVM *Epift. var. argum. p. 92. et feq.*, et DIDELOTIVM *Avis aux gens de la campagne, ou Traité des maladies les plus communes. chap. XVII. p. 119. 10.* ANDR. MURRAYVM *Apparat. medicamin. Vol. I. n. 180. p. 464.* Memorabo tantum quaedam terrifica exempla ad rem no-

stram. A puluere nimis copiose naribus vsurpato coma somnolentum, deinde apoplexia lethalis nata refertur in *Eph. N. C. Dec. 2. Ann. 10. obs. 131. p. 222.* In Diariis Germaniae anni 1730. p. 179., teste DIDELOTIO modo laudato, narratur de quodam milite, qui pulueris hujus adeo cupidus erat, vt tres quotidie vncias naribus attraheret. Cum ad annum trigessimum secundum suae aetatis peruenisset, coepit vertigine frequenti laborare, deinde correptus fuit apoplexia validissima, quae eum e medio sustulit. Ibidem alius memoratur, qui ab immodico *tabacci* hispanici vsu primum visum perdidit, deinde in paralytin incidit. OLAVS BORRICHIVS in epistola quadam ad TH. BARTHOLINVM data refert de homine, cui nimius *Tabacci* vsus cerebrum ita exsiccauerat, vt in ejus cranio post mortem loco cerebri inuentus fuerit grumulus quidam nigricans ex pluribus membranis coalitus; quasi cerebrum exsiccum redditum esset nimia muci per nares prolecta excretionem. HELMONTIVS, TVLPIVS, et Medici Breslauienses, vt habet DIDELOTIVS, testantur inde natas apoplexias. Nota est historia duorum fratrum Silesiorum, qui, cum se prouocassent ad fenum *tabacci* hauriendum, praemio proposito illi, qui diutius perdurasset, ambo perierunt apoplectici, primus ad decimam septimam *tabacci* fistulam, alter ad decimam octauam.

**) Cl. PORTALIVS duos vidit fumo carbonum, qui ex camino cum alio cubiculo communicante irrepserrat, enecatos. Erat his facies colorata, oculi lucidi; membra, et mandibula inferior flexilia; cutis mollis, et calens; abdomen tumidum. In cadaveribus autem ex hac causa interemptorum inuenit cerebri vasa sanguine plena, ventriculos fero quodam spumoso, interdum etiam sanguineo. Arteriam pulmonarem, auriculam, et ventriculum cordis dexterum, venam cauam, et jugulares sanguine sputido turgentes; saepe bronchia madida liquore seroso rubente. Venas pulmonares, sinistram auriculam, sinistrum ventriculum, atque aortam aut vacuas, aut quasi vacuas. Sanguinem in plerisque spumofum, fluentem, et facile in cellulofum textum transudantem. Epiglottidem eleuatam, glottidem hiantem, linguam praetumidam, vt vix ore contineri posset. Oculos prominentes, non flaccidos, sed lucidos ad tertiam diem vsque post mortem. Similia vidit in submersis, et strangulatis. Cl. Auctor putat vapore isto aërem reddi ineptum dilatandis pulmonibus, atque adeo expi-

expiratione nimium protracta, sanguinisque refluxu impedito apoplexiam induci. *Hist. de l' Acad. des Scienc. ann. 1775.* Sed de his vid. etiam *CARMINAT. de mortib. etc.*

§. LXXXVI.

Jam vero ad ipsas, propriasque apoplexiae diffe-*Differentiae.* rentias, variosque ejus gradus transeamus. Prima omnium differentia, quae ab antiquissimis usque temporibus obtinuit (§§. LXXI. LXXII.) est in *universalem*, et *particularem a*). In illa totum corpus laeditur, in hac latus vnum, vel aliquae tantum partes. Priorem *veram*, atque *exquisitam* vocamus, quod omnes animales actiones in ea cessant, aut intercipiuntur; alteram *spuriam*, aut *leuiorem*, quod in hac illae laeduntur quidem, non vero omnes, neque ex toto abolentur *b*).

*) Vid. etiam *FRANC. SCARDONA de cognosc. et curand. morb. lib. I. cap. I. §. VIII. et IX.* *b*) *PLATNER art. med., morb. soporof. §. 376.*

§. LXXXVII.

Particularis apoplexia (§. LXXXVI.), quando vnum corporis latus resolutum est, peculiari nomine vocatur *ημιπληγία* *): quando vero partes, quae ** Hemiplegia.* infra caput remanent, *παρεμπληγία* *, aut *παρεμπληγία* *, quae tamen multo rarior est. Non me latet, has postremas affectiones a quibusdam pro speciebus *paralyseos* considerari, non apoplexiae; quasi ** Paraplegia.* paralytis aliud morbi genus esset, penitus, longeque ab apoplexia diuersum. At hi videntur obliti esse eorum, quae *C. CELSUS, ARETAEVS (§. LXXI.),* et inter posteriores *PITCAIRNVS a*), de paralyti existimarunt, cum eam ab apoplexia non sejungant, aut eidem congenerem judicent. Neque sane magis audiendi videntur illi, qui ideo paralytin ab apoplexia separandam volunt, quod apoplexiae causa cerebro insideat, paralyseos vero nervis extra cerebrum ** Paraplexia.*

brum positis, locatisque. Nam scire hi dissimulant, lateris vnus, vel quarundam aliarum partium resolutionem, siue motus, et sensus defectum, quae vera est paralytis, ex cerebri etiam vitio proxime nasci posse. Quis, amabo, rerum anatomicarum tam rudis esse queat hodie, vt vnus lateris paralytici, nempe hemiplegiam, ignoret plerumque tribuendam

Plerumque oppositum latus resoluatur, sed non semper, et cur.

laesioni oppositae cerebri partis, videlicet illius, quae lateri resoluta ex aduerso opponitur, cum id vel HIPPOCRATI, vt animaduertit HALLERVS b), AETAEIO, et CASSIO, vt refert CASPAR HOFFMANVS c), antiquissimis nempe auctoribus, nedum nuperioribus in anatome exercitatis d) exploratissimum fuerit? Pleraeque enim fibrae medullae cerebri, et cerebelli, quae a dextris oriuntur, ad sinistras; quae a sinistris, ad dexteris, oppositaeque corporis partes duci videntur, sic vt nerui tam e cerebro, quam e medulla oblongata prodeuntes, ab oppositis plagis, et originibus, quasi decussatim profiscantur. Non tamen de omnibus paralytibus dici istud licet, cum quasdam nerueas fibras ab vno cerebri hemisphaerio profectas non ad aduersum, sed ad idem corporis latus porrigi, multa suadere debeant. Hinc interdum resolutum nouimus latus idem, cui respondebat cerebri laesum latus, quod ex VALSALVA ipso, et MORGAGNIO decussationis neruorum strenuis alias propugnatoribus e) euinci, confirmarique potest.

a) *De apoplexia.* b) *Physiolog. T. 4. p. 222. ed. Vener.*

c) *Comment. in GALEN. de usu part. l. 10. c. 12.* d) MORGAGN. *aduers. anatom. VI. animaduers. 84.*, et ante eum VALSALVA, LANCISIUS, deinde MOLINELLIVS, PLATNERVS, LVDWIGIVS, alique bene multi. At prae ceteris audiendus est HALLERVS, qui in *Element. Physiolog. T. IV. p. 221. n. 1.* frequentissima, inquit, sunt exempla actionis decussatae vulnere, et vitiorum cerebri. *Dextera manus resoluta, cum pus sub cranio in sinistro latere effunderetur,*

retur, MORGAGN. *de sed. et caus. morb. II. p. 288.* Resolutio lateris dexteri lateris, et brachii dextri, cum sinister thalamus mollis esset, et frigidus, *I. p. 82.* Hemiplegia dextera, cum aqua in sinistro ventriculo esset, et erosum cerebrum *p. 83.*; et cum sanguine in ea sedē effuso *p. 21.*; et cum corpus alienum in plexu choroideo sinistro vitiose natum esset, *p. 83.* Paralysis partis dextrae faciei cum sero, et hydatidibus in sinistro ventriculo, *Mémoires des sçavans étrang. III. p. 452.* Paralysis lateris oppositi a sanguine inter meninges effuso, CLOSSY *p. 6.* Vulnus ensis per oculum, hemiplegia lateris oppositi, *Philosoph. Transact. Vol. LIII.* Sed, ne nimius sim, reliqua vid. apud eundem HALLERVM *T. 4. lib. 10. sect. VII. §. XXIX.* diligenter enumerata. e) *Epist. anatom. XIII. n. 19. et 25. et epist. anatom. med. II. n. 16.* Multa exempla hujusmodi vid. apud HALLERVM *Elem. Physiol. T. 4. l. 10. sect. VII. §. XXIX. p. 223.*

§. LXXXVIII.

Id etiam JANVS PLANCVS observavit in cerebelli potissimum laesionibus, in quibus propterea non oppositum, sed idem latus corporis resolui a) contendit. Sed praeterea animadvertendum superest, non semper alternum latus resolui. Saepius enim non resolvitur, sed conuellitur b), ut ego ipse aliquoties vidi, quando nimirum irritatio praeualet compressioni. Interdum etiam, dum ab eadem cerebri laesione latus alternum resolvitur, respondens cerebri laesioni latus conuellitur, motibusque clonicis c) agitur. Quod facile explicaueris, si ponas irritari eodem tempore originem neruorum, qui ad latus affectum tendunt, dum origo neruorum ad alterum latus euntium comprimitur, ex quo simul resoluantur partes, ad quas hi nerui spectant.

*Lateris
eiusdem pa-
ralysis, quo
cerebelli, aut
cerebri lac-
sio.*

*Interdum
conuellitur
latus, non
resolvitur.*

a) *Lettera sopra un' apostema del cervello.* b) HIPPOCR. *aph. VII.*, et *de vuln. capis.* SCHOUTEN. *gewondse hoofd. p. 64.* SCULTET. *obs. 17.* BARTHOLIN. *hist. 2. cent. V.* BOUVART *Histoir. de l'Acad. Royal. des scienc. de Paris 1700. obs. 19.* SALMVTH. *l. 1. obs. 17.* c) HORST. *L. II. obs. 1.* LORRY *Mémoir. de sçavans étrang. T. III. p. 375.* ex HALLERÒ *l. c. T. 4. p. 223.*

brum positis, locatisque. Nam scire hi dissimulant, lateris vnus, vel quarundam aliarum partium resolutionem, siue motus, et sensus defectum, quae vera est paralyfis, ex cerebri etiam vitio proxime enasci posse. Quis, amabo, rerum anatomicarum tam rudis esse queat hodie, vt vnus lateris paralyfin, nempe hemiplegiam, ignoret plerumque tribuendam laesioni oppositae cerebri partis, videlicet illius, quae lateri resolutio ex aduerso opponitur, cum id vel HIPPOCRATI, vt animaduertit HALLERVS b), ARETAEO, et CASSIO, vt refert CASPAR HOFFMANNVS c), antiquissimis nempe auctoribus, nedum superioribus in anatome exercitatis d) exploratissimum fuerit? Pleraque enim fibrae medullae cerebri, et cerebelli, quae a dextris oriuntur, ad sinistras; quae a sinistris, ad dexteris, oppositasque corporis partes duci videntur, sic vt nervi tam e cerebro, quam e medulla oblongata prodeuntes, ab oppositis plagis, et originibus, quasi decussatim profiscantur. Non tamen de omnibus paralyfibus dici istud licet, cum quasdam nerueas fibras ab vno cerebri hemisphaerio profectas non ad aduersum, sed ad idem corporis latum porrigi, multa suadere debeant. Hinc interdum resolutum nouimus latus idem, cui respondebat cerebri laesum latus, quod ex VALSALVA ipso, et MORGAGNIO decussationis neruorum strenuis alias propugnatoribus e) euincitur, confirmarique potest.

a) De apoplexia. b) *Physiolog.* T. 4. p. 222. c) *Comment. in GALEN. de usu part. l. 10. c. 12.* d) MORGAGN. *aduers. anatom. Pl. animaduers.* 84. e) VALSALVA, LANCIUS, et de MOLINELLIS, FLAVIUS NERVVS, LYBIVS. At utrum co-
sudiendo
F. 23

retur, MORGAGN. *de sed. & caus. mor. L. 2. 298.* Reinsurus
 dexteri lateris, et brachii dext. cum iunioribus
 mollis esset, et fractura L. 2. 32. Hemiplegia dextra cum
 aqua in sinistro ventriculo esset, et eronea dextera 2. 33;
 et cum sanguine in ea fece esset 2. 21. et cum cortice
 alienum in plexu choroides iunioribus studio dext. 2. 22,
 p. 83. Paralysis partis dexte facie cum iunioribus 2. 23
 dext. in sinistro ventriculo. Morsus de iunioribus 2. 24
 III. p. 452. Paralysis lateris dexti a iunioribus 2. 25
 meninges effusa. CLOTT 2. 6. Vultus enim de iunioribus
 hemiplegia lateris oppoiti. *Philosoph. Transact. 16. 171.*
 Sed, de nimis fine. tenet via adu. eundem HALLERUM
 T. 4. lib. 10. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

§. II.

Id etiam JARVIS PLANT. observavit in cere-
 belli pontium. Iactura. et talis propterea
 non oppositum. sed non in contrariis relictis
 contentum. sed propter antea observatum in
 pectus, non semper alterum in. et al. Saepius
 enim non resolvitur, sed duntaxat. et ex
 aliquoties rudi, quandoque tamen duntaxat
 compressioni. Interdum cum in. et talis
 rudi Iacturae lateris alterum tamen. respondens
 cessari Iacturae lateris. et talis.

§. LXXXIX.

*Cur non
semper resol-
vatur alter-
utrum latus?*

Nec satis est quodlibet vitium vnius cerebri hemisphaerii, vt resoluatur semper alterutrum corporis latus; nam, cum vndique ex cerebri medulla ad neruos fibrae ferantur aliquae, idcirco non omnis neruorum vis, vno cerebri latere aliquomodo compresso, aut labefactato, in eadem, aut aduersa corporis parte exstinguitur, quia haec a fibris medullaribus ex integro hemisphaerio prodeuntibus, atque ad vniuersum corpus porrectis sustineri interdum potest, quin necessario paralytis subsequatur. Id tum maxime patet, cum vtrumque hemisphaerium noxam contraxerit, et neutrum tamen latus resolutum sit. Tantus enim tunc nerueae facultatis ad partes singulas ex cerebro influxus superest adhuc, vt omnes satis vigeant, et sensu, viribusque polleant. Ceterum quando euenit, vt vnum latus resoluatur, neque Medico, vbi accesserit, liceat amplius distinguere, quodnam primo latus fuerit affectum, quia vniuersum jam corpus resolutum apparet, exquirat is tunc ex domesticis, et famulis, in quodnam latus homo procubuerit; nam hoc erit, quod ab initio resolutum fuit, labesque in opposita cerebri parte vt plurimum reperietur.

*Latus primo
resolutum est
id, in quod
procubuit as-
ger.*

§. XC.

*Certis cere-
bri sedibus
respondent
quaedam
partes resolu-
tae.*

Fereque compertum videtur ex Anatomicorum industria, certis in cerebro sedibus affectis certas in corpore partes paralyticas reddi. A compressis, aut aliter vitiatis neruorum optitorum thalamis ortus amaurosis, siue *gutta serena*, paralytis nempe neruorum optitorum, et retinae a). WILLISIVS notauit, si corpora striata aliquo modo laedantur, crura motu, et sensu b) priuari. Nec rationi repugnat pro vario corporis callosi, aut medullae oblongatae loco laborante, modo illud, modo aliud neruorum

orum par, proindeque varias corporis partes possimum pati. Quod in primis comprobari ab ea potest hemiplegiae specie, quae non a principio inruit, sed secundaria est, nimirum illa, in quam venae, exquisita, atque vniuersalis apoplexia interdum desinit; caussa, quae callosum corpus c), aut centrum cerebri opprimebat, ad latus magis vnum conuersa. Quod si caussa, vt interceptio sanguinis in venis ad cerebri basin, nervos, qui inde ad linguam protenduntur, comprimant; vt plurimum aphoniam, et iactationes gignit, animaduertente LANCISIO c*). Imo si ea ad cerebri basin, cerebellumque descendat, nervosque omnes inde egredientes obruat, eoque magis si ad nervorum usque cervicalium, a quibus major pars cardiacorum provenit, originem propagetur; vita ipsa, motu nempe cordis, et thoracis penitus intercepto, protinus extinguatur necesse est. Hinc MORGAGNIUS (*Epist. anat. med. III. n. 25.*) iure videtur audiendus, ubi ait: *cerebellum* maxime affici in apoplexia, fortasse conjici poterit ex respirationis summa laesione, ano, et vesicae resolutis, excrementis sponte erumpentibus, faciei, et labiorum liuore. Quod si in fistulam, qua reconditur medulla spinalis, irruat, et supremas praesertim vertebrae inundet, atque occupet, *paraplegiam* gigni, ferme omnibus persuasum est d).

a) FLATNER l. c. LVDWIG l. c. b) *De anima Brutor. ap. IX. p. 106.* c) PEYRONIE *Mémoire de l'Acad. Roy. des Sciences. 1741.* c*) *De subit. mortib. l. I. cap. VIII. §§. IX. X.* d) FLATNER et LVDWIG. l. c. et MORGAGN. *Epist. anatom. med. cit.* Apud BOERHAAVIUM *Praelect. in Institur. 401.* describitur paraplegia primum a sanguine in principio spinæ effuso, deinde in apoplexiam, ab eodem ad cerebellum usque diffuso, terminata. Similem casum narrat DUVERNEYUS, vti videri potest in DUHAMELII *R. Sciens. Acad. Histor. l. III. f. V. c. 2. n. I.* TISSOTIUS veram paraplegiam vidit in vegeto homine, cui, dum terram foderet in spelunca, massa terrae concretæ in cervicem deciderat.

Nulla siue luxatio, siue fractura a chirurgo eo in loco
venta est. *Epist. med. var. argum. p. 97,*

§. XCI.

*Particulares
paralyfes.*

Interdum aliqui solummodo occupantur, re-
vunturque muscoli, vti faciei, palpebrarum, brachii,
linguae *), pharyngis, oesophagi, ventriculi, inte-
stinorum, vteri, vesicae, ani, de quibus alibi dice-
erit opportunior locus; atque hinc variae *apople-*
xiae leuioris, siue *particularis* species, vel, vt plerum-
que vocantur, paralyfes prodeunt. Harum verum
duplex genus est pro diuersa caussarum sede, alio-
rum videlicet ex cerebri, aut medullae spinalis **),
vnde nerui omnes procedunt, pressione, suppuratio-
ne, vlcere, vulnere, infarctu, aliaue simili non;
alterum ex affinibus caussis inuolucra nervorum,
ganglia, vicinasque partes afficientibus, nervos ipsos
aut comprimentibus, coarctantibus, obstruentibus,
aut alia quacunque ratione eos in itinere laedenti-
bus. Huc redeunt varia tumorum genera nervis
adnata, cellulosi textus, quo nerui cinguntur, et con-
tinentur, frequentissimus hydrops, vertebrarum,
aliorumque ossium fracturae, luxationes, exostoses,
contusiones, vulnera, metastases, venenati halitus,
praesertim metallici, veluti ex arsenico, plumbi,
cinnabari, et mercurio, aliaque corpuscula noxia
tenuissima, penetrantia, aut varia cacochymiae
genera ad nervos, aut eorum vaginas perducta.

*) In Diario Medico Parisiensi (*Juin 1782. p. 547*) re-
stat observatio D. MAJAULTI de paralyfi linguae, atque
extremorum artuum inferiorum, quam sine plethora, et
cacochylia, aut alia causa solum frigoris tormentum en-
tauerat. Eam vero facile excussit intra sex dies solo
luto florum arnicae, cui addebat duodecim guttas alla-
volatilis pro qualibet *pinta*, vt vulgo vocant.

**) Paralyfes, quae laesionibus medullae spinalis super-
veniunt, non in opposito latere contingunt, sed in eodem
ex quo laesa medulla fuit. Vid. HALLER. *Elem. physiol.*
T. II.

IV. l. IO. *sect. VII. §. 29. p. 223.* vbi citantur TVRNERI, FLANI, SALICETI, et *Aët. Societ. Edimburg.* testimonia.

§. XCII.

At quoniam ad motum muscularem praeter *Paralyfes spuriae ex musculorum vitiis.* eorum vim requiritur ipsa fibrarum muscularium integritas, firmitas, atque insita *irritabilis* facultas, idcirco vltro fatendum est, aliquando, si non *an.*, spuriam certe, siue *imperfectam* paralyfin, ne fortasse rectius immobilitas dici posset, observari ex sola fibrarum muscularium laxata compage, debiliore elementorum eas componentium coeherentia, atque imminuta *irritabilitate*, aut ex cellularis contextus infarctu, oedemate, obstructione, atque ex impedito sanguinis per arterias in musculos influxu; qui pariter ad musculorum vim exandam, aut servandam videtur exposci. Id vitii rursus scorbuticis, cacochymicis, vulneratis, et niti venere exhaustis corporibus praecipue superire consuevit.

§. XCIII.

In quavis autem paralyfi gradus quidam notari *Paralyficos gradus varios.* solent: vel enim vna cum motu perit omnis sensus, necque perfecta est *anaesthesia* *); vel motus tantummodo cessat, superstiti sensu; vel sensus deficiente, non vero motus. Vtraque haec *imperfecta* paralyfis dicitur. Interdum in parte stupore contracta, motuque priuata acuti subinde dolores perantur; quod phaenomenon cum ejus stupore pletico vix conjungi posse videtur. Rarissimum illud hemiplegiae genus, in quo ex vno latere sensus, manente sensu; ex altero sensus, relicta motus potestate, aboletur. Hujus tamen exemplum *EXISTERO a)* posteriorum memoriae consignamus. Rara quoque est paralyfis tertio loci posita, cujus itidem non desiderantur apud Clinicos

Clinicos aliquae historiae. Cl. BERDOTVS non pridem de sexagenaria meminit, dexteri lateris hemiplegia cum sensus, et motus iactura prehensio motus quidem rediit, nunquam vero sensus b). ipse, qui istud pluries vidi, ante paucos annos tus fui ad nobilem foeminam hemiplegiacam, post menses tres, ex quo in huiusmodi morbo inciderat a suppressis catameniis, motum quidem recuperauerat, sensum vero nequaquam. Quod sensus in paralyticis membris remanet, deficit autem motus, non nulli rem satis explicari putant dixerint, ad sensum minorem neruorum vim, et influxum sufficere, maiorem vero requiri ad motum. Verum cum contra supersit motus, aut redierit, absit vero sensus; quomodo phaenomeni explanationem inibunt? Fortasse propius a vero erit, qui nervos musculis mouendis dicatos suam vim acquisisse dixerit, non eos vero, qui ad cutem pertinent c); siue, quod eodem recidit, nervos fortasse qui a spinali medulla originem habent, relictos fuisse, eos non item, qui a nerui intercostalis thoraco magna ex parte suppeditantur.

*) Anaesthesia hodie sumitur pro sensus omnis internus, quam externi priuatione. Hinc stupor latine dicitur. Hodie haec vox adhibetur a nosologis ad mentem quemdam significandum, quem a paralyti non minus, quam a catalepsi, atque ecstasi differentem volunt. Et quod videam, quibus rationibus huiusmodi differentiam intertradant, non tamen de ea genus quoddam morbi praeparandum duxi, quod casus illi, quos de anaesthesia narrant facile ad paralytin, vel ad cataleptin, aut ecstasin saltem spuriam redigi possunt, vti in capite de catalepsi ecstasi facile ostendam.

a) *Ephem. N. C. cent. II. observ. 196.* b) *AB. Helms VI. p. 191.* c) Cl. RAYNER. BONAVENTUR. MARTINI Professor Pisanus non dissimili utitur explanatione in *Med. T. I. cap. V. p. 59.*

§. XCIV.

Si stupore, aut torpore solum pars aliqua elan- *Quid paresis?*
 sit, non vero motum, et sensum prorsus amise-
 rit, haec communiter *paresis* laborare dicitur, qua-
 videlicet imperfectae, et spuriae paralyseos
 est. Multi tamen paresis nomine vtuntur ad
 priorum tantum artuum significandam resolutio-
 nem. Alii id nominis adhibent vel intestinorum
 spasmiae, quae in colica Pictonum, siue *convulsiva* ple-
 que sponte, aut narcoticorum vsum consequi-
 vel brachiorum paralyfi eidem colicae super-
 senti. ARETAEVS porro *paresin* esse ait, quan-
 vesica vrinaria resoluitur, neque amplius ad
 retinendam, aut retinendam vrinam valet a).

a) *De caus. et nos. diurn. affect. l. 1. cap. VII.*

§. XCV.

Haecenus de propriis apoplexiae particularis *Communes apoplexiae differentiae.*
 differentiis. Superest, vt de communibus vtriusque
 particularis, tum vniuersalis dicamus. Itaque
 apoplexia ratione loci primario affecti diuiditur in
pathicam, et *sympathicam*, prout nempe ejus caus-
 sa proxime in capite, vel alibi residet, vnde vim
 suam in caput exerceat. Item ratione causae
 est *sanguinea*, alia *serosa*, *pituitosa* alia, *atrabila-*
metastatica, in primis ex arthritide, lochiis, aut
subito, et velociter retropulsis, *traumatica*,
hysterica, *epileptica*, *convulsiva*, *scorbutica*,
febrilis, *polyposa*, *praecordialis*, *mephitica*,
halituoza, *fulminea*, et sic deinceps.

§. XCVI.

Haeceterea in apoplexia *vera*, siue *exquisita* (§§ *Gratus apoplexiae legiti-*
 LXXXVI.) considerari solent gradus quidam *mae.*
 inspirationis, pulsus, calorisque deprauatione de-
 riuandi;

riuandi; quorum caussa communiter ipsa distinguitur in *debilem*, *fortem*, et *fortissimam*. At *Galenus* a), cui adhaerere quidam malunt b), gradum hosce ad quatuor extendit, indeque *leuissimam*, *leuem*, *validam*, siue *fortem*, et *validissimam* constituit; quamquam, vt libere quod sentio dicam, huiusmodi gradus subtilius excogitati, et minus fortassis diuisi, vix vnquam distincte a Clinicis percipi, et deprehendi possint.

a) *Comment. in coac. praen. sect. 476.* b) *IO. MOLINARIUS l. c.*

§. XCVII.

Norae cuiusque gradus.

Leuissima ea dicitur, in qua respiratio libera, pulsus ordinatus, color faciei, et calor corporis naturali proximus deprehenduntur. *Leuis*, quae respirationem, et pulsum inaequalem, aut intermittentem, colorem praeter naturam, corpusque subfrigidum exhibet. Quando vero spiritus aeger imducitur, pulsus durus, et longe varius micat, color deperit, et corpus friget, tunc *validam*, siue *fortem* adesse scito; *validissimam* demum, atque acutissimam, vbi rhonchi vehementissimi trahuntur, aut absentibus nulla respiratio, pulsus nullus percipitur, facies cadaueris speciem habet, sudor frigidus vultuque manat, spuma circa os collecta haeret, sphincter ani, et vesicae omnino laxatur. Animaduertimus tamen cum Cl. MORGAGNIO a), respirationem laesam indicare varios quidem morbi huiusce gradus, non ita tamen eam accipi oportere, sine hoc signo grauissima interdum apoplexia non posset. Nonnunquam enim bona, et ordinata visa est respiratio, quamquam validissimum malum, et cito mortiferum existeret; idque VALSALVA et VERATTI observationibus comprobari. Infans verisimillimum videri, in *leuissima*, et *leui* cerebri prop-

proprie dictum magis, in *forti*, et *fortissima* cerebellum etiam, aut medullam oblongatam, et supremam medullae spinalis regionem offendi.

4 a) *De sedib. et caus. morb. Epist. II. n. 13. et 14.*

D i a g n o s i s.

§. XCVIII.

Apoplexiam non solum ex iis, quae supra (§§. *Signa futurae, aut imminantis apoplexiae.* LXXXII. LXXXIII. LXXXIV. LXXXV.) exposita sunt, verum etiam ex aliis, quorum recensionem mox *apoplexiae.* subjungemus, licet praevidere; quod summopere interest Medicorum, quibus curae esse debet aliorum salutem tueri. Igitur eam imminere tradunt, si quis inter dormiendum alto sopore captus, incubo *), et dentium stridore corripiatur, aut vehementer praeter consuetudinem stertat; si dolor capitis sine manifesta causa jamdiu vexet, nauseam, aut vomitum moueat, nullaue re mitigetur; si memoria, quae felix, tenaxque fuit, repente minuatur, obfussetur, aut deficiat, facilisque obliuio eidem succedat; si caput graue fiat, mens hebetetur, sopor facile obrepat; si maculae muscarum instar, aut tintillae oculis obuersentur, quin amauroseos, aut suffusionis suspicio praecesserit; si albuginea tunica rubeat, lacrymae sponte profluant, vertigo tenebriosa stanti, aut caput deorsum demittenti citra ventrali repletionem superueniat, et saepe reuertatur; si hominibus, qui vitio cerebri, et neruorum optico-
rum visum amiserint, noctu splendor subinde ante oculos fulgere videatur. Id vero si circa hiemale solstitium contingat, lethali eos apoplexia, vere credente, quod longissimum est, correptum iri, conjectare fas erit. Si quis nec vini, nec tabaci usu temulentus inter legendum a linea aberret, non minime id prius eidem accideret; si susurrus, tinni-

tinnitus, aut bombus, quem nec loca humida, nec paries recenter calce obductus, nec alia evidentia causa procrearit, auribus obstrepant; si lingua bubare incipiat; verba tardius proferantur; responsa dentur implexa; os distorqueatur; si insolita moeror, aut angor animi accedat; si deglutitionis difficultas ingruat, aut glutire volenti tussis excitetur, nulla interim inflammatione, nullumque tumorem fauces obsidente, nullaque affectione hysterica, aut hypochondriaca intercedente; si saepius animi deliquium infestet; si alterutrum corporis latus identidem torpeat, neque id ex compressione vlla partium, aut tumore, aut arthritidis, rheumatismi, scorbutive effectibus repeti possit; si tactus obtusior euadat; si manus, quae antea velox erat, mox minus promte scribenti obsecundet; si ex leui incessu lassitudo cita sequatur; si pedes vacillent, veluti rependo trahantur; si membra formicationis sensu afficiantur; si post capitis vulnera, contusionesque rigor, aut diutini citra febrim horrores, aut catarrhe**) inuadant. Haec, inquam, aliaeque id genus, si non omnia, aliqua saltem, saepiusque obueniant, necesse est, ubi apoplexiae accessus praevidendi sunt. Nam sine vilo etiam praecedente indicio interdum adortitur vel optime valentes.

*) Incubus, siue Ephialtes est quaedam spirandi difficultas in somno dormientibus superueniens cum sensu pondus in thoraci sub specie laruae, aut spectri, aut sagae iacentis, a quo nisi post varios gemitus, conatus, et vigilas enigilantes, aut excussi liberantur, superstitie tantum cordis tremore, et palpitatione, et non raro accelerato diaphragmatis motu. Pueri huic malo magis obnoxii esse consueverunt. Sed variae causae incubum, siue ephialtem inferunt, nempe plethora, ventriculi repletio, verum pathemata animi, interdum accessiones febrium intercurrentium, hydrocephalum, atque aliae cerebri malae affectiones, et in primis coena lautior, et decubitus in dorso. Apoplexiam autem antecedit ille, qui a copia sanguinis

aut feri circa cerebellum, aut medullam oblongatam, spinalisque initium collecta originem ducit. Isque in primis Medici opem exposcit. Ceterum raro sub Medici considerationem cadit, ut morbus: quamobrem ad pathologiam generalem potius rejiciendum ducimus. Nam quae ex **SILIMACHO** Hippocratis sectatore de incubo, veluti lue, apud urbem Romam grassato populariter narrat **COELIVS AVRELIANVS** (*Tard. passion. l. I. cap. 3.*), non video ab illa vlla observatione confirmata.

**) De catoeche, sine catalepsi inferius agemus peculiari capite. Est autem affectus, in quo aegri stupidi, et quasi rigidi, atque estatici manent.

§. XCIX.

Cum vero ea jam accesserit, perpendere sedulo oportet, vtrum *sanguinea*, aut *serosa*, aut *convulsiva* sit? De his enim tribus tantum seorsum agere constituimus, experientissimorum etiam virorum adducti auctoritate a), quod ad hasce reliquae ferme omnes reduci commode possint. Et primum *sanguineam* indicant lauta victus ratio, alimenta euchyma, vita hilaris, et parum exercitata, aetas florens, temperamentum sanguineum, vernum anni tempus, tempestas calida, et humida, suppressae sanguinis evacuationes. Frequentius ipsa sine vllis praecedentibus signis extemplo inuadit, praesertim si ex ruptis cerebri vasis, aut ex vehementiore aliqua causa sanguinem caput versus propellente oriatur, et tum saepe acutus, et subitus, et vehemens capit dolor antecedit. In hac, postquam hominem percussit (§. LXXIV.), facies rubet, oculorum, et temporum venae tument, caput summopere calet, oculi semiaperti, et veluti vitrei ferme rigent, haerent, prominentque. Respiratio saepe liberior est, quandoque stertorosa, pulsus ut plurimum magnus, et plenus, alias vehementior, et qualis in inflammationibus esse solet; morbo augescente fit languidus, lentior, et rarior; respiratio paulatim minuitur;

et, cum validissima est apoplexia, subeunt rhonchi grauiissimi, stridor dentium, conuulsiui motus, vomituritio sympathica, tandem mors. Quidam, dum corruunt, ejulatum emittunt. Alias ipso momento, quo percelluntur, *hemiplegia*, siue paralyfis vnius lateris accedit. Caueto autem, ne ex sola facie pallida, aut ex senili aetate statim credas, non esse *sanguineam*. Non raro enim in senibus apoplexia cum facie pallida denatis sanguis intra cerebrum effusus inuentus est: tuncque pallor vitae deficientis effectus fuit, non sanguinis inopiae signum.

a) MOLINARIUS l. c.

§. C.

*Quid serosa
apoplexia?*

Vt *sanguinea* apoplexia a copia sanguinis vasa cerebri nimium vrgentis, aut intra ejus caua effusi nomen recipit; sic *serosa* vel a sero, siue pituita, siue aqua eadem opplente, aut inundante desumit. Et licet non semper aqua, serum, aut pituita intra caluariam in apoplecticorum capite reperta pro causa apoplexiae haberi possit, quia interdum apoplexiam alia ab causa profectam seri effusio; vt effectus, subsequitur; certis tamen ex observationibus constat, ab aquosa etiam illuue eam quandoque

Seri copia.

*Paucitas
seri, sed acris.*

(§. LXXVI.) progenitam. Neque semper necesse est, vt aqua haec sit magna copia; sed sufficere videtur, eam licet paucam, acrem tamen existere, irritandique potentia praeditam. Nam ejus acritudine cerebrum si minus conuelli, vt autumabit MORGAGNIUS a), pungi saltem, irritari, aut arde- di potest ita, vt inde apoplexia consequatur. Quod si acritudo ab ea abfuerit, et exigua sit aquae quantitas; haec per se vix videtur ad apoplexiam satis esse, nisi aliae causae cum internae, tum externae concurrant, et cerebrum valide, et cito attingant, obruantque.

a) L. c. Epist. IV. n. 1. §. 27. et alibi.

§. CI.

§. CI.

Attamen non negauerim, serum, siue aquam ^{Serum, siue} quandoque exigua quantitate apoplexiae inducendae ^{paucum, sub-} parem esse posse, dummodo vno quasi ictu, et sub- ^{bito effusum.} bitanea effusione in ventriculis coaceruetur, aut circa cerebrum sub meningibus repente effundatur. Tunc enim non quantitas, sed insueta, et subita compressionis, aut distentionis vis non leuem meretur considerationem. Contra cum lenta feri, siue aquae collectio, insensibili ferme effusione fiat; novum non est cerebrum multo, copiosoque liquore grauari posse, quin apoplexia procreetur. Id maxime liquet in hydrocephalo, in quo cerebrum lentam, et paullatim factam pressionem, aut distractionem facile ferre posse, compertissimum est.

§. CII.

Ceterum a sero, aut a pituita apoplexiam esse, ^{Signa serosae} significant temperamentum phlegmaticum, habitus ^{apoplexiae.} corporis cachecticus, et decolor; aetas senilis; caussae aquei, et lenti humoris copiam augentes; accessio non ita subita, vt in sanguinea; facies pallida, et tumida; venarum depressio; membrorum flacciditas, et frigus; respiratio impeditior; stertor, et sibilus major; pulsus depressus, tardus, paruus, rarus, varius, inaequalis, atque intermittens. Antecedunt saepe vertigo, praesertim pomeridiana, et nocturna, torpores, hebetudines, balbuties, et sopor. Praeterea qui in huiusmodi morbum incidunt, non illico vocis et linguae vsu priuantur, oculis, atque os subinde aperiunt, ingentemque ex illis lymphae vim emittunt. Ne vero hic quidquam dissimulem, scire licet Cl. TISSOTIVM a), re-
 siderationem in hac apoplexiae specie minus difficilem esse, aegrumque interdum facilius, atque vberius cognoscere, animaduertisse. Qua in re quantum ipse

vero propius accedat, aliorum observationibus discernendum relinquam.

a) *Avis au peuple sur sa santé T. I. chap. IX. de l'apoplexie.*
§. 149.

§. CIII.

Signa apoplexiae convulsivae.

Proximum est, ut de signis apoplexiae *convulsivae*, siue *spasticae*, quae nimirum a spasmodis originem ducit (§. XCV.), differamus. De ea mentionem faciunt SYDENHAMIVS a), FRID. HOFFMANNVS b), et JO. BAPTISTA MOLINARIUS municeps, et amicus olim noster c), TISSOTIVS d), alique, quamquam non nullis praeteruisa, aut studio neglecta. Huic obnoxii sunt, qui spasmodis abdominis aliquandiu laborarunt, qui colicis doloribus, qui hypochondriaca, vel hysterica passione, qui calculis cystidis felleae, qui aluo adstricta, aut vehementibus, subitisque animi motibus, ira, terrore, aut epilepsia vexantur, aut haemorrhoidum, mensumque consueto fluxu carent, aut ex arthritide anomala spasmodis conflantur. Solet ea praedici ab externorum sensuum imbecillitate, vertigine tenebrosa, artuum grauitate, tremore, torpore, affectibus hystericis, atque hypochondriacis grauioribus, diuturnioribusque. Simul ac in propinquo est, extrema perfrigerantur, cutis arefcit, facies, oculique rubent, arteriae carotides validius celeriusque micant; reliquae magnum, durumque pulsum exhibent. Quoniam igitur in mulieribus saepe ab hystericis, spasticisque passionibus, aut in viris ab aliarum, et speciatim imi ventris partium incommodis incipit; ideo *hystericam*, aut *sympathicam* etiam vocant. Haec porro, utpote a spasmodis orta, modo leuior est, facilisque solutu, quia, cum primum eo peruenit, ut *sensibilitatem* extinguere incipiat, mox *spasmi* laxentur, et cessent, necesse est; modo in hemiplegiam, aut alicujus partis duntaxat

zat paralyfin definit; aut ab initio statim sub particularis paralyseos specie, quae non admodum diu persistere solet, solum ingruit; modo etiam vehemens est, quod rarius tamen euenit, et cito vitam, ut aliae apoplexiae grauiore, abrumpt *).

a) In Dissert. Epist. b) Medic. system. Part. 2. sect. I. cap. VII. §. X. c) L. c. d) Epist. varii argument. p. 88.

*) Bina apoplexiae hystericae, siue conuulsivae exempla profert Cl. TISSOTUS hisce verbis: Generosa, venusta, vicennalis virgo benignissimas, ut audiui, variolas ante aliquot menses facillime in alia urbe superauerat, pluriesque postea purgata fuerat. Ab illo tempore hystericos morbos experta erat, et praesertim a duobus circiter mensibus graues cephalalgias conquerebatur, moestaque erat. Dissito periso medico, qui primum curauerat morbum, empirico credebatur quamdam olim famam consequuto, qui morbum variis euacuationibus, et refrigerantibus remediis sanare sperabat; at ineptum tentamen, infelix successus. Omnia ruebant in pejus; demum cum immani cephalalgia loquelam subito amisit, dolorem digito monstrans. Bihorio ante mortem, nec citius illam vidi: rubra erat facies; intermittens, irregularis, minimus, pessimus pulsus; anxietas summa; subito obiit. Caput secari voluerunt parentes: adfui simplex testis. Ne minimum inueniebatur vitium. An apertum pectus aliquid morbidum obrulisset? Contra forsan sequens observatio. Eodem anno in octodecennali virgine fluentia menstrua terrore suppressiebantur; hisque suppressis in frequentes incidebat lipothymias, quas fugare variis tentabat chirurgus tunc temporis hic degens. Demum post innumeras aegritudinis larvas per sex, aut septem menses ludentes, profundo sopore prehendebatur, quem frustra excutere satagebat. Cassis omnibus, ad me tertia somni die confugiebant parentes. Dormientem inueni, nec tumultu, aut ullo irritationis genere excitandam. Quod in similibus casibus soleo, integram suam quietem. Post duodecim horas euigilabat sana, ni admodum debilis. Accurate perpendens omnia, omnium locale vitium, nullam inueniens febrem, roborantia suam anthysterica nupta. Succedebant ad vota, sed ex nouo terrore, post aliquot dies, saeuas adeo anxietates cum immani cephalalgia, nauseis continuis, horrendis artuum conuulsionibus experiebatur, ut tristiora videre raro contigerit. Ferociam morbi opii dosi unica

lenini primam, tum jam dictis remediis sensim victi: at in-
grae sanationis parvam spem relinquebant longo morbo, et
praesertim remediis fractae vires. Dum offam comedit, ac-
cedit anxietas, intra minutum moritur. Cadaver aperire,
pecunia victi, permittunt parentes. Cor paullo forsitan aequo
majus, mollius, pallidiusque inueni. An ex frequentibus
phlebotomiis? Cetera, nullum cadaver omni labe magis va-
cuum vidi. — — Anne mors ex paralyti, aut conuulsione
cordis? Sane facillime, et saepissime resolvuntur, et conuel-
luntur omnes hystericae musculi; quid ni cor? Sic ergo
credam, donec boni meliora doceant. *Epist. med. varii ar-
gument. p. 80. 89. 90.* Mortis repentinae sine villo vicio
vllibi inuento, ac proinde neruorum spasticae affectioni
tribuendae historia Haeniana, quam ad hunc locum alle-
gat TISSOTVS, sic habet: *Iuencula foemina ad nosocomium
nostrum accessit, multis ab annis vehementi cordis palpi-
tatione, anhelitu, anxietate praecordiorum, tussique vix
frequenti; artis interea opem frustra eo usque experta. Cum
alio ab otiduo careret, enema immitti jubeo, alio interim
paraturus. Sed interim moritur. In cadavere publice exa-
minato vitales partes sanitatem illibatam adeo referebant, ut
nihil illibatius. Neque quod toto corpore tam in solidis,
quam in fluidis accusaretis, quidquam erat; praeter gemit-
nam, sed leuiusculam pulmonis ad pleuram adhaesionem, et
tres lumbricos teretes in ileo intestino. Porro et cum his
lumbricis, et cum longe latioribus pulmonum adhaesionibus
millenos homines sanissime viuere, Anatomicis compertum est.
Vt proinde cum BOERHAAVIO §. 826. concludamus: „Cauda
„ejus plerumque est inordinatus, et violentus spirituum
„vitalium in cordis villos impetus etc.“ HAEN. *Rat. med.
P. IV. p. 36. 37.* His adjungi merito debet singularis ob-
seruatio apoplexiae conuulsivae, quae epilepsiae recur-
renti, moribus conuulsivis, et demum tetano successit in
puella vndeulgenti annorum, quaeque intra horas
tuor et viginti lethalis fuit. In ejus siquidem cadavere
diligentissime perlustrato nihil inuenit Cl. BOUCHARDT,
cui apoplexia tribui posset. *Récueil d'observat. de Médecine
etc. T. 47. p. 77.**

§. CIV.

Apoplexia
conuulsiva
duplex: alia
idiopathica,
sympathica
alia.

Quoniam vero apoplexia conuulsiva, siue spasti-
ca modo a causis circa neruorum principium loca-
tis, modo in partibus aliis, et longe diffitis existen-
tibus

tibus oriri potest: idcirco duplex ejus genus constituendum videtur, alterum *idiopathicae*, *sympathicae* alterum. Quae spasmos in ipso cerebro, aut cerebello, eorumque appendicibus causam habentes subsequitur, quum origo neruorum in ea idiopathice afficiatur, facile intelligi potest, qua ratione ipsa gignatur; ab eisdem nimirum causis, a quibus spasmi fiebant, validius cerebrum late sumtum prementibus, irritantibus, aut alio quocunque modo laedentibus. Difficillima vero explicatu ea est, in qua cerebrum sympathice tantum compatitur; nam quo modo spasmi in visceribus, puta imi ventris, aliisue in partibus exorsi in neruorum principium agere, apoplexiamque creare possint, res sane obscurissima est, postquam a Physiologis contenditur, duram meningem nullo siue sensu, siue motu pollere, neruosque *irritabilitatis Hallerianae*, et contractionis cuiusvis esse prorsus expertes.

§. CV.

Si quid tamen conjecturis dandum est, non vnum *Sympathicae* esse modum, quo spasmi apoplexiae causam praestant, *varia ratio.* ego quidem arbitrarer. Primum potest sanguinis motus in iis partibus, quos spasmus conuellit, non solum praepediri, verum etiam illa ejus portio, quae illuc progressura esset, aliorum auerti, cerebrumque versus compelli, atque vrgeri ita, vt majori copia, et impetu, quam conuenit, in illud ruat, ~~vasa~~ *vasa* oppleat, distrahat, imo quandoque perrumpat. Quod eo expeditius fiet, quo difficiljus a capite refluat sanguis, venis nempe majoribus per spasmos colli, diaphragmatis, thoracis, et praecordiorum compressis, coarctatisque. Hinc perspicuum plane fit, apoplexiam ex vasorum cerebri plenitudine nimia orituram, quae facile solui possit, si neruorum sensu languente spasmi cito laxantur; aut contra,

tra, si vasa rumpuntur, sanguinemque effundunt, cito morte finiendam. Quod si utramque huiusmodi speciem, etsi a spasms ortam, quis tamen ad sanguineam, aut serosam apoplexiam redigendam existimet, non valde ego repugnauero.

§. CVI.

*Paralysis
particularis
a spasm.*

Verum ad *spasticam*, siue conuulsuam aequare iure spectat leuior, particularisque apoplexia, frue paralyfis, quam spasmi alicujus partis post se reliquerint. Haec enim tunc nasci videtur, cum nerui, qui ad aliquam partem feruntur, a muscularibus fibris, aut musculis circumpositis, et vehementer contractis premuntur. Sed paralyfis ista breui desinit. Nam nerui resoluuntur quidem, sed breui laxato spasma, nisi vis magna eis illata fuerit, redit tam ipsi quam appensae parti et sensus, et motus integritas, quemadmodum in affectionibus conuulsuis grauioribus saepe saepius contingit. Si neruus opticus spasma fibrarum muscularium, quae eum prope cingunt^{*)}, compressus visum tollit; laxato spasma restitutus, restituit. Quod pluries in hysterismis vidimus.

^{*)} Non ignoro, fibras huiusmodi negari a nuperis quibusdam anatomicis; sed negari non potest, musculos uolum inuenientes adeo neruis opticis prope adhaerere, ut spasma illis affectis hi quoque constringi, et veluti vinclis comprimi queant.

§. CVII.

*Apoplexiae
sympathicae
mira spec-
ies.*

Fereque ad huiusmodi explicationes perstringi posset omnis apoplexia, quam conuulsuam, et sympathicam dicunt; nisi ejus quaedam species, in qua cerebrum ipsum ob neruorum dumtaxat commensationem affici videtur, quin vilo modo ex memoratis cerebrum compatiatur, nullamque labem post mortem ostendat, obscuritatis aliquid relinqueret, aliamque interpretationem postulare. Id in pri-
mis

nis euenit mulieribus hysteriis, infantibus, et pueris ex morbis conuulsis, quorum fomes alibi, quam in capite, sedem habet, apoplexia detatis; vti ex medica historia compertum est, atque a nobis ipsis supra (§§. LXXV. CIII.) subindicatum. Namque ne nimem praeterit, a causis in ventriculo, aut intestinis latitantibus sic affici cerebrum, vt totum inde corpus conuellatur, aut mens deliret, aut contra studeat, altoue somno obruatur: motus vero conuulsuos, delirium, stuporem, aut veterum definere, et discuti, expulsa per medicamentum purgans materiali causa, aut aliter innoxia reddita. Quid nimirum similibus ex causis vehementius agentibus, et saepius reuertentibus apoplexia gigni queat, quia in cerebro vlla labes relinquitur oculis profectoris percipienda? At quamam vaquam ratione spasmus, neruorumque consensus vim cerebro proxime inferant, modo quaerendum superest.

*Haec aliam
postulat ex-
plicationem.*

§. CVIII.

Quidam malum reputant a nimia liquoris nerui per irritamenta alicubi haerentia deriuatione, et ja-
ctura; ex quo cerebrum ferme exsiccum, atque inanitum reddatur. Alii spasmum dicunt per neruos cum medulla cerebri communicari; quod possibile sibi persuadent, etsi neruos irritabilitate carere multa jam pericula euicerint; sicque sentiendi, mouendique facultatem extinguere constringunt. Sed quam parum hisce hypothesebus tribui debeat, et quo usque locus iis esse possit, partim ex physiologicis, partim etiam ex his, quae antea iam exposita sunt, facile quisque perspiciet. Non nulli etiam, vt omnem difficultatis nodum expediant, suspicari non dubitant, in hypochondriacis, atque hysteriis passionibus aliquid ab imi ventris latibulis, aut ab utero, quando in his spasmodum fomes residet, in sanguine.

*Quid alii
cogitarint.*

sanguinem transfundi, quo ipse crasset, co-
turque adeo, ut in minutissimis cerebri vasculis de-
de consistere, atque haerere debeat. Quod et si
ne ulla contentione fieri interdum posse largirentur
tamen apoplexia inde nata rectius metastatica, quae
convulsiua diceretur, et sane huiusmodi meta-
staseos in cerebro, aut ejus vasis, ut patet, indies
non deficere debuissent.

§. CIX.

*Alia expli-
cacio.*

Quos ob res, ut a difficultate non longius dif-
ferant alii, quibus ratum, fixumque est, in apoplexia
convulsiua non solum cum vita deleri cerebri fun-
ctiones, verum etiam nihil interdum in eo videri
Etione anatomica deprehendi; se se eo conuertunt,
ut credant, spasms itinera sanguinis arctari, occlu-
dique posse, ne ullus ad cerebrum eidem pateat ad-
itus, vel saltem cordis motum spasmo penitus inhi-
beri, et supprimi (quo rissotivs inclinare a) vi-
detur), vel cor idem (quae altera ejus conjectura
est) paralyti tactum conuiuiscere, et sic vitam in-
tercipere. Verum consideratio viarum, quae san-
guinem ad cerebrum mittunt, vix finit, ut eas per
spasmos omnino occludi posse existimemus. Quan-
quam vero et vias ejusmodi occludi, et cordis mo-
tum spasmo intercipi non inficiaremur, ut illi opo-
nantur; non tamen ideo satis pateret, num apop-
lexia, an vero syncope cardiaca morbum prius
praestitisset. Etenim hac ex causa non
non est, mulieres vehementibus convulsiuis affec-
tibus obnoxias repentina morte, siue asphyxia
thali interdum occidi. Si vero cor paralyti in-
matum mortem attulisse dixeris, ut secundo lo-
idem vir celeberrimus suspicatus est, restat ad
disquirendum, an haec cordis paralytis idiopathica
sit, aut vero sympathica ex cerebri laesa functione
Si primum, mors a syncope; si alterum, ab apop-
plexia

plexia erit. In hac igitur specie tota adhuc versatur vis propositae disquisitionis, quomodo nempe a sympathica apoplexia, quae sine conspicuo, et visibili cerebri vitio mortem intulit, cerebrum consensu aliarum partium affectum sit, et quid passum? Alterutrum fortasse conjectari licet, videlicet vel spasticas contractiones ad arteriolas usque minimas cerebri, nam irritabiles eas esse non incongruum *) est, ita propagari, ut spasmo contractis atque affectis, iis commercium inter corticem, et medullam, atque inter hanc, et reliquas corporis partes (§. LXXV.) interrumpatur; vel nervorum extrema a causis spasmus efficientibus intime adeo percellant, et labefactari, ut eorum etiam origo, cerebrum videlicet, cerebellum, et medulla oblongata similem labem in tenerrima elementari fabrica incurrant, propter quam ea fibrarum subversio, aut alia praeter naturam mutatio consequatur, quacum et sensus, et motus exerceri minime queant **). Ultra progredi vetat ignorata adhuc nervorum tum natura, tum actio, aut certe densissimis magnam partem tenebris inuoluta.

Conjectura nostra.

*) L. c. supra §. 103. not. *).

**) Videantur quae hac super re in *Comm. de Inflamm.* §. XXXVII. ad not. f. g. h. protulimus. Nervis porro arterias non carere, post SENACIUM (*Du cœur* T. 2. p. 169.), HALLERUM (T. 2. p. 206. et 202. et 252, et *oper. min.* T. 1. p. 223. et alib.), et MORGAGNIUM (*ep. anat. med.* 24. n. 29. et 30.) affirmat TISSOTIUS (*Tratt. de nerv.* T. 1. p. 3. art. 6. §. 2. et seqq.), et nuperrime ANDREAS COMPARETUS, qui in *Accurs. med.* §. III. n. 47. et seqq. nervos quamplurimos arteriis non modo circumdari, sed intime cum earum fibris commisceri vidit.

*) Nolo hic silentio praeterire animadversionem apud me opportunam Cl. HAENII, quae hisce verbis continetur: *Difficilius quidem est explicatu, cur inchoamentum apoplexiae ab eadem causa (nimirum intercostalis nervi contractione) in thorace premente, aut vellicante fiat; sed ab altera parte*

parte facile concipiunt, posse unicum nervulum alicui vehementer premi, et agitari, ut inde totum sensorium commune turbetur. In ulcere ruditer agitatus nervus (quem ego aliquando vidi ab applicato ad deprimendas fungos carnes lapide infernali) universi corporis convulsionem facit. A mera dumtaxat applicatione venenorum ad ventriculi os, qui ab intercostalibus, et vago pari, speciei apoplexiae nascitur, saepe, expulso cito veneno, mox evanida. In re abscessu pulmonis haec apoplexia remittit, breviq; post cessavit ipsa, et simul, quae ipsam comitata, sequutaq; fuerat resolutio. *Rar. medend. P. III. cap. 2. p. 121.*

§. CX.

Quomodo apoplexia differat a syncope.

Quomodo differat a suffocatione hysterica.

Discrimen inter epilepsiam, et apoplexiam.

Nunc quemadmodum apoplexia ab aliis affibus morbis differat, exponendum est. Differt a syncope, quod in hac facies semper pallet, respiratio vel cessat prorsus, vel omnino lenis est, nullus in arteriis pulsus percipitur, sudor e fronte plerumque manat, atque extrema algent. Negari tamen haud potest, si summus sit apoplexiae gradus, id est morti jam proximus, interdum eam vix a syncope distingui posse, nisi ad alia signa, quae intercesserint, quaeque ex familiaribus, domesticisque resciri poterunt, confugiamus. Non leue quoque discrimen est inter apoplexiam, et suffocationem hysterica; nam in hac nec partes penitus resolvantur, nec sensus omnis perit, cum hystericae et praeterea, et vallicatae dolorem perferant; ac praeterea, si grauior sit affectio, respiratio, et pulsus deficere videntur, uti in syncope; et postquam accessione redierint, recordantur plerumque eorum, quae acta sunt, quaeque eis acciderunt, dum mortuae videbantur. Nec quidquam obstat hystericam, si vera est, mulieris a VESALIO dissectae; cum syncope, aut apoplexia hysterica, siue convulsione non suffocatione, eam correptam fuisse, verosimiliter reputetur. Epilepsia vera ratione sensus animae penitus intercepti maximam habet cum apoplexia affinem.

nitatem: candens quippe ferrum cuti impositum
b epileptico non sentitur. Ab apoplexia tamen
iscernitur, quod in illa, nempe epilepsia, totum
corpus, si perfecta est, conuellitur, inconditisque
motibus exagitur.

§. CXI.

Restat modo, ut aliquid, quod ab initio recepi- *Carus, Cr-*
mus, de soporosis quibusdam affectibus, *caro, co-* *ma, Lethar-*
mate, et *lethargo* dicamus. Hi enim ad apoplexiam *gus.*
ita prope accedunt, ut SENNERTO, BOERHAAVIO,
aliisque non paucis leuioris apoplexiae species vi-
deantur. Cumque easdem fere causas habeant,
quas illa, in primis apostemata cerebri; lymphae
mucosae, aut concretae intra duram, et piam ma-
trem collectionem; feri limpidi, aut crassi, et tur-
bidi circa, aut intra cerebrum effusionem; et de-
mum ipsam vasorum ejus nimiam plenitudinem,
aut sanguinis in iis congestionem, pulmonum mor-
bis, et praecordiorum vitiis praesertim organicis,
cordis nempe polypo, aneurysmatibus, varicibus,
aliisque plerumque succedentem a); non erit id-
circo alienum singulorum phaenomena hic summa-
tim recensere, quo facilius a vera, et valida apo-
plexia discriminari queant.

a) MORGAGN. l. c. *Epist. VI.*

§. CXII.

Summum eorum gradum constituit *καλός* *), siue * *Carus.*
apoplexia minor quorundam auctorum a). Qui eo *Hujus signa.*
tenentur, etsi ut apoplectici profundissimo somno
obruuntur, succussi tamen, vel puncti, vel clamo-
ribus excitati oculos aperiunt, puncta, et vellicata
membra retrahunt, interrogantibus, quamquam
inconcinne, respondent tamen; et licet mox in so-
mnium relabantur, non ideo stertunt, sed libera re-
spira-

spiratione fruuntur. Contra apoplectici puncti concussi, vstulati, motu, et sensu carent, perpetui somni imaginem prae se ferentes.

a) SAVVAG. Nosolog. Cl. IV. §. XXIX.

§. CXIII.

* Coma.

Cari quasi leuior species videtur *Κῶμα* *, quod

* Cataleptica.

Signa propria.

Ejus differentiae.

* Typhomania.

* Coma agrypnos, vel Agrypnodes.

a GALENO *καταφορά* * etiam nominatur. Hoc prehensus homo non solum facilius excitatur, et iterum in somnum recidat, verum etiam appositum ad interrogata respondet. Diuiditur *coma* in *somnolentum*, et *vigil*. In *somnolento* profunde quidem dormitur, non ita tamen, uti in *caro*. In *vigili* vero, cui etiam nomen est *τυφομανία* *, et *κῶμα ἀγρυπνόν* *, vel *ἀγρυπνώδης* *, adest quaedam ferme insuperabilis in somnum propensio, e quo tamen aegri crebro excitantur, veluti strepitu quodam repentino perterriti, aut infomniis terrificis perpetuo exagitati, sic ut nunquam somno, quem exoptant, vehementer, frui possint.

§. CXIV.

Num cum febre conjungatur?

Modo primum, modo symptomaticum.

Quibus morbis superueniat, quos comitetur.

Vtrumque morbi genus (§§. CXII. CXIII.) nempe tum *carus*, tum *coma* ex nonnullorum auctorum sententia cum febre conjungi dicitur: juxta alios sine febre est; prout nimirum, ut ego arbitror, casu illud cum febre, vel sine ea offenderunt. Nam si primum fuerit malum, ab eo febris abesse solet; contra cum febre jungitur, si symptomaticum, si est, si symptoma fuerit febris alicujus, vel inflammationis, vel cephalitidis, vel phrenitidis, aliusve morbi febrilis. Plerumque hemiplegiae, phrenitidi, febribus acutis, atque inflammationibus superuenit. Saepissime exanthemata variolosa, morbillosa, et miliaria antecedit; et fere perpetuo febris lentas nervosas malignas, et gastricas acutas comitatur.

itur. Quando coma non turbulentum, sed platum morbis acutis accedit, etsi diu persistat, non tamen malum portendit; quia delirium, dolorem capitis, atque alia grauiora praecauet, arcet, aut adat, et in pueris etiam febrem ad iudicationem saepe feliciter perducit a).

*Coma
prognosis.*

a) BAGLIVIUS *De capis. affectib. in acut.*

§. CXV.

Quod ad *lethargum* attinet, hunc sine febre alii, cum febre, et quidem lenta conjungi volunt. Juxta dissensionis causam hic quoque eandem considerim, quam paullo ante (§. CXIV.) adduxi. Est autem ipse immodicus sopor, qui nocte, dieque opprimit aegrotantem; sed is non repente, et subito corripit, verum pedetentim subrepat, atque in dies. Qui eo premitur, supinus jacet, oculis semiclausis, atque ore hiantem; excitatus oscitat, parum loquitur, de capitis grauitate, aut dolore queritur, in summa omnium rerum, etiam proximarum, et paullo ante gestarum obliuione versatur; vix petentibus respondet, mox in eundem soporem incidit, pulsu interim crebro, molli, inaequali, languido, et tardo, quandoque etiam vndoso; respiratione vero rara, et debili. Definiri igitur potest somnus profundus cum obliuione summarum rerum, quae ad aegrum pertinent, coniunctus; talis tamen, ut eo detentus excitari aduocet facile, et responsa dare possit, quamuis obscuro saepe, breui, inordinatoque sermone.

*Lethargus
quid?*

Signa.

*Definitio
lethargi.*

P r o g n o s i s.

§. CXVI.

Periculosissimus morbus est apoplexia vera, et exiusta, utpote quae plerumque morte finitur; quia

*Cur apo-
plexia peri-
culi plena.
vel*

spiratione
concussa.
somnia in

a) SA

* Comb. Ca

* Casapora. a GAI

Signa pro- prehe
pria. iteru

Ejus diff- ad in
censiae. lent:
dori

* Typhema- ro,
nia. αγ

* Coma a- in
grypnos, vel

* Agrypno- ac
des. F
C

Nam cum f-
bre conjun-
gatur?

Modo prin-
cipium, m.
Simul

Quae

§. CXVIII.

tiam apoplexiae erit exitus pro ejus gra-
 XCVI. XCVII.) diuersitate. In primo
 secundo gradu (§. XCVII.) spes aliqua fa-
 et in periret. In tertio licet experiri, quid ars pos-
 felicitas tamen aliquid certi promittatur in summo
 imine versanti. In quarto (§. eod.) cura-
 tati quidem debet, nisi certa praedicta
 Nam rectissime scripsit HIPPOCRATES:
 ad apoplexiam vehementem quidem, impossibile:
 am facere non facile a).
 de diffi- corism. 42. sect. II.

*Secundum
 apoplexiae
 gradus va-
 rius etiam
 exitus.*

§. CXIX.

ratim pessimum signum exhibent rhonchi,
 orisque spuma a). Nec aliter sentiendum
 nperedita glutienti potentia, et de potulen-
 per nares reditu. Mala semper respiratio-
 ecutaque laesio. Non tamen contra respi-
 secundum naturam procedenti temere, et
 alto fidendum, quod ex MORGAGNIO jam
 (§. XCVII.) monuimus. Lethalis quoque esse
 poplexia febris acutae, epilepsiae, aut meta-
 cedens. Mala pariter censetur, in qua su-
 igidus ex vniuerso corpore, aut aliqua ejus
 erumpit. Leuior apoplexia, sine particula-
 (§. LXXXVI. LXXXVII.) minus periculi por-
 sed paralyfin saepe, aut imbecillitatem ali-
 partis relinquit.

*Signa anti-
 iii.*

aph. 51. sect. VI. aph. 43. sect. II.

§. CXX.

in sideratis succedentes haemorrhoides vtilis
 inquit auctor coactarum a). Item in sideratis,
 oris accedat, solutio b) fit. Huc quoque per-
 III. P. I.

*Signa me-
 lioris notae.*

G

tinet

vel ob cerebrum infarctum, aut impeditum vel mentius humorum vis, et motus ad cerebellum etiam conuertitur, vel materia cerebrum laedens, aut comprimens tanta est, ut omnem eorum originem, cerebellumque, quod vitae praesse creditur, attingat. Senes potissimum thoricos, desidesque, atque eos, quibus cerebrum haereditaria labe, aut morbo aliquo debilitatum est saepe trium, aut, quod summum est, septem diebus in spatio a) enecat. Interdum etiam vno, vel altero die, imo temporis momento vitam abruptam Recidens est. Et si quis euaserit, facile recidiuus fieri consuevit.

a) Coac. n. 187. Coelius Aurelianus. l. 2.

§. CXVII.

Periculosior Speciatim *sanguinea* periculosior est, quam *serosa* *sanguinea*, *sa*; vtraque adhuc, quam *convulsiva*. In *sanguinea*, *deinde serosa*, *sa*, denum *convulsiva*. si sanguis e suis vasis effluerit, vix sperare licet, ut discuti, resorberive possit, aut eorum ostia occludantur. *Serosa* saepe excipit hemiplegia, aut grauior aliquarum partium paralytis, obliuio, fatuitas, languor. *Convulsiva* ut plurimum per aliquot horas soluitur sponte vomitu, diarrhoea, sudore, vrina, aliaue peculiari excretionem, nulla re relicta nota, vel tantum leuissima in ore, lingua, aut alia aliqua corporis parte. Si autem res diffregerit, ut quandoque accidit, aut aliter eorum vitalium originem, aut eorum progrediens laeserit, quod in primis post epilepsiam, aut mentes convulsiones praesertim in sanguine scitibus non rarum est, subitanea fere morte conficitur. Periculi non levis plena quoque est apoplexia *metastatica*, *statica*, vti *arthritica*, *lochialis*, *lactea* (§. CXV). praesertim si non cita adhibeatur medela; nam intra paucas horas plerumque interimit.

§. CXVIII.

Varius etiam apoplexiae erit exitus pro ejus graduum (§§. XCVI. XCVII.) diuersitate. In primo enim, et secundo gradu (§. XCVII.) spes aliqua salutis effulget. In tertio licet experiri, quid ars possit, quin tamen aliquid certi promittatur in summo vitae discrimine versanti. In quarto (§. eod.) curatio ne tentari quidem debet, nisi certa praedicta perniciē. Nam rectissime scripsit HIPPOCRATES: *soluere apoplexiam vehementem quidem, impossibile: debilem vero non facile a).*

Secundum apoplexiae gradus varius etiam exitus.

a) Aphorism. 42. sect. II.

§. CXIX.

Generatim pessimum signum exhibent rhonchi, stertor, orisque spuma a). Nec aliter sentiendum est de impedita glutienti potentia, et de potulentorum per nares reditu. Mala semper respiratio- nis quaecunque laesio. Non tamen contra respi- rationi secundum naturam procedenti temere, et inconsulto fidendum, quod ex MORGAGNIO jam supra (§. XCVII.) monuimus. Lethalis quoque esse solet apoplexia febris acutae, epilepsiae, aut meta- stasi succedens. Mala pariter censetur, in qua su- per frigidus ex vniuerso corpore, aut aliqua ejus parte erumpit. Leuior apoplexia, siue particula- ris (§§. LXXXVI. LXXXVII.) minus periculi por- tendit; sed paralyfin saepe, aut imbecillitatem ali- quis partis relinquit.

*Signa anti-
tiii.*

a) Hipp. aph. 51. sect. VI. aph. 43. sect. II.

§. CXX.

In sideratis succedentes haemorrhoides vtilis- sime sunt, inquit auctor coacorum a). Item in sideratis, si febris accedat, solutio b) fit. Huc quoque per-

*Signa me-
lioris notae.*

*Quando fe-
bris morbum
soluat.*

tinet HIPPOCRATIS aphorismus, qui sic habet:

Quibus sanis dolores derepente fiunt in capite, et statim muti euadunt, ac stertunt, in septem diebus per-eunt, nisi febris prehenderit c). Sed huiusmodi oraculi effatum aliqua eget interpretatione. Febris quippe, vt morbum soluat, esse debet vel ephemera, quae inter initia in sanguineo, aut biliolo temperamento accedat, vel acuta, quae phlegmaticis superueniat, atque humores in vtrisque adhuc intra vasa consistant, et contineantur. Si vero hi extra vasa jam eruperint, aegrumque morbus diutius fregerit, febrem noxiam praedicat DVRETUS in commentario, neque ei aduersantur Coacae praenotiones d). Cum DVRETI expositione consentit Cl. PVIATVS e), monetque febrem, vt salutaris sit, maturius accedere debere, et validam quidem, vt ephemera est, at non inflammatoriam. Additque vir expertissimus, febrim, quam totis triginta annis, quibus clinicen exercuit, superuenire vidit, aut inflammatoriam fuisse, adeoque perniciem accelerantem, aut exiguam nimis, aut nimis seram, proindeque inutilem. Quod frequentissime a nobis quoque animaduersum esse testamur.

a) N. 478. b) N. 479. sect. 2. c) Aph. 5. sect. VI.
d) N. 480. sect. 2. e) Letter. al Figlio inserita nella
Raccolt. d'opuscol. del CALOGERA, Tom. 50.

§. CXXI.

Signa prognostica paralyticum particulare.

Paralytes autem particulares, imo ipsa hemiplegia, si superstes sensus, calor, et nutritio in parte resoluta sit, neque in ea arteriarum motus valde subsederit, magnam spem curae faciunt. Si vero cum motu sensus perierit, arteriaeque languidissime moueantur, et stupor talis sit, vt pars ad corpus non pertinere videatur, et quasi ligno ad obstacula porrecto eadem vtatur aegrotans, pejor tunc longe

malis

mali conditio est. Si demum frigus, et marcor, siue macies partem occupet, incurabilis ferme semper est ea paralyfis. Id in paralyfi, quae colicam Piætonum subsequitur, euenire maxime notat SWIETENIVS a). Nec rarum est ob diuturnam musculi paralyfin, ejus antagonistam praeualere, et membrum, cui affigitur, suam originem versus retrahere, vnde *contractura*, et *rigor* b) oboritur. Sed non omnis contractura membri ex hac causa statim reputanda est. Resolutae interdum partes atrophica ita arescunt, vt musculi tendines, et ligamenta ossium decurtata rigeant.

a) L. c. §. 162. b) Id. ib. §. 326.

C u r a t i o.

§. CXXII.

Simul ac Medicus ad apoplecticum arcessitus accedit, primum curare debet, vt aeger in conclau lucido, et temperato collocetur, corporis trunco supra lectulum paullulum erecto, et capite nudato, pedibus vero probe tectis, et demissis, laxatisque circa collum, pectus, ventrem, aliasue partes vestimentis. Perpendat interea, si commode fieri potest, qua temperie, qua ætate, habituque sit; quo vitae genere, dum valebat, vteretur; tum quae causae morbum anteuerint, quae eidem occasionem dederint, quae demum fuerint antea, quaeque sint ejus vires, et recte hisce omnibus cognitis, et perpensis apoplexiae speciem, et gradum definiat, aptamque eidem properet adhibere curationem.

Quomodo collocandus aeger.

§. CXXIII.

In sanguinea apoplexia per sua signa (§. XCIX.) recognita sanguis vel copia, vel impetu, vel mora cerebrum premit, vrget, impellit. Ergo eum mitti illico

Cura apoplexiae sanguineae.

*Sanguinis
missio.*

illico oportet. Quo fit, vt copia imminuta, impetuque retuso, atque auocato, qui reliquus in vasis supereft sanguis, liberius et facilius circumagatur, sicque cerebrum releuetur. At liberali manu, latoque vulnere mittatur, praesertim si valde plethoricus sit aeger, aut aetate, et viribus vigeat. Quantitas ejus non facile decerni potest; a viribus enim, aetate, habitu, regione, sexu, et potissimum a pulsus magnitudine, et robore, itemque faciei rubore aestimanda est. Negant aliqui mittendum esse in phlegmaticis, melancholicis, senibus *), pueris, atque vtero gerentibus. Verum eos experientia refellit HIPPOCRATIS a), ARETAEI b), COELII AVRELIANI c), et medicorum fere omnium, qui medendi longo vsu inclaruerunt.

*) Utilitatem vt demonstret largioris sanguinis missionis etiam in senili aetate LANCISIUS (*De subit. mortib. l. 2. cap. 51. n. 8.*) narrat, mercatorem grandaeuum, cui impendebat apoplexia, ab hujusmodi instanti periculo subductum, et leuatum esse per sanguinem sponte e naribus ad vndecim libras profusum, deinde omnino liberatum, quatuor aliis libris post quindecim dies rursus erumpentibus.

a) *De vi&it. ration. in acut.* b) *De curat. acutor. cap. IV. c) Lib. 2. cap. 10.*

§. CXXIV.

*Quo loco,
et quantum
sanguinis
destrahi de-
beat.*

Itaque si vires non deficient, vel oppressae tantummodo videantur ob nimiam vasorum plenitudinem, et reliqua consentiant, adulto statim vena brachii, et quidem resoluta oppositi, si hemiplegiacus fuerit, quod, monente ARETAEO a), et post VALSALVAM MORGAGNIO b), vtilius esse docent *) obseruationes, tundatur, sanguinisque vnciae duodecim, aut etiam in majori plethora octodecim detrahantur. Non desunt etiam qui multo largiorem effusionem sine syncopes periculo ferant. Nec ab

eo mittendo nos deterreat pulsuum intermissio, aut inaequalitas, nisi alia signa virium vitalium defectum, atque exsolutionem euincant, donec satis praesenti periculo prospectum videatur. Nonnulli etiam suadent, in summa vasorum plenitudine, et cerebri oppressione venas vtriusque brachii, imo pedis vna aperiendas, vt citissima fiat a cerebro reuulsio. Verum id auxilii exercitatissimum, prudentissimumque Medicum expostulat, ne lethalis syncope tragoediam absoluat.

a) *De morb. acut. curat. l. 1. cap. IV.* b) *Epist. anar. XIII. n. 17. et anatom. med. III. n. 17.*

*) MAYNARDVS SIMON DU PUY in dissertatione de homine dextero, et sinistro laudat venae sectionem in hemiplegia ex cerebri laesione orta instituendam in parte lateri affecto opposita; etsi neget auctor iste neruorum deussationem.

§. CXXV.

Si quod prima venae sectione detractum sanguinis est, non satis profuerit, tribus post horis, imo etiam citius, prout res postulabit, iterum detrahatur. Non nulli id ex pede faciendum, alii ex brachio iubent. Sed locum opportuniorem indicabit sagax, et propria circumstantiarum consideratio. Menstrua, haemorrhoides, et lochia fluentia, aut retenta, sanguinis e pede missionem vt plurimum anteferendam praecipiunt. Ex pede quoque, et quidem eo, qui resolutus sit, in hemiplegia detrahi saepius vtilissime sanguinem experientissimus vir obseruauit, quod facilius, ac fortius dimoueri possunt obstacula conuulsionum, et obstructionum, quae in vasis laesae partis spinalis medullae, vel cerebri basis obstinaciter haerent *). Deinde ad venarum jugularium sectionem, quam FREINDIVS a), LANCIIVS b), aliique quamplurimi c) extollunt, aut ad arteriotomen in temporibus, quod etiam proponit

Quando iteranda V. S.

Quando ex pede.

Sectio jugularium, et arteriotome.

HEISTERVS d), deueniendum est, si nondum sensus, et motus redierint, aut capitis dolor alicubi defixus, et persistans non satis cerebrum leuatum significet. Venam pariter frontis, ubi jugulares non appareant, aut incidi nequeant, imo sublinguales aperiendas non nulli existimant; at plerumque non sine graui id incommodo fieri potest, nec satis proficuum, atque expeditum, secus quam **PETRVS A CASTRO**, **P. SALVS DIVERSVS**, et **LANCISIUS** in morbis capitis contendunt, auxilii genus a **PLAT- NERO** reputatur. Sed in sectione jugularium, aliarumque, quas memoraui, venarum, si tentanda videatur, cauendum, vt alibi (§. XXIV.) animaduertitur, est, ne vinculo collo injecto, vt intumescant, sanguinis e capite reductus magis magisque retardatus congectionem in cerebri sinibus, vasisque adaugeat. Sola digiti applicatione venae jugulares, aut aquae ore detentae fotu raninae, vt tumeant, incidique possint, curandum est.

*) **LANCIS. de sub. mort. l. 2. cap. V. §. 3.**

a) *Op. omn. in Hipp. epid. comment. II. de sang. missum etc. p. 32.* b) *De subitan. mortib. l. 2. cap. V. §. 3. et 4.* c) **TRALLIANVS lib. 4. ACTVARIUS l. 3. cap. I. FABRICI HILDANVS Cent. 4. 14. ALPINVS Med. Aegypt. et post hosce plerique recentissimi scriptores.** d) *Compend. med. cap. XIV. §. XXXII. p. 296.*

§. CXXVI.

*Cucurbitula occipiti ad-
mota lauda-
tur.*

Occipiti cucurbitulam, incisa altius prius cute, apponi, atque hinc sanguinem extrahi, praesertim ubi jam largiter aliunde effusus est, aut vires e venis effundi eum prohibeant, vtilissimum quoque est; non sic tamen, vt cum missione sanguinis e brachio, aut vena jugulari, **MORGAGNIO** etiam ipse dice a), comparari possit. Venae enim occipitales vt alii externae jugularis furculi, communicant iuuenili praesertim aetate cum venosis meningum sinibus.

finibus. Hac sola bis in occipite profunde scarificata ZACVTVS LVSITANVS b) iuuenem *resoluto jam pulsu, ut in horas moriturus videretur*, ad ferenda alia auxilia imparem, restituit. Magnam quoque opem id praesidii genus attulit *laboranti olim contumaci quadam, ac perdifficili soporosa affectione* M. ANTONIO CICOGNINO, celeberrimo tunc Aemiliae Medico c). Laudanti MORGAGNIO se comitem adiungit MEADIVS d), qui *permagnum hoc auxilium esse confirmat in maxime periclitantibus apoplecticis, et magnopere iuuisse non semel expertus*. Sed ante hos a priscis etiam temporibus ejusmodi chirurgiam tanti fecit ARETAEVS, ut in haec verba e) prorumperet: *Quum morbus diu trahitur, et caput in causa est, cucurbitula occipitis affigenda est, et sanguis largiter hauriendus: plus enim, quam venae sectio, proficit, et vires nequaquam labefactat* *).

a) *Epistol. anat. medic. II. art. 10.* b) *De med. Princ. Histor. l. I. hist. 33.* c) MORGAGN. *Aduers. anatom. VI. animaduers. 83.* d) *Monit. et praecept. medic. cap. 2. §. 1.* e) *De morb. acut. curat. l. I. cap. 4.*

*) Nemo autem fusius, diligentiusque scripsit de hoc praesidio, MORGAGNIO teste, quam AVG. FRID. WALTHERVS, qui dissertationem edidit *De scarificatione occipitis, plurium capitis morborum auxilio*, et tam aliorum, quam suis observationibus id comprobauit.

§. CXXVII.

Alii vero eandem cucurbitulam non occipiti, sed vertici, siue sincipiti imponendam a) jubent, quo praesidio vtilissime in quadam virgine vestali apoplectica vsus fuisse FRACASTORIVS fertur, licet ipse apoplexia tactus, et ab adstantibus non intellectus eo carere debuerit, incassum manu loco, quo defigenda erat cucurbitula, pluries indicato b). Ad latera etiam colli defigendas, scarificandasque cucurbitulas esse monet MEADIVS c), vti HALY d),

Etiam vertici, et colli lateribus vtiliter affigitur.

FORESTVS e) et **SCHENCKIVS f)** ante eum proposuerant. Nec inutile, aut alienum est, eas tam siccas, quam scarificatas reliquis etiam corporis partibus admouere, dummodo posteriori thoracis regioni, siue dorso parcatur, ne motum respirationi inferuentem, jam languidum praepostere intercipiamus; quamquam id a **DODONAEO g)** non videatur satis animaduersum, cum eas dorso admotas plurimum celebrauerit. Solent vero qui eas dorso admouent, aegrum non primum in pectus collocare, sed in latus reclinare, quo respirationi minus officiat.

a) **PETR. APONENS.** in *complem. Mes. de morb. cereb.* c. 17., **CRATO** *consil.* 36 et 37., **SENNERT.** l. 1. *Pract.* P. 2. c. 33. fol. 680. b., **GR. NYMANN** de *apopl.* c. 39. p. 229. b) In *uita FRACASTORII* vers. fin. **HEVRNIUS** cap. 24. de *affect.* capit. p. 270. c) *Monit. et praecept. med.* cap. 2. sec. I. d) *L. 3. aphor.* e) *L. 10. obseruat.* 76. in *scholio.* f) *L. 1. obseru.* 149. g) *L. 2. Prax.* cap. 15.

§. CXXVIII.

*Hirudinum
applicatio.*

Imminuendi, reuellendique sanguinis consilio hirudines etiam, non solum temporibus, et pone aures, quod supra aduersus dolorem capitis proposuimus, verum etiam ano applicentur, praesertim, si ab haemorrhoidibus, aut catameniis suppressis, aut ab hypochondriorum affectibus permanauerit apoplexia. Proderunt quoque, ubi aliam causam habuerit; cum in primis venae aliae commode, et tuto aperiri haud potuerint. Sed tunc vniuerso corpori, aut pluribus saltem partibus, ut largius sanguis effluat, admouendae sunt. In pueris, obesis, foeminis, debilibus phlebotomiam formidantibus interior cubiti pars ad id aptissima omnium esse censetur.

§. CXXIX.

§. CXXIX.

In vniuersum illud apud plerosque in more pos-
 itum est, vt post missum e partibus capiti propiori-
 bus sanguinem, venae inferiorum referentur ad re-
 illendam. At sanguinem missuro magnum saepe
 egotium facessit illud CORN. CELSI documentum: *De reuul-*
sionis ratio-
ne.
omnia membra vehementer resoluta sunt, sanguinis
de sanguinis
detractio vel occidit, vel liberat a). Verum, si quid
missione ju-
dicium.
 ro interpretor, sanguinis detractio occidit, vbi ab
 fuso intra cranium, aut cerebrum cruore, aut ab
 ydropica colluue morbus fiat. *Liberat* vero, vbi
 opia; et congestio sanguinis intra vasa adhuc est,
 e, vt ~~et~~ vasa, et cerebrum depleri, et releuari
 ueant. Quam ob rem appositissime nitidissimus
 scriptor subjicit: *post sanguinis missionem si non redit*
motus, et mens, nihil spei superest; si. redit, sani-
s quoque prospicitur.

a) *Lib. III. cap. 27, n. 20.*

§. CXXX.

Detracto sanguine; aluum ducere oportet cly-
 state, non admodum acri, nec calido, ne spasmi
 imo ventre excitentur, qui sanguinem caput ver-
 is magis, magisque propelleret; in quo plerum-
 ue nimium temere peccari solet. Subductis sic
 assioribus excrementis, si aegro deglutiendi facul-
 s manserit, danda intrinsecus sunt eccoprotica
 tiphlogistica, vt lenis alui fluxus cieatur; qui
 nibus capitis morbis saluberrimus esse consue-
 t. Quoniam vero in vehementiore apoplexia ani
 hinc ~~tor~~ saepe resoluitur, et deglutiendi actio amit-
 ur; eo in casu balanis, siue *suppositoriis* aluus ad
 erendum sollicitanda est. Si id in irritum cedat;
 baci, siue *nicotianae* fumus in anum insufflari et-
 n potest, vt eo peristalticus intestinorum motus
 nitetur; sed ab eiusmodi remedii usu cane pejus,

Clystere al-
vus laxanda.

Excoprotica
miora con-
ueniunt.

Quando ba-
lanis usen-
dum.

Causio cir-
ca fumum
tabaci.

et angue cauendum in apoplexia, quam carbonum fumus, aut nicotianae abusus, aut noxii alii halitus (§. LXXXV.) induxerint. Ceterum si eo necesse vti cogat, prudentissime se gerere medicum de ne languida neruorum vis mephiti narcotica istiusmodi penitus exstinguatur a). Fumo tutius videtur leue foliorum nicotianae decoctum, aut dilutum

a) Vid. BASSIAN. CARMINAT. *De animal. ex mephitis. & nox. halit. interitu etc.* l. 3. cap. 2. p. 174. 175. 176.

§. CXXXI.

Animaduersiones circa emetica.

Emeticorum usum vetans.

Nocumenta ab emeticis.

Nulla in morbo animosius, quam in apoplexia se gerunt vt plurimum medici, vt quouis artus ad iumento aegrum multo stupore detentum excitant. Non paucos videre est, qui RIVERII, atque HELMONTII in primis experientia confisi emeticis promiscue, et temere ad id vtuntur, seque CELSEI auctoritate strenue tuentur, dicentis, melius esse *anceps experiri remedium, quam nullum*, vbi res fere ad desperationem adducta est. Sed animadverterent velim, multa emeticorum usum vetant, obesum videlicet corpus, collum breue, et crassius, angustiores thoracis caueam, ventris amplitudinem, plethoram, procliuitatem ad sanguinis vomitum aut sputum, organica pulmonum, praecordiorumque vitia, oculorum grauem aliquam affectionem, capitis imbecillitatem, tumores magnos colli, praesertim glandulae thyreoideae, enterocelen, hydrocephalon, grauidum vterum *), ventriculi vlcus, scirrhum, peculiarem idiosyncrasiam ad vomendum aduersam, aetatem sensilem, et decrepitam, regem, et anni tempus hiemale a). Praeterea ne sanae mentis negabit, periculosum maxime emeticum propinare, vomitum ciere in ea apoplexia, quam vasa cerebri aut praeter modum sanguine distenta, aut rupta, aut corrosa effecerint.

enim non videat, vomitu sanguinem vberius, validiusque ad caput propelli, ejusque inde refluxum impediri; sic vt vasa ipsa magis, magisque turgent, ruptionemque, si forte adhuc illaesa essent, facilius, citiusque subeant; si vero jam dilacerata sunt, ampliore facto vulnere copiosorem sanguinem effundant? Inter vomendi porro conatus diaphragma, cor, pulmo jam fere paralyticis proxima opprimantur, atque aeger respiratione sublata extemplo suffocetur, necesse plane est. Non semel meis ipse oculis vidi datum ab aliis emeticum, et vehementer dolui, hemiplegiam, vel leuem, et particularem apoplexiam illico in validam, et vniuersalem transiisse; fortem vero, atque exquisitam intra paucas horas in mortem. Scio equidem a medicinae actiuioris laudatoribus, qui in hac praesertim regione frequentissimi sunt, jactari obseruationes, ex quibus vtilitas dati emetici in apoplecticis ostendatur. Sed a paucis felicioribus exemplis, quae naturae robustioris beneficio plus, quam artis operi tribuenda fortasse fuerunt, inferri haud potest, emetica ex se, quod aliunde semel, iterumque constitit, perniciofa non esse **).

*Exempla
exisii.*

*) Non dubitant nuperiores quidam Medici, in transalpinis praesertim scholis instituti, etiam foeminis vtero gestantibus emetica proponere, quod putant, vt opinor, eas vt vomitum ex grauiditate ortum, sic arte exitum commodissime ferre posse. Sed recordentur isti, quaeso, non paucas mulieres vtero gerentes ob frequentem, et molestem vomitum, quo vexabantur, in abortum incidisse. Quamobrem eorum auctoritate, atque audacia non ita permoueor, vt satius, tutiusque non iudicem, illos se gerere, qui ab emeticis proprie dictis mulieres praegnantes arceant.

a) HIPPOCRAT. *aphor. 4. sect. IV.* vbi ait: *Purgandum aestate quidem magis superiores ventres, hieme vero inferiores.*

**) Non dissimulauerim tamen in ea constitutione, quam descri-

descripsit LANCISIVS, non modo purgantia bene cessisse, quia tunc non *massa dumtaxat sanguinis*, sed ipsa quoque *hypochondria apud aegros multitudine bilioso-acrium particularum redundabant*; verum etiam emetica, vt ipse testatur sic inquit: *profecit etiam vomitus apud illos, qui vel huius affueri fuerunt egestioni, vel ex crudioris adhuc coenae potestatem laborabant.* L. c. l. 2. cap. V. §. XIII. Verum certiora nocumenta videntur, dubium vero leuamen.

§. CXXXII.

*Auctoritates
reijciuntur.*

Quod attinet ad RIVERII, HELMONTIIQUE experientiam, ea sane non videtur huiusmodi, vt cuilibet tum generi, tum gradui apoplexiae emetica conuenire ostendat. Neque CORNELII CELSI effatum ita extendendum est, vt quotiescunque rationi repugnat, illud reprobare, et refellere non si-

*Emetica in
sanguinea,
et convulsiva
reprobantur.*

*Reijciuntur
quoque in
aliis casibus,
paucissimis
exceptis.*

mus parati. Itaque exulent ab apoplexia sanguinea, praesertim exquisita omnia emetica, vtpote non indicata, et noxia, atque a sanioribus Clinicis, et prae primis a MORGAGNIO ipso explosa. Exulent quoque ab ea apoplexia, quam diximus *convulsivam*, et praesertim in sensibiliore, irritabilioreque nervorum, et fibrarum systemate praeditis; ne spasmus magis, magisque inualescant. Quod si vnquam eis locus aliquis relinquatur, in ea fortasse cum BAGLIVIO, atque HEISTERO dari poterunt, quam nimia ventriculi repletio, intemperantia, et venenata alimenta, aut opium paullo ante sumta aduocant. Quamquam in apoplexia cum ventriculi repletione, vt est ea, quae a pastu corripit, suspecta emetica habeat etiam idem sapientissimus MORGAGNIUS, exemplum afferens hominis hemiplegiaci, qui ab emetico dato in apoplexiam vniuersalem, et cito lethiferam a) praecipitatus fuit; nec nisi imminuta prius sanguinis copia, si excedat, tententur. Saepe etiam accidit, vt a vomitu, aut vomituritione, quae apoplexiam saepe antecedit, aut conco-

*Vomitus
sympathicus
perperam*

conco-

concomitatur, indicationem emetici propinandi demandant medici minus periti; cum tamen ejusmodi vomitus, aut ad vomendum proclivitas, sympathica sit a cerebro male affecto *), non idiopathica, quae distinctionis ratio pernecessaria omnino est. Nam in priore casu ab emeticis omnino abstinere oportet, ut summopere perniciosus.

*reputatur
indicans
emetici.*

a) *Epist. anat. med. III. n. 4.*

*) Huc apprime faciunt binae observationes, quas duas epistolis, altera ad Cl. Archiatror. Caes. Comitum ANTONIVM STÖRCKIVM, altera ad IO. MICHAELEM KENGINIVM R. Prof. Oenipontanum datis perscriptit FELIX PERGERVS Tridentinus, amicus meus singularis, et medendi vsu, et scientia excellentissimus; nam in his et vomitus a cerebri labe pronatus, et emetici in apoplexia nocumenta ostendit.

§. CXXXIII.

Nec intentatum relinqui solet omne reuellentium, atque excitantium genus, ut apoplecticus ad se redeat. Reuellunt praestantissime a cerebro, et capite balnea tepida, in quae pedes demittuntur. Reuellunt itidem, et simul sensum, et motum reuocant membrorum ligaturae, frictiones, epispastica, sinapismi, et vesicantia *). Non nullis placet ferramentis ignitis plantas pedum aduri; aut acubus volas manuum pungi; aut aciculas sub ungui-

*Reuellentia
et excitantia,
et qualia.*

bus adigi; quo tormenti genere excitatos interdum uisse apoplecticos narrant, qui aliter excitari ne uiuerant. Verum vix adduci possum, ut credam hoc cruciatu quidquam boni effectum iri, neque ausum sic proximam apoplexiae remoueri, ubi cetera auxilia eam tollere haud potuere. Quae enim ejusmodi remedia, siue potius tormenti bona effecta ex MISTICHELLIO, CLAUDINO, FORTVN. FELI, atque HENRICO AB HEERS adducit LANCIVS a), vel non sunt ejus generis, quae certam utilitatem commonstrent, vel in soporosis affectibus, falso

*Ferrum
ignitum.*

Quaenam suspecta, quaenam probanda. falso pro apoplexia habitis, praestita fuisse crediderim, vel sine hisce cruciatibus, si Medici patientes expectassent, per alia minus saeva auxilia consecreti fuissent. Ceterum in sanguinea apoplexia vix locum inueniunt ea, quae humores exagitant, aut in mium motum cient; hinc errhina etiam, sternutamenta, et volatilia acria, ita suspecta habentur, nisi inito omnium prudenti examine, atque summa adhibita cautione, in usum vocari non debeant. Si quid naribus admoueri liceat, esto id acetum vini, vel oleum succini, vel ejus sal volatile, vel spiritus melissae, quibus et lingua, et os, et torpentia membra perfricari poterunt. Intrinsecus vero, si fieri potest, ea danda sunt, quae diluunt, quae temperant, et leniter resoluunt, vti serum lactis, decoctum hordei, dilutum florum tiliae cum nitro, atque oxymelle, aliaeque his affinia.

a) L. c. cap. V. §. XII.

*) Adeo abhorret ab omni acriori stimulo, et sanguinem exagitante medicamento in apoplexia sanguinea curanda celeberrimus RISSOTIVS, vt vesicantia ipsa minus tuta appellet, atque vtiliora praedicet post fotus molles cataplasmata ex fermento panis, et semine sinapios applicita reuelliendi scopo. *Epist. var. argument. ad HALLER. p. 65. ed. vener.*

§. CXXXIV.

Alterantia.

Si his aeger reuiuiscat, et simul respiratio, pulsus, calor, colorque pristinus redeat; bono animo esse oportet. Tuncque jura dilutiora porrigantur, quibus incoctae fuerint temperatiores herbae catharticae, vti melissa, et flores primulae veris, libellulorum conuallium, tunicae, tiliae, et aliquid etiam detur eorum, quae paullo valentius attenuant,

Resoluentia mitiora.

vunt, excitant, excretionemque per cutim, et reos prolidere solent, vti succinum, ejusque sal volatile, verum, stibium diaphoreticum non ablutum, nitrum.

biatum, camphora cum nitro, cinnabaris diligenter lota, et super porphyritim laeuigata, aliaque ejus generis.

§. CXXXV.

In serosa apoplexia suis notis (§§. C. CI. CII.) *Cursatio apoplexiae serosae.* agnoscenda, an sanguis mitti debeat, non levis inter medicos disceptatio saepe exoritur, ad quam irimendam cum praeclarissimis Clinicis haec uti so-
 eo distinctione; nimirum si aeger bono adhuc habitu sit, si vasorum plenitudo, et sanguinis rubri *Quando sanguis in ea missi possit, quando nequaquam.* liqua copia simul concurrere videatur, quod ex pul-
 uum magnitudine, victus ratione, et vitae genere n-
 notescat, venam prudenter, et caute secari posse, *MORGAGNIO*, aliisque non improbantibus a), ex-
 istimo; ut una saltem ex causis cerebrum oppri-
 nentibus cito amoveatur. E contrario si apoplexia
 cum malo corporis habitu conjuncta sit, aut ei
 superuenerit vera cachexia, et nulla appareat san-
 guinis, vasorumque plenitudo, phlebotomiam vi-
 andam b) esse; itemque si cerebrum hydrope la-
 oret, in eoque plurimum aquae (§§. L. LI. LII. LIII.)
 inspicari liceat, in vasis autem parum sanguinis ef-
 foeti, ab ea abstinendum esse, quia ab emissio san-
 guine hydrops non modo confirmatur, verum etiam
 saepe arcessitur; potiusque ad corroborantia tam
 externa, quam interna properandum. Nocet quo-
 que venam incidere debilibus, senio confectis, diu-
 ino capitis morbo jam diu vexatis, et prope con-
 iungis, aut ex aquarum medicatarum largiori po-
 tu in apoplexiam prolapsis c).

a) *Epist. anat. med. IV. n. 10.* b) *Ib. n. 15.* c) *Ib.*

§. CXXXVI.

Potius adhibentur cucurbitulae scarificatae, at- *Cucurbitulae, et hirudines satio-*
 ne hirudines, etsi non pari celeritate, et vi mor- *bo res.*

*Purgatio
magis op-
portuna.
De emeti-
cis iterum
iudicium.*

*Emathetica
velius ad-
hibentur.*

bo medeantur. Minus adhuc discriminis, pluri-
adjumenti habet purgatio. Plerique hic emeticis
sine vlla ferme controuersia proponunt, et laudibus
efferunt; quae etsi non ita, vt in sanguinea apo-
plexia, a nobis in serosa reformidentur, non tamen
omni noxa carere ea putantur, vt indiscriminata
praecipitique consilio ingerenda sint. Neque et-
eo, quod vomitus, aut vomendi conatus saepe
antecedat, aut comitetur apoplexiam, erui debet,
hosce naturae motus esse salutes, ideoque ab arte
promouendos: plerumque enim hi ab affecto, vt
supra dictum est, et vellicato cerebro, non a pri-
marum viarum saburra proficiscuntur. Quare prae-
stat cathartici, et quidem ex hydragogorum classe,
illud moliri, quod passim emeticis efficere alii nitun-
tur. Agaricus, jalappa, diagrydium, folia senae,
manna, sal anglicum, cremor tartari, puluis cor-
nacchini, pilulae de succino Cratonis, de tribus cum
rhabbarbo, mercurius dulcis, atque id genus alia
egregiam saepe afferunt opem. Item eodem no-
mine commendantur enemata aciora (quibus vi-
num emeticum adjiciunt non nulli), atque ea om-
nia medicamenta, quae serosos humores per aluum,
aut urinae vias valentius educunt.

§. CXXXVII.

*Irritantes
calida, et
nova feri-
mentaria
laudantur.*

Opportunissima quoque sunt quae irritando do-
lorem inferunt, solidasque partes torpentes per-
ueniunt (§. CXXXIII.), aut nouum sero exuberant
itum parant, vti vlcera cantharidum applicatione
aperta, setacea, fonticuli. Eo etiam respiciunt
latilia calida, acria tam interius, quam exterius ad-
hibita, vti sales volatiles alkalini, spiritus salis am-
moniaci vrinofus, fuliginis, cornu cerui, sanguinis
humani, folliculorum ferici, et similia, quibus super-
bibere possunt diluta calida, aut decocta majoranae, sal-

viae, betonicae, laeundulae, rorisque marini. Cauto tamen opus est, ne nimio, et audaciori calefactionum usu non ephemeram, sed vehementiorem, ardentemque febrem, aut *alcalescentem* humorum dissolutionem conquiramus, unde aeger citius, quam par esset, e medio tollatur. Omnia igitur et temperamento, et corporis habitui, et peculiari sanguinis constitutioni, atque acrimoniae, aetati, sexui, viribus, morbis praecedentibus prudenti manu, maturoque consilio accommodanda sunt.

*Cautione in
eorum usu
opus est.*

§. CXXXVIII.

Nec minori studio indigemus, cum ad curandam apoplexiam conuulsivam (§§. XCV. CIII. CIV. ad CIX.) progredimur. In ea, in qua idiopathice cerebrum afficitur, pro varia causarum ratione nervorum principium irritantium, prementiumque adhibenda plane sunt praesidia, quorum in curatione apoplexiae sanguineae, et serosae meminimus, eisque cautionibus, et praeceptis insistendum est, quae ibidem, alibique saepius inculcauimus. In sympathica vero, detracto, quantum expedire videbitur in temperamentis sanguineis, et cholericis, hominibusque consuetas euacuationes non habentibus, sanguine, generatim vitanda tam intrinsecus, quam extrinsecus ducimus quaecunque acrius irritant, praesertim in exquisita nervorum sensibilitate. Contra balnea pedum tepida, fomenta, atque enemata emollientia, mitiora eccoprotica, siue aluum lenientia, ut oleum amygdalarum dulcium, oliuarum, seminum lini, ricini americani, magnesia alba, flores cassiae, serum lactis, utpote quae laxant spasmos, et sensibilitatem, irritabilitatemque demulcent, humores acres temperant, saburramque lenissime deturbant, pro re nata adhiberi possunt. Nec sua carent utilitate *antispasmodica* temperatiora, in quibus emi-

*Curatio
apoplexiae
conuulsivae.*

nent sal volatile succini, liquor cornu cerui succinatus, tinctura succini, croci, castorei, liquor anodynus mineralis Hoffmanni, flores Zinci à GAVRIO, aliisque neptericis ob vim sedantem, atque antispasticam celebrati, sal sedatium HOMBERGII, aqua florum aurantiorum, nucum viridium cohobata, menthae piperitidis, ceraforum nigrorum, epileptica LANGII, hysterica QVERCETANI, moschus, camphora, atque alia, quae temperamentis, aetati, constitutioni, tempori, et causis sagaciter aptanda sunt. In primis autem inquirere oportet, unde morbus inceperit, eoque curatio omnis dirigenda est.

§. CXXXIX.

*Reliquae
apoplexiae
differentiae
quomodo
curandae.*

Ex triplici hac curandi ratione tribus apoplexiae insignioribus differentiis praescripta facile elicitur, quid auxilii singulis aliis quoque conueniat, quidque praestari expediat in varia earumdem complicatione. Raro enim simplices morbi, quales à Pathologis, Nosologisque delineantur, clinice exercentibus se exhibent, sed plerumque compositi, complicatique vario modo fiunt; quo fit, ut Clinicis acri iudicio, et magna saepe mentis contentione ad diagnosis, curationemque recte instituendam opus sit. In vniuersum causarum ratio habenda est; omnique ope enitendum, ut morbi origo tollatur. Sic apoplexia *Symptomatica*, uti *febrilis, scorbutica, praecordialis, venerea*, aliaeque (§§. LXXXII. XCI. XCIV. XCV.) curationem a morbo primarii, a quo dimanauit, cognitione et medela

*Curatio
symptomati-
carum.*

*Metastati-
cae.*

*Apoplexiae
a causis ex-
ternis vio-
lentis.*

expectare debet. *Metastatica* omne reuulsionum, atque euacuationum genus, in primis diuresis, diaphoresisque exposcit. Quae ab ictu, contusione, vulnere, lapsu originem duxit, chirurgi potissimum ope, ac manu eget. Os depressum terebraleuandum est; fractum vero, vel fissum auferendum,

um, vt cerebrum a preffione liberetur; aut effusis, collectusque sanguis extrahatur. Terebratio etiam locus est, si probabili conjectura suspicari cet, vasa interiora, illaesa quamuis caluaria, disupta fuisse, aut subter abscessum, aut tumorem titare. Sed tunc res chirurgiae prudentissimis, exercitatissimisque tota omnino tradenda est. Iuperuacaneum quoque est, si apoplexiam tophi, *A tophis exostosisque genitae.* xostosesque venereae pepererint, quid tum agendum medico supersit pluribus explanare. Sola nim *hydrargyrosi* salutem promittit, aut quibusdam in casibus saturatissima sarfaeparillae, aut uaiaci decocta.

§. CXL.

Apoplexia demum ex vapore carbonum, et me- *Ex meph- tificis vaporibus.* thiticis halitibus orta postulat, vt continuo ea correptus in aërem liberum, apertum, et frigidum de-eratur; deinde, facie aqua frigida saepius adpersa, nox sanguis abunde ex alterutra jugularium mittatur; clysteres ex aqua cum aceto remixta frigidi abter dentur; naribus volatilia admoueantur; acci aliquid in os, et fauces, sed prudenter, ne in glottidem illabatur, instilletur; idque etiam potui, bi homo reuiuiscit, cum aqua subinde detur, to-umque corpus frictionibus assiduis, diuque conti-uatis excitetur. Vtilissimam hic aëris insufflatio-em in pulmones ope tubuli recurui in alterutram arem immissi, altera digitis compressa, commen-at Cl. PORTALIUS a), et tandem tracheotomiam roponit, vti extremum remedium. Illam autem *insufflandi* aëris rationem praeferendam existimat; od obseruarit, si in os immittatur, aut deprimi glottidem, sicque aëris ingressum in laryngem apediri, aut in oesophagum aërem protrudi. Hic lam, vt perniciofa, rejicit emetica, nec minus met a *tabaci* fumo in intestina per clysterem im-misso.

missio. Putat enim ipse, intestina eo inflata diaphragmatis motui, quem excitare contendimus vehementer obfistere. Sed noxium ex eo etiam ejusmodi auxilium esse supra monuimus, quod narcotica facultate morbum augere, perniciosius accelerare potest.

a) *Hist. de l'Acad. Roy. an. 1775. vid. etiam Giornali di Pisa T. 39.*

§. CXLI.

*Apoplexiae
ab assumtis
quae curatio.*

*Narcosin
corrigentia.*

*Alkali vola-
tile.*

Quod si venena, in primis narcotica fortuito ingestas, aut errore assumpta, aut comesta (§. LXXIV.) apoplexiam exciuerint, protinus vomitu provocato ea expelli debent. Sed nihil praestantius post vomitum censetur ad cujusvis veneni narcosis inducentis correctionem aceto, acidisque vegetabilium fructuum succis. His quoque uti convenit in eo casu, in quo boleti comesti morbum fecerint. In apoplexiis vero, et morte apparenti, quas fermentantium rerum vapor, aut tetra cloacarum mephitis genuit, alkali volatile summopere commendatur ab Academico Parisino LE SAGE, cujus experimenta collegit LE NOIR, atque in lucem edidit, ut ejus praestantissimam facultatem confirmaret. Nec mirum, cum omnia, quae sensibilitatem, irritabilitatemque reuocant, vitalitatem pene extinguunt etiam etiam exfuscitant, non quidem quod alkali volatile, ut ipse sibi persuadet, aciditati exstinctae opponatur, nam acidi etiam vapores, et spiritus idem beneficium praestant, sed quod humulo, atque irritatione vim nerveam, irritabilitatemque cordis torpentem excitet, excutiatque.

§. CXLII.

*Relicta ab
apoplexia
quomodo cu-
rentur.*

Remittente morbo, quod reliquum ejus est, opportunis remediis superare conabimur; et par-

in particularem; quae plerumque remanet, et perlat, caussarum eam fouentium emendatione tollere tentabimus. Quare in attenuantium, resoluentium, atque euacuantium usu diutius oportebit insistere. Huc spectant gummi ferulacea; extracta purgantia, ut panchymagogum CROLLII, aut hellebori nigri; mercurius dulcis; decocta ex lignis sudoriferis sic dictis, guaiaco, junipero, sassafras, visco quercino, lentisco, radicibus sarsaparillae, bardanae, chinae orientalis, rubiae tinctorum; jura viperina *); serum lactis cum cichoreaceis, cephalicis, aut antiscorbuticis plantis incoctis; aquae thermales praesertim balnei, et stillicidii forma adhibitae; earum luta medicata; linimenta neruina, penetrantia, volatilia, (inter quae oleum formicarum non incelebre est) mercurius **), electrici machinamenti concelebrata virtus a), prudenter, et caute tentanda ***), exercitatio, vectio, aëris mutatio. Non pridem opera Cl. COLLINI inclaruerunt quam maxime flores *arnicae montanae Linnæi*, quibus mira inesse vis resoluens, et excitans aduersus paralyin b) perhibetur. Non praetermittam hic animadvertere quod passim Clinici crebro videre solent, pedes, et crura in hemiplegiacis, et resolutis citius, et facilius motum recuperare, quam brachia, et manus, quamquam cerebro et cordi propiora. Laussum HIPPOCRATES c) in venarum rectitudine si a confingit. Verum verosimilius est, eos nervos citius restitui, qui ab ea spinalis medullae parte produnt, quae longius distat ab sede causae morbi, uti sunt, ni fallor, *crurales*.

*) Dum varia medicamentorum genera singillatim hic accenseo, nolim quis credat, altera alteris succedanea haec esse, atque indiscriminatim, et sine delectu vsurpanda. Ista ex materia medicamentaria eorum naturas, et facultates jam puto, nec lectorem ignarum legum, praecetorum, et cautionum, quas ex therapeutica generali didici-

dicit ad recte, apte, et salubriter iis vtendum. Sic, cum
 viperarum jura commemoro, non ea cuicumque paraly
 ex qualicunque causa natae idoneum remedium praedico
 sed postulo, vt habito causarum examine, considerata
 aegrotantis constitutione, atque indicantium praestantia
 decernatur, vtrum indicationibus adimplendis valere possint.
 Quod de viperarum juribus dixi, id ipsum de quocumque
 vis alio medicamine dictum velim. Sed quaenam viperarum
 medicatae vires insint, quosnam effectus edant in corpore
 humano, non conuenit inter auctores. Alii enim eas vt
 latili sale scatere, ac proinde sanguinem exagitare, calorem
 facere, vim vitae incitare, motum augere, humores attenuare,
 atque ad alkalescendum disponere opinantur, dum alii haec omnia negantes,
 nihil ex viperis volatilis, atque principii elici, sed multum mucaginis viscidae, et glutinis
 animalis; ideoque fatua, mucosa, atque inertia iis jura confieri,
 anguillarum omnino juri aequalia. Quam obrem priores illi remedium istud
 ob excitantem, calefacientemque facultatem inter valentiora referunt, sibi
 non parum ab ejus vsu, et volatilitate metuunt: contra hi
 posteriores illos acriter derident, vantum, inutile, et superuacaneum
 id auxilii genus reputantes, ita vt dignum omnino censeat, quod a
 Medicis penitus despiciatur. Interea tamen non apud omnes nationes,
 in primis italis, apud quas magno ab antiquissimis vsque temporibus in
 pretio fuit, de praeconcepta bonitatis opinione deijci nequam
 potuit, felici procul dubio Clinicorum probatum vso, ac periclitatione.
 Adde, Cl. BECCARI periculis omnigenis (*Instit. Scient. Bonon. Comm. T. 2. P. 1. p. 95.*) con
 pertum esse, nihil viperis inesse siue volatilis salis, siue
 alius principii calefacientis, quod earum vsum suspectum
 faciat, sed succum quemdam mitissimum, gelatinosum, tenuis
 simum, valde alibilem, fibras rigidas mollientem, motum
 et calore corporis nostri attenuari aptum, atque hinc omnia
 vel minima vasa pervadentem, serum viscidum, lentamque
 lympham leniter, et sine stimulo dissoluentem, obstrueta
 referantem, excretionem omnes, et praecipue cutaneam
 expirationem promouentem; quo fit, vt corpora gracilia,
 et macilenta plenitudinem, jucundiorem spem, et colorem,
 virium robur, majorem agilitatem acquirant, atque a prauis,
 falsis, acribus recrementis cutis spiracula, atque vrinae
 vias se se repurgent. Quam ob rem ergo et paralyticis
 profint? Concedit porro idem vir

spicacissimus, juribus viperinis interdum moueri febrem, calorem, et sitim augeri, vigilias induci; sed haec omnia non medicamento insitis proprietatibus, verum peculiari solidarum partium aut rigiditati, aut sensibilitati exquisitiori, aut fluidarum acrimoniae, quae cum gelatinoso viperarum liquore commixta, et in penitiora loca, sensibilia, atque mobilia perlata omnes illas turbas excitet, tantummodo deberi. At demus vim esse viperis mouentem, excitantem, soluentem, calefacientemque. Nonne hoc nomine in paralyfi cum motuum vitalium languore, partium laxitate, atque inertia, cachectico prope habitu, aut corpore humoribus exhausto, lymphæ, quæ nervos alluit, frigida, lenta, viscida conjuncta multum emolumenti ab earum usu expectari liceat? TISSOTIVS ipse, qui ita se aduersum huic remedio ostendit, vt *ablegandum sine damno et medicina* putet, *prodesse tamen* posse vltro fatetur (*Epist. var. argum. p. 105. 106.*) *in morbis a defectu bonorum humorum, et ubi mucosus, vapidus, et acefcens sanguis vasa decurrit.*

**) WALDSCHMIDIUS, vt habet ALLENIUS in *Synopsi* §. 347., in curatione paralyseos tam internum, quam externum mercurii vsum proposuit. Hunc ipsum commendauit BARBETTA, hac tamen conditione, vt ptyalissimum excitaret, quod apoplexiam curari posse pollicetur (*De apoplex. cap. 2. not. c. p. 31.*). Tanti vero id remedii genus fiebat a XAVERIO BERTINIO (*Dell' uso dell' mercur.*), vt non modo ad curandam apoplexiam, et paralyfin, verum etiam ad praecauendam vteretur. Nec ab eo dissentit ejus olim discipulus, nunc percelebris Clinicus Cremonensis, MARTINVS GHISIUS, cum eodem duplici fine pilulas catharticas mercuriales, quibus ipse vti consuevit, adhibendas praecipiat, prudentior tamen aliis, quod earum laudes ad apoplexiam, et paralyfin duntaxat serosam, pituitosamque perstringat; contra ac ROTARIUS ille mercurij immodicus laudator, qui eum in quauis apoplexia, et paralyfi proponere non dubitauit.

a) *Comment. de reb. in scient. naturali et medicin. gest. Vol. II. pag. 636. 637. Vol. III. pag. 467. Vol. IV. pag. 69. et pag. 299. Vol. VI. part. 2. p. 316. atque alibi, etsi NOLLETTIVS non multum consentiat.*

)) Effecta electricitatis in corpore humano a Cl. TISSOTIO obseruata, sunt haec: 1. pulsus citior; 2. calor auctus; et plethora; 3. exspiratio major, interdum alui

laxitas, urinae copia; 4. haemorrhagiae variae, in primis narium; 5. dolor partis affectae, cutis laesio, inuita musculi contractio; 6. concussio convulsiva, capitis subsequens debilitas; vertigo, somnus anxius, turbatus; 7. lassitudo; 8. pectoris anxietas; 9. interdum paralytis vniuersalis, et mors; 10. Fulguris instar etiam necat; 11. vasa cerebri turgida, dilatata in cadaueribus reperta; 12. Eadem et grauiora in animalibus electricitate enecatis cum sanguinis effusione, in cerebro, et pectore. *Epist. var. argum. p. 107. 108. et seqq.* Hinc Cl. vir quaerit, quinam erit in paralyti electricitatis vsus? Responder sibi ipse: Profuit in paralyti deauratorum. Proderit in paralyti ex colica saturnina; nam in vtroque casu abest febris, plethora, cerebri vitia; quae conditiones ei videntur necessariae recto, vtilique ejus vsui. *Ib. p. 109.* Verum scire oportet variari electricitatis medicae effecta pro varia ratione, qua ipsa adhibetur. Triplici autem ratione adhiberi potest, nimirum vel omnino simplex, vel cum scintillarum extractione, vel cum explosione phialae leydenensis. Plerumque primo, alteroue modo eam adhibere soleo, contentus onerare, quod ajunt, electricitate aegrotantem, idque diutissime facere. Rarissime tertio modo vtor, et tunc summa quidem prudentia, et cautione. **PIVATVS, VERRATTIVS**, alique Itali non absimili ratione utebantur, nec quidquam noxae, saltem grauioris, vnquam experti inde sunt. Cl. quoque **BECCARIVS** sententiam hac super re rogatus suadebat (*Consult. medic. T. I. consult. 63. p. 161.*) leniorem methodum. Hanc ipsissimam methodum, quae Italicorum propria dici potest, magna cum voluptate, et laetitia video nuperrime ceteris praeferrere ab homine Gallo, et Medico nobili **MAVDVITO** in Epistola sanae doctrinae, et medicae prudentiae plenissima, quae reperitur in Diario Medico Parisiensi *T. 49. Mens. Iun. p. 509. et seqq.*

b) Vid. **IOSEPH. COLLIN. P. IV. obseruat. morb. acut. et chronic. etc.** c) *Lib. de circa morb. virgin. n. 2.*

§. CXLIII.

*Paralytes
particulares
qua ratione
curentur.*

Paralytin palpebrarum oculi quauis nocte reuertentem stillicidio ex aqua Ballerucana ad ceruicem, et occiput adhibito curatam referunt *Transfectionis philosophicae a*). Apud nos thermae Aponitanæ, Lucenses, Pisanae, Cassianenses, Viterbieneses, Aquisgranenses, aliaeque ad id commendantur. Ad paralytin lin-

linguae reliquis omnibus anteponit **LANGEVs b)** oleum cinnamomi stillatitium, ejusque aliquot guttas saccharo exceptas linguae imponendas jubet. Eundem in finem **M. ANT. LAVRENTIVS** apud **Bononienses** Medicus praestantissimus, meusque in clinica exercenda dux, atque antecessor, qui Archiatri munere **BENED. XIV. P. M.** functus est, spiritu ceraforum nigrorum linguam perfricandam curabat. Sanguine etiam e raninis venis educto saepe loquendi potentiam rediisse, complures alii testantur *). Flagris item, vrticisque contumaciori paralyfi correptae partes vtiliter verberantur, aut vaporis spiritus vini flagrantis, quo sudor, in obesis praesertim, auocetur, non sine emolumento c) obijciuntur. Laudibus etiam non leuibus celebrantur vinacea recentia, in quae membra paralytica demergi solent, et quasi balneo foueri. Calore enim fermentantis musti, et vapore acri exhalante vasa omnia, fibraeque omnes leniter exstimulantur. Horum opem, etsi crebro irritam dicat **TISSOTVS**, remedio interdum fuisse, experientia victus d) fateri cogitur. Crura, et pedes saepe in scorbuticis *paressi*, siue peculiari, imperfectaeque paralyfi subijciuntur; vt praeteream eam, quae ex casu, ictu, vulnere, luxatione vertebrarum oritur. In illa omnis curatio ab antiscorbuticis praesidiis, vt quisque facile nouit, petenda est. Sic artuum inferiorum paralyfis, quae venereis morbis succedit, quaeque non infrequens est, cum morbo principe, cujus symptoma tunc certe videtur, oppugnari debet. Non semel mihi hujusmodi paralyfis curanda obtigit, et lenibus inunctionibus mercurialibus, decoctisque sudoriferis eam sustuli. Litu mercuriali quoque vesicae, ani, et crurum resolutionem, cui virus venereum causam dederat, fugavit **Cl. HOVSTETVS e)**. Quin imo exstant historiae curatarum ope mercurii paralyfium,

vbi nulla erat luis venereae suspicio, inter quae notatu dignissima videtur illa, quam Cl. CAVALLIVS paucis ante annis euulgavit f).

a) N. 449. §. 4. b) *Miscell. veritat. Fascic. I. §. 8.*

c) Inter eos est LANCISIVS, qui (*De morib. subit. observ. I.*) de hemiplegiaco, cum aphonus persisteret, scribit: aphoniam; quam sane cum injecti clysteres, exhibiti sales volatiles, admoaque femoribus, brachiis, et nuchae significancia tollere nequirent, profecto mirabiliter, quod repente acciderit, una soluere potuit missio sanguinis ex sublingualibus venis.

c) BARBEIRAC. *Formul. medicam. p. 362.* d) *Epist. var. argum. p. 104.* e) *Mémoir. de l'Academ. Roy. de chirurg. T. 4 p. 141.* f) *Storia d'una reumatica paralisi curata coll' unzione mercuriale. Venez. 1769.*

§. CXLVI.

Nec silentio praeteriri licet duos paralyticos, qui ex noxiis argenti viui halitibus in morbum incidisse videbantur, auro fulminante a) perfanatos narrari. Spuriae demum paralyfi (§§. XCII. XCIII.) non melius mederi possumus, quam pro causarum diversitate delectis, adhibitisque medicamentis. Hinc deobstruentia, antiscorbutica, resoluentia, purificantia, antiseptica, volatilia, instaurantia, nutritia, roborantia, cardiaca, et similia iis, quae (§§. CXXXVII. CXLII. CXLIII.) jam exposita sunt, locum habebunt; dummodo Pathologiae, et Therapeuticae generalis notionibus, dogmatibusque opportune accommodentur.

a) *Gazzett. Medic. di Venez. n. II. ann. 1763. di P. OTTESCHI.*

§. CXLV.

*Contracturae
et rigiditas
membrorum
quid postu-
lent?*

Saepe, post deiectam paralyfin, digiti manuum, aliaeque partes, ut alibi (§. XCII.) dictum est, extendi non possunt, quod ligamenta articularum, musculique flexores tamdiu non elongati, et breuiores facti obriguerint ita, ut extensorum vis illorum contra-

contractionem nequeat superare. Tunc mitissimis, emollientissimisque remediis opus est. In primis vero, vt hujusmodi contractae, rigentesque partes molliantur, elongenturque, immitti in ventrem animalium recens mactatorum debent, ibique, quamdiu eorum calor permanet, detineri, et morari; postea linimentis mitissimis ex adipe, et ossium medulla perungi, atque assidue foueri, et perfricari. Nihil enim efficacius penetrat, et relaxat quam vapor aqueus animalis, atque olea subtilissima, quae in ossium cauis colliguntur. Post haec vapor aquae calentis primas tenet, a quo saepe mira in laxandis, molliendisque fibris praestantur.

§. CXLVI.

Soporosis affectibus (§§. CXI. ad CXV.) vbi medicina facienda fit, non aliam ferme viam insistere oportet, quam quae ad curandam ipsam apoplexiam praemonstrata est (§§. CXXIII. ad CXLIII.), cum hi sane eisdem ex causis (§§. LXXV. LXXVI. LXXVII. LXXVIII. usque ad LXXXV.), quae apoplexiam gignunt, propemodum oriantur. Illinc igitur omnis eorum curatio petenda est.

Curatio soporosis affectuum.

§. CXLVII.

Tandem summopere interest, quaenam victus, regiminisque ratio apoplecticis conuenientior sit. In vigore morbi praestat quam maxime tenuissimo vti victu, deinde aliquid indulgere, sic tamen, vt omnia viscida, glutinosa, acria, et calefacientia euitentur; cauere item a cunctis, quae sanguinis copiam augent, aut efferuescere cogunt, aut eum ad caput nimium propellunt. Hinc summa animi et corporis quies imperanda; cubiculi calor sic temperandus, vt ad frigidum potius inclinet, aërisque procuranda frequens renouatio. Quoniam vero

Diaeta.

morbus

morbis recidiuus facile est, ad eum anteuertendam oportet hominem, qui eo laborauit, sibi cauere a frigore repentino, a sole meridiano, a nubilo coelo, ab ira, ab igne, ab aestu; circa solstitia, atque aequinoctia sanguinis copiam, si abundet, vena secta minuere; vesci quoque vegetabilibus, rebusque acescentibus, aquam potare; coenam omittere, aut parcissima vti, somnum praesertim a pastu vitare, purgari subinde; bis vel ter in hebdomade cremoris tartari drachmam vnam, vel alteram fumere, et causas omnes, ex quibus in apoplexiam implicatus est, diligentissime effugere u).

a) *Tiss. epist. var. arg. p. 73. 74. 75. et seqq.*

C A P V T V.

DE CATALEPSI, ECSTASI, ET SOMNAMBVLISMO.

§. CXLVIII.

Magnam affinitatem cum soporosis affectibus *) habet morbus rarissimus, et, si quis alius, longe admirabilis, quem *κατάληψις* *), et *καταχήν* **) Graeci nominant. Is latine verti posset *interceptio*, *comprehensio*, *detentio*, *occupatio*; nam qui eo comprehenduntur, continuo sensibus interioribus, atque exterioribus, praesertim tactu, et motu voluntati subiecto priuantur. Non tamen hi concidunt, vti in apoplexia, aut syncope, sed in eo statu, et positu consistunt, in quo erant, cum eos morbus inuasit; et mirifice se habent ad quasuis inflexiones recipiendas, seruandasque paratissimos. Hos GALENVS a) *κατόχους*; CORNELIVS VERO CELSVS, VT MORGAGNIO, et SWIETENIO b) videtur, *attornitos* c) vocat; additque, nisi codex ibi mendosus sit, morbum a Graecis etiam *apoplexiam* dici d). Synonyma

* *Catalepsia.*

** *Catachēn.*

Quid catalepsis?

onyma reliqua, quae a veteribus usurpata sunt, videri possunt apud COELIVM AVRELIANVM, qui diligentissime, vt assolet, de *catalepsi* e) retulit. Praecipua tamen sunt haec: *aphonia* DIOCLIS, atque HIPPOCRATIS; *anautia* ANTIGENIS CLEOPHANTINI; *lethargia*, et *sopor aliorum*; *congelatio* ARABVM; *stupor cum rigiditate* PLATERI **).

*) LIEVTAVDIVS hanc affectionem adnumerat morbis conuulsivis. *Précis de Médec. malad. intern. de la Tête* l. I, p. 212. Sed nullus rigor, nullus spasmus, nulla neruorum distentio, siue conuulsio cernitur in vera, et simplici catalepsi. Alii mixtum affectum putant esse ex soporoso, et conuulsivo. Nos vero perpenſa *insensibilitate*, atque *immobilitate*, quae in ea spectantur, cum VOGELIO ad morbos *adynamicos* referendam censemus.

a) Ex GALEN. de *causs. puls.* P. IV. cap. 16. CASTELLIUS. b) MORGAGN. *Epist. anat. med.* II. n. 2. SWIETEN. *Comm. in Boerhaav.* Vol III. §. 1007. c) L. III. cap. 26. d) L. c. e) *Acut. morb.* l. II. cap. 10. II. 12. et *Tard. Passio.* l. II. c. 5.

**) CL. TISSOTIVS catalepsin COELII AVRELIANI a nostra differre omnino asserit. *Traité des Nerfs, et de leurs maladies.* T. 3. P. 2. chap. XXI. Reuera *catalepsis*, siue *catache* COELII AVRELIANI ad ecstasin potius, aut ad catalepsin spuriam, de qua paullo post dicam, pertinere videtur.

§. CXLIX.

Sed illud praecipue in huiusmodi affectione peculiare, propriumque est, quod qui in eam incidunt, si stabant, eodem omnino loco consistant; si sedebant, sedeant; oculis sint apertis, si apertos habebant; incedentis speciem referant, qui in incelsu correpti sunt, et membra eo positu teneant, quo quis collocauerit; non tamen sentiant, nec loquantur, nec moueantur, nisi vi quadam impulsu. Haec autem (§§. CXLVIII. CXLIX.) est *verae et legitimae*, siue *perfectae cataleptoseos* imago *), qualis a Medicis hodie ferme vniuersim delineatur. Nam, vtrum a veteribus isto nomine vna, eademque affectio semper

*Quid proprium, et peculiare catalepti-
corum?*

*Cataleptis
vera, et
perfecta.*

semper intellecta, atque indicata sit, an alia atque alia a), jure et merito dubitatur. Admodum veri etiam simile est, nisi certum plane, exploratumque malueris, non omnes morbos, quibus id nominis a nuperis obseruatoribus inditum fuit; vèrè, atque adamussim ad catalepsin perfectam respondisse b). Quod facile patebit cuicunque, si vel leuiter in obseruationum compilationem aliquam oculos tantum conjecerit.

*) Catalepsis a SAVVAGESIO sic definitur: *subita sensuum, motuumque muscularium suspensio, superfuse pulsu, et respirazione plerumque obscurissimis, et mira ad quosvis sensus retinendos, et suscipiendos artuum flexilitate. Nosolog. d. VI. ord. V. G. XXV.* Nec valde absimilis est HOMII definitio catalepteos, quam adesse scribit, *quando fixus remanet aeger in eodem statu, in quo prehensus fuit, sensibus internis, et externis abolitis. Princip. Medicin. de morb. non febrilib. P. 2. sect. 7.*

a) Vid. *Journal Britannique M. de Juin. 1751*, aut *Comment. de reb. in scient. nat. et medic. gest. LUDWIGII Vol. I. P. III. p. 114. et seqq.*, vbi ostenditur Catalepsin COMII AVRELIANI ad varias alias affectiones extendi. b) *Vogel. in not. ad §. 572. De morb. cognosc. et curand. cap. de catalepsi p. 473.*, vbi non pauci falso pro catalepticis ab auctoribus habiti memorantur, quibus multo plures addi possem, si locus ferret. TISSOTIO eandem nobiscum videri esse sententiam l. c.

§. CL.

Quae cataleptis spuria, et imperfecta.

Cum vero non omnia illa (§§. CXLVIII. CXLIX.), neque semper, neque eodem gradu in omnibus eueniant; necesse fuit aliam catalepteos speciem constitui, quae *imperfecta*, et *spuria* nominatur. Alii enim cataleptici sentiunt, sed muti omnino sunt, et motu, qui voluntatis imperio obediat, nequaquam gaudent. Aliis aliquis sensus, et memoria aliqua illorum, quae acta fuere, remanet; vel membra inflexa non retinent, saltem firmiter, et constanter, figuram, et locum, sed sensim, et gradatim,

latim, in pristinum relabuntur a). Alii manum, ut membrum aliquod mouent quidem, sed reliquo corpore veluti rigent, non tamen ita, vt in Tetano. Alii demum, tametsi nec audiant, nec ideant, nec puncti sentiant, mortuis similes, si ad tamen in eorum os ingeratur, cito deglutiunt. Quocunque horum modo, aut simili cataleptici sunt, *imperfecta*, et *spuria catalepsi* laborare dicuntur.

a) VOGEL. l. c. §. 569.

§. CLI.

Vtraque vero (§§ CXLIX. CL.), nempe tam *vera*, *Vera*, et quam *spuria*, vel solitaria, et sine vlla implicatione *spuria*. aegros infestat, vel cum aliis morbis, vti *hysteria*, *furor*, *melancholia*, *somnambulismo*, *epilepsia* etc. *Simplex*, et implicatur, vel in eisdem facile transit. Hinc alia *complicata*. profuit distinctio, in *simplicem* nimirum, et *complicatam*. Quandoque etiam obseruata fuisse dicitur, t symptoma febrium acutarum, aut intermittentium, praesertim tertianae, et quartanae, et tunc, t manifesto patet, *symptomaticae*, aut *secundariae* *Symptomatica, et secundaria*. nomen accipit. A causis porro deductae differentiae a nobis omittuntur, ne in diuisionibus, subdiuisionibusque minime necessariis nimii propemolum simus.

§. CLII.

Raro accessionem quaedam notae praenuntiant. *Signa re-* interdum antecedit mentis, et corporis torpor qui- *liqua*. *am*, vel cephalalgia; in aliis obtusus in posteriore apitis parte dolor a), in aliis colli rigor b). Subi- deinde inuadit malum, sensu, et motu, vt supra positum est, hominem priuans. Post aliquot temporis minuta, raro post horas, rarissime maiori interuallo aegri veluti e somno excitantur, suspiria emittunt, atque ad sua munia redeunt, omnium, quae

*Catalepsis
periodica.*

quae acciderunt; aut gesta sunt, plane inscii, aut immemores. Eadem calamitas per intervalla, et quandoque ad longissimum tempus reuertitur, in certam saepe periodum tenet, vt tunc *catalepsis periodica* dici debeat. Singulare quoque, notatum dignum maxime est, faciem naturali colore, et lumine nitere; pulsum saepius magnam, et rariorem quam paruum, atque exilem esse, contra ac *SARVAGESIUS* docuit *d*); respirationem plerumque leuissimam, obscurissimamque; oculos fixo obtutu apertos, atque immobiles; omnemque febrem a *simplici* et *primaria* abesse.

a) *FOREST. l. X. obs. 42.* b) *HENR. AB HEDIS obs. serv. 3.* c) *HAEN. Ras. medend. P. IV. Cap. V. § III. p. 185.* d) *Nosolog. l. c.*

§. CLIII.

*Causa proxima
quae-
nam?*

Causa huiusce morbi proxima ignota esse adhuc dum videtur. Cerebrum, et nervi peculiari quodam modo afficiuntur, sed in quo haec affectio contineatur, nemo hactenus recte, quod sciam, definiuit. Vis aliqua neruorum in musculos sane exercetur, quoniam corpus sustinetur, nec resoluitur, vt in paralyfi, aut apoplexia. Sed nullus ab externis organis ad *sensorium commune* patet aditus; aut patet, a mente non percipitur objectorum impressio, siue *sensatio*, quam vocant. Vbinam ergo nervorum *sensibilitas*? Neque *sensorium commune* animae potest quidquam repraesentare, aut obicere; et anima quidquam cogitare, velle, aut jubere; incepta nimirum inter animam, et cerebrum naturali communicatione. Nulla igitur musculorum *paralyfis est*, inquit *CL. HAENIUS a)*, sed etiam *inermotus*. Quid ergo est? Est continuatio ejus, ultimo sanitatis momento ad motum bonum requisierat: id nempe in ea, quae olim mouebatur, se

net parte. Imo si adstantium quis situm hunc permutauerit, et in alium direxerit, ut jam cogat alios prorsus musculos, ut agent, est fere idem, ac si sensorium commune nouis his musculis nouas vires largiretur, ad hunc situm, idque pertinacissime, conseruandum. Porro quod in corpore obseruamus, idem de mente cogitemus. Quoties enim obseruatum non est, ideam ultimam verbis expressam, ante paroxysmum, ita eandem manere, ita esse immutabilem, ut denuo prima sit, quam homo habeat, verbisque emuntiet, catalepsi, quantumuis diuturna *), soluta?

a) L. c. p. 189.

*) Id pluries vidi etiam in violentissimis, quod magis mirum est, hysterismis; sed praecipue in puella nubili, quae singulis fere mensibus in hysterismum vehementissimum incidebat. In eo sibi mutuo succedebant risus, cantus, et clonicae vniuersales cuiusque generis conuulsiones, et spasmi. Saepe inter loquendum, aut cantandum repentinis clonicis motibus cum sensuum abolitione corripiebatur. Postquam totum corpus aliquamdiu, atque interdum ad horae dimidiae spatium conuulsus fuerat, et quandoque perniciosissime in vtramque partem caput circum actum esset; repente sedatis omnibus motibus, iterum loquacitas, aut cantus in scenam redibat, a verbis sermonis, aut cantilenae ultimo abruptis incipiens, et de more adamussim ordinem rerum, aut cantiunculae prosequens, atque absolvens: phaegomenon sane post adeo magnas turbas, et agitationes vix credibile, nedum explicabile.

§. CLIV.

Ex his vero quid, amabo, luminis ad causam proximam decernendam? Parum profecto, respondet item ipse HARNIVS, vltro, libenterque inquietus: *Latent miri animi nostri cum corpore commercii leges. Ignoramus prorsus eas, quarum ope commercium hoc peragatur, partes; ignoramus qua se lege et tangant, et moueant, et iterum fistant a).* At Requidquam rei difficultate deterritus DELATOV-
Vol. III. P. I. I RIVS,

*Delatourii
opinio.*

RIVS b), dum veterum sententiam de intemperie frigida, et congelante deridet, in aliam ipse descendit, quae ab illa si non proficisci, certe non valde abesse videtur. Ex arteriarum, venarumque repletionem, quae **BOERHAAVIO** referente inuenta fuit in cerebro catalepsi defunctorum, non dubitat causam ejus esse nimiam sanguinis, et liquoris nervi copiam, ex qua praecipua morbi symptomata intelligi, explicarique posse sibi persuadet. Ita enim turgere omnes nervos inde putat, ut ob plethorae quamdam speciem torpeant, et nullam actionem edere queant; contra, quam accidit in paralyti, quae defectum ejus liquoris potius ponit, aut in convulsione, quae majorem, aut inaequalem istiusmodi humoris motum, et distributionem pro causa videtur habere. Ab hujusmodi igitur nervorum ob plethoram inertia, nervaeque succi tarditate, et lentore consequente sibi blanditur, facile explicari posse aequilibrium, et veluti rigorem totius corporis, anaesthesiam, siue perfectam insensibilitatem, et promptam ad quamcumque positionem, aut inflexionem recipiendam, tenendamque habilitatem.

a) L. c. p. 191. b) *Récueil periodique d'Observat. de Méd. par M. VANDERMONDE T. V. pag. 45. et seqq.*

§. CLV.

*Quae Delatourii opinionioni ad-
versentur.*

Ne vero propere nimis **DELATOURII** sententiam amplectamur, probemusque, faciunt aliae anatomicae catalepticorum sectiones, in quibus praeter sanguinem, serum etiam effusum, et posteriori cerebri magis occupans, vel aquosa dumtaxat coluies, vel serum subrubrum in postica cerebri parte collectum, et polyposae concretiones in sinu longitudinali, et pulmones simul, heparque corruptum reperta fuerunt a). Denique obstat prudens, et cauta dubitatio, num vasorum illa plenitudo causa

caussa catalepticos, an vero effectus habenda sit. Obstat celerrimus interdum post breuissimam accessionem catalepticorum ad se reditus, et vicissim facilis, et repentinus ex sola animi subita vehementiori commotione in catalepsin relapsus; cum mente concipi vix possit, tantam vasorum omnium cerebri, et neruorum plethoram intra breuissimum tempus tolli, et iterum reuerti ictu ferme oculi, quod ajunt, per animi pathema solum. Obstant demum causae procatarecticae, quae catalepsin quandoque inducunt, vti vermes, terror, tristis nuntius, nec sanguinis nec aliorum humorum copiam, aut excessum commonstrantes. Praeterea, si sanguinis, et succi neruei copia morbum faceret, cur phlebotomiis, abstinencia, aliisque euacuantibus ipse cito non soluitur, arceturue; dum contra obseruationibus constat, illa omnia vt plurimum irrita, ni noxia, fuisse? Cur, si neruea quaedam facultas in musculis superest, haec ipsa sensationibus, atque ideis tum formandis, tum percipiendis non aequae subseruit?

a) LIEVTAUD. l. c. SCHENCK. *observ. med.* l. I. de *Catocho* obs. 2. HOLLER. *de morb. intern.* l. I. cap. 9. in *schol.*

§. CLVI.

Fortasse proximius vero accessit FR. HOMIUS, *Homii con-*
dum fluxum *liquidi neruosi in non nullos neruos, et iectura pre-*
quietem *in omnibus aliis* ponit pro causa proxima
huiusce morbi; siue, vt ego interpretor, secum re-
putat, actionem aliquam in neruis, qui musculis
voluntario motui addictis inferuntur, vti sunt ple-
rique e spinali medulla prodeuntes, permanere;
conquiescere vero, et quasi consopiri *sensorium com-*
mune, eosque fortasse neruos, qui sensuum ministe-
rio famulantur, vt fere sunt illi, qui a cerebro, aut
ab intercostali pari, siue sympathico magno deri-
vantur.

vantur. Sed quis vnquam demonstrauit, neruos, qui ad musculos spectant voluntarios, sensibus quoque non inferuire posse? Verum esto, vt *homo* sibi confingit; qui tamen illud ipsum fiat, superest indagandum, nec satis adhuc liquet.

a) *Princip. Med. P. 2. De morb. non febrilib. sect. VII.*

§. CLVII.

Causae remotae.

Nec feliciores in constituenda caussa proxima catalepseos fuisse videntur nuperrime scriptores, qui ad eam perscrutandam toto pectore incubuerunt. Hac igitur praetermissa, de causis remotis, et manifestis satius erit verba facere. Hae autem, prout ex accuratioribus obseruationibus comperimus, rediguntur ad diutinas animi curas, mentisque contentiones; profundas meditationes; moerorem grauem; terrorem; nuncium tristem, et repentinum; amorem inauditum; frigus susceptum; euacuationes mensium, haemorrhoidum, aliarumque excretionum suppressas; hysteriam; hypochondriacum; diathesin sanguinis crassam, et glutinosam; temperiem melancholicam, mucosam, et flaccidam; scabiem retropulsam; primarum viarum cacochyliam; vermes; fumum carbonum; vini abusum; ebrietatem; iram; somnambulismum; febres quartanas; reliquasque intermittentes diuturniores, quarum interdum symptoma est catalepsis; fulminis ictum, vt ex *CORN. CELSO* habemus; serum intra caluariam effusum, aut sanguinem in cerebri vasis, praesertim posterioribus, crassum, nigrum, stagnantem, (§. CLIV.) congestumque.

D i a g n o s i s.

§. CLVIII.

Quid Esset?

Diagnosis ex §§. CXLVIII. CXLIX. CL. peti debet. Neque arduum hinc erit cognoscere, quibus signis

signis a reliquis similibus affectibus catalepsis discernatur. Ceterum cum catalepsi una, eademque a non nullis habetur *ἔκστασις* *), ab aliis vero non * *Ecstasis*. item. In his SAVVAGESIUS *ecstasim* differre a catalepsi docet, *quod artus non retineant situm quemvis ab adstantibus impressum, sed aeger eum, quam ab initio insultus habuit, posituram constanter seruet, et omni sensu, motuque artuum orbetur a*). Quid vero? Nonne sic definita *ecstasis* eam catalepticos differentiam, quam *spuriam*, aut *imperfectam* (§. CL.) vocant, nobis ob oculos sistit? At VOGELIUS *ecstaticos* fieri tum opinatur, cum catalepsi correpti *mira phantasmata, visiones diuinas, consortium Angelorum* sibi habere videntur, aut *linguas, quas non didicerunt, loquuntur, si fabula vera, quin et futura praenuntiare* b) dicuntur. Verum non inde sequitur, eos a catalepticis sic discrepare, ut ad *spurios*, atque *imperfectos* (§. CL.) non pertineant et ipsi. *Ecstasis catochus*, siue cataleptis HENRICI AB HEERS, et TVLPII, *ecstasis cataleptica*, *ecstasis resoluta* a SAVVAGESIO descriptae c) videntur esse varietates *Ecstasis pertinent ad Catalepsin spuriam*. *catalepticos spuriae, aut imperfectae, aut ad summum implicatae, et implexae*. Atque idcirco nulla egent peculiari expositione.

- a) Noslog. Cl. VI. ord. V. Gen. 24. b) L. c. §. 569.
c) L. c. gen. 25.

§. CLIX.

Aequiori jure cum a catalepsi differat *somnambulismus*, seorsum a nobis exponendus ipse est. In hoc uti in profundissimo somno sensationes omnes deficere videntur, excepto fortasse tactu, quo *somnambuli* objecta obstacula euitare possunt. At imaginatio viuidissima est, et motus voluntatis imperio a) subditi facile, ordinateque exercentur: quamquam non desint etiam exempla eorum, qui in *somnambulismo* *somnambulismi descriptio*.

nambulismo non vident certe, sed audiunt, respondent, aliaque praestant de more, ac si vigilarent; quin imo historiae exstant quorundam somnambulatorum, qui non solum respondent, et loquuntur, verum etiam disceptant, legunt, scribunt, et chartis lusoriis cum aliis facili, et apta ratione se se oblectant. Quod vix fieri potest sine aliqua saltem visionis vsura; nisi dixeris in huiusmodi casibus aliquam fraudem, aut malitiam subesse. Nullus enim morbus frequentius a sycophantis confingitur, quam somnambulismus, ecstasis, et catalepsis, vti multi admonent, atque ego ipse non semel apprehendi, et cognoui. Ceterum affines admodum huiusmodi affectiones crediderim, quia catalepsis, ecstasis, et somnambulismus mutatis vicibus sibi mutuo succedunt, aut vna saepe copulantur. Imo scire oportet, interdum eos cum epilepsia, conuulsionibus, delirio, aliisque morbis complicari, vnde difficilis tum diagnosi morbi complicati, anomali, atque innominati.

a) SAVVAGES. Nosol. Cl. VII. ord. II. G. VI.

§. CLX.

Differentiae.

Multiplex autem est somnambulismus, pro gradu ipsius differentia. Commode distinguitur in *vulgarem*, et in *furentem*, siue complicatum. Vulgaris ille dicitur, in quo *homo sopore excitabili detinetur*, contra quam in *furente*, et *complicato*. In vulgari autem duo gradus a SAVVAGESIO agnoscuntur, vnus leuior, grauior alter. In leuiori somnambuli plerumque noctu post consuetum somnum fiunt, *e lecto non exeunt, se tamen movent, loquuntur*, rixantur, arma distringunt, et vibrant, prout hostes, aut latrones repellendos sibi confingunt, magno tum sui, tum vicinorum discrimine, et metu. In grauiore vero *e lecto exsiliunt, se vestibus*

Vulgaris somnambulismus.

Bus induunt, lampadem accendunt, clauēs inquirunt, fores referant, vinum e dolio extrahunt, aut quid simile patrāt, quin expergiscantur. Alii fenestras insident, et calcare equum, cui se impositos putant, exagitant. Sunt qui flumen tranant. Alii ea omnia oculis apertis faciunt, nec tamen expergefiunt a). Verbo singuli pro diuersa consuetudine, et vitae ratione sua munia, vt vigilantes, peragunt. Animaduersione dignum est, eos sine damno summis se periculis, et praecipitiis exponere, nisi improuide excitentur; tum enim metu perculsi in praeceps ruunt b). Alii si incaute, aut temere excitentur, in furoris speciem adiguntur.

a) SAVVAG. l. c. b) Vid. HILDAN. cent. 2. obs. 84. et 85.

§. CLXI.

Furentem eum dicimus, in quo post breuem somni, aut stuporis speciem, homo statim non consuetam munia obit, sed insolita, et quasi praeter consuetudinem, et furentis in modum aggreditur facere. *Complicatum* vero, quia saepe aliis morbis commiscetur, aut iis succedit. Hunc speciatim *catalepticum* vocauit SAVVAGESIUS a), quia ab initio a catalepsi eum exorsum legerit, deinde in somnambulismum huiusmodi terminatum. Exemplum vnicum ex *Actis Academiae Vpsaliensis*, vbi *cataleptis delirans* ei nomen b) tribuitur, atque ex *Commentariis Academiae Parisinae* c) adducit. Rectius dicendum esse admonet *catalepsin somnulantem* d). In hac specie profecto aegri furore, et delirio quasi perciti canunt, sibilant, exultant, saltant, plorant, discurrent, quin etiam ludicra, obscena, aut turpia narrant; visu, tactu, auditu, olfactu, et gustu omnino destituti. At huiusmodi somnambulismus non vnice catalepsin subsequitur, ideoque generatim *cataleptici* nomen ei non conuenit. Nam sub-

Somnambulismus furens, siue complicatus.

sequitur etiam hysterismum, conuulsionem, epilepsiam, aliosque morbos. Hinc distinguetur in *catalepticum, hystericum, epilepticum*, et sic porro, prout ab uno, vel alio morbo dependere dignoscitur. Illud autem de hac specie, uti perpetuum, et proprium, affirmari potest, quod aegrotantes nulla ratione, ut in *vulgari*, excitari queant, sed sponte dumtaxat, post certum, definitumque tempus, modo longius, modo brevius, solvatur.

- a) *Nosol. class. VIII. ord. I. G. VI. spec. 2.* b) *Ad Acad. Vpsaliens. ad ann. 1732. p. 41.* c) *Ann. 1742*
 d) *Nosol. cl. VI. ord. V. gen. XXIV. spec. 6.*

§. CLXII.

Quae vulgari somnambulismo obveniant.

In vulgari somnambulismo tam leuiori, quam grauiori (§. CLX.) multa obueniunt, quae vehementer somniantium propria sunt. Feriantur fere sensus externi, dum imaginationis vis per causas internas ita afficitur, ut viua idearum phantasmata menti quidem repraesententur, non vero talia sint, quae somnum excutiant. Pro diuersa vero idearum ratione voluntas adigitur ad hoc, vel illud faciendum, ejusque imperio instrumenta motus quasi vi, uti in conuulsionibus, et spasmis, coacta obtemperant, quin tamen sensus externi expergeant. Quo vero modo haec, quibusque causis intimis fiant, non minus obscurum est, quam in catalepsi, atque ecclasi dictum. In furenti, ac complicato somnambulismo ut major mentis agitatio, sic vehementiores tum animi, tum corporis affectus, et motus oriuntur. Quoniam vero non ordinaria, nec ordinata rerum phantasmata menti obuersantur, sed insolita, inusitata, et sine ordine; ideo nil mirum, si furentis, ac prope insanientis speciem referat eo malo prehensus. Accedit, quod in *vulgari somnambulo*

Quae furenti.

ambulismo causae somnum inducentes, etsi graues, non tamen adeo sensus sopiant, ut excitari obuiationibus, etsi aliquanto difficilius, non possint: im contrarium accidit in *somnambulismo furenti*, quo causae cum efficientes validius, pertinacius operantur, sic, ut sensus pene obruti reuocari queant, nisi post certum temporis interuallum, quo nimirum sponte ipsae desinant, et cessent. Probabile igitur est, cerebrum ab iis propemodum uisibus occupari, atque impelli, quas in catalepti, aliisque soporosis affectionibus repertas esse relinimus, neque hic reticendam esse natiuam interm, atque haereditariam cerebri, neruorumque constitutionem. Manifestiores vero sunt causae, quas *procatacticas* vocant. Nam saepe *somnambulismus* cieri visus est ab ebrietate, aut vini merarioris usu, a coena largiore, a cibis flatulentis, et coetua difficilioribus, a nimio stragulorum ponte, a decubitu supino cum capite depresso, ab oleo, similibusque narcoticis, et soporiferis, a stus post coenam, atque a somno illico post cibum pto, a cerebri morbis praegressis, in primis catapsi, epilepsia, lethargia, conuulsionibus hysteriis, aliisque.

Causae.

Prognosis.

§. CLXIII.

Catalepsis in uniuersum periculosus morbus esse editur, quo, nisi cito curetur, stupidi, et quasi u rigentes aegri interire dicuntur. Cl. POSTELIUS in apoplexiam, aut carum lethalem saepe ternari ejusmodi malum tribus allatis obseruationibus ostendit. Periculi magnitudinem confirmat LAMIVS, cum inquit: *in uniuersum paucissimi reuuntur; nemo liberatur, cui secundo catochus su-*

Periculi ratio.

peruenit b). Verum non paucae ab aliis auctoribus memorantur historiae, et quaedam etiam a nobis proferri possent catalepsium perfectarum, imperfectarum, complicatarumque, quae etsi diuturnae fuerint, et crebro accederent, nullum tamen vitae discrimen attulerunt, et feliciter tandem solutae sunt. Periculum vero majus impendit, quo graviora symptomata morbus arcessit, in primis respirandi difficultatem, aut interceptionem, oculorum strabismum, excrementorum suppressionem, riumus exsolutionem: Quod etiam ab *НАРОЧАТЪ* c) innuitur hisce verbis: *quae cum exsolutione sunt catochae, et aphoniae, periculosae sunt.* Catalepsis lethargo periculosior habetur. Item difficilius curatur quae a melancholico humore provenit, quam quae a sanguineo; et curata in melancholiam fere degenerat. Diuturna ut plurimum, et recidiva esse consuevit, et facile in epilepsiam, aut alium capitis grauissimos affectus terminatur. Quamquam soluitur larga narium haemorrhagia, aut uterorum fluxu, aut longa diarrhoea biliosa d), simili alia critica euacuatione, aut mutato genere, aut peregrinatione, aut connubio. Magna ex his communia sunt ecstaticis, et somnambulicis, sed hi minus periclitantur, praesertim pueri, et lescentes, et virgines.

*Prognosis
ecstasicos, et
somnia-
lismi.*

a) *Journal de Médec. T. XX. p. 407.* b) *Synops. dic. practic. artic. 867.* c) *Prorrhetic. l. 3. sect. 4.* d) *Vid. Avvisi sulla salute umana del 1776. p. 39.*

C u r a t i o .

§. CLXIV.

*Curatio pa-
roxysmi.*

Curatio praesertim ex iis, quae ad curandam plexiam, et soporosos affectus tradita sunt, quam maxime poterit. Ceterum duplex ea est mu-

inter habetur, altera, quae in paroxysmo, ut
 untur, ineunda est; altera, quae extra eum.
 roxysmo cauendum arbitror ab acrioribus, cali-
 busque medicamentis, praesertim si ab hysteri-
 ssione, aut a sanguinis nimia copia tam vera,
 apparenti, aut a vehementi animi affectu ac-
 orta sit, mecum consentiente FRIDERICO
 EMANNO a), qui omnia ista, etiam extrinsecus
 ibita rejicienda ducit. Prodest in plethoricis
 uis missus tum e communibus venis, tum e
 ularibus, tum etiam e naribus. Nam per lar-
 narium haemorrhagiam catalepticum puerum,
 tamen vere talis ille fuit, extemplo sanatum vi-
 at AETIVS b). Acida, anodyna, et neruina tam
 terius, quam exterius tum praecipue laudantur c).
 Graui olim virginem maturam viro, et valde san-
 ineam, longis, recurrentibusque catalepseos im-
 etae, et modo vehementissimis conuulsivis mo-
 do, modo cum somnambulismo furenti compli-
 accessionibus obnoxiam, quam interdum bi-
 aut ternae sanguinis e pedibus, et brachiis phle-
 spiae vix quidquam leuabant, e vestigio vero li-
 bat vena jugularis, aut frontalis secta. Errhina
 umque sine effectu adhibita narrantur. Eme-
 si, si mali fomes in ventriculo, vicinisque partibus
 ideat, post sanguinem opportune detractum uti-
 ra putantur. Non reprobantur enemata, atque
 lenientia, inunctiones spinae dorsi, fomenta
 priorum partium, lenes fricationes, itemque
 anda epispastica, si administrari possint, tempo-
 que breuitas non impediat.

Medic. Rarion. system. T. IV. P. 3. cap. 4. in causel.
isr. practic. §. 1. b) Terrabibl. 2. serm. 2. cap. 4.
HOFFMANN. ibid. l. c.

§. CLXV.

Curatio extra paroxysmum.

Extra paroxysmum iis vti omnino conuenit, quae causam, ex qua malum prodiit, emendant, tollunt, aut anteuertunt. Hinc catalepsi, quae vermibus nomen habet, remedio sunt anthelmintica, atque alium lenientia. Puellam odentem morbo catalepsi per simili septem jam dies laborantem, multis eductis sordibus, vermibusque glandis ex melle in anum demissae illico restituta memorat BENEDICTVS a).

Historia curatae catalepticos verminosae.

Historia curationis catalepticos ecstasicae.

Puellae itidem catalepsi ecstasica, sive imperfecta, et cum hysterica conuulsuius motibus complicata detentae, inter alia morbum ex menstruorum defectu, et vermibus intestinalibus inciderat, profuerunt anthelmintica blanda emmenagoga, et antispastica, sed in primis enemata oleosa, deambulationes, et vestio in curia sub coelo fereno b).

Alia observatio.

Alia virgo annum vigesimum quartum vix praetergressa, et catalepsi ecstasica diutinas de ante actae vitae genere meditatione correpta, nequidquam iuuantibus sanguinis missionibus, topicis, excitantibusque compluribus remediis tandem sola aëris mutatione, et peregrinatione sensim conualuit c).

Observatio catalepticos somnambulantis.

Magdalenam Valettam ex mi moerore catalepsi primum verae, deinde delirio, et somnambulismo complicatae, sive, SAVVAGESIVS vocat, somnambulantem diu obnoxiæ referunt *Acta Academiae Vpsalienfis* d), quae multas sanguinis missiones, atque omne antispasticorum, alterantiumque genus diu frustra tentatum, sibi demum relicta, naturae tantummodo providentia ad pristinam valetudinem paulatim restituit.

Observatio catalepticos verae, deinde complicatae.

Ex moerore item, et catameniorum defectu, puellam annum vigesimum primum agens incidit in catalepsin veram, quam deinde subsequutae sunt vehementes artuum omnium conuulsiones, et rigores itemque delirium; diuque his incommodis identem

averata fuit. Eam RICHARDVS REYNELLIVS
are tentavit emeticis, catharticis, venaelectio-
nis, vesicantibus, medicamentis nervinis, cali-
et volatilibus, sed pene frustraneo effectu. Tan-
vfu tincturae hellebori nigri, quae menstrua
et spiritu cornu cerui, qui leniter resoluit, et
it, melius habuit; quod fortasse tempori, et
ioni validiorum medicaminum, quibus ante
ta fuerat, tribui debet e). Frustra etiam DE-
TOURIVS catalepticae tredecim annorum cura-
em vesicantibus, hirudinibus, balneis, atque
ystericis f) aggressus est. Nam quamquam
auxiliis mitiores accessiones redderentur, fieri
en haud potuit, ut penitus desisterent, nisi
quam sponte menstrua eruperunt, quod bien-
post solum contigit.

*Observatio
Delatourii.*

*De curand. morb. l. I. c. 26. b) HOFFMANN. l. c.
v. I. c) Id. ib. observ. 2. d) SAVVAGES. cl. VI.
24. spec. 6. e) Transact. Philosoph. ann. 1735. p. 47.
Rhône BREMONDII. f) Recueil periodiq. d'observas.
M. VANDERMOND. T. V. p. 41.*

§. CLXVI.

curatio illa videtur, quam in virgine cata-
lepsi, et sopore a duobus mensibus pene oppressa
fuit MICHELIVS balneo pedum, et mercurialibus
ctionibus a). Speciatim catalepsis a terrore
ta exigit praeter phlebotomiam cardiaca, an-
tica, nervis amica, hypnotica, imo etiam opium
n. At ex hac causa genitam MAZARSIVS b)
vfu aperientium, cephalicorum, et purgan-
a, et non dissimili medendi ratione prospere
esse accepimus POSTELLIVM c), cui ter mor-
bante curandi oblata est occasio. Quae cata-
leptianis, quartanis, aliisque febribus inter-
tibus superuenit, aut potius singulas accessio-
vi symptoma, comitatur, cortice peruiano ci-
tissime

*Observatio
Michellii.*

*Observatio
Mazarfii.*

* Sphacelismen.

Antiquissimis notus morbus.

quo sensum, mentisque hebetudines, ac supor persequor, an alibi, et praesertim, postquam de Phrenitide egissem, cerebri σφαλισμὸν *) recenserem, sed demum vicit magna symptomatum, quae in hoc affectu apparent, cum superioribus similitudo, consensio. Rarissimus de eo factam mentionem apud Medicos nemo sane inficiabitur; quamquam HIPPOCRATE jam a), ejusque discipulis b) adtributus quodammodo videatur, et deinde a RIVARIO c), PETRO SALIO d), et BONETO e) ante nostra tempora luculenter expressus, descriptusque sit. Nunc vero post edita SAVVAGESII f), SAGANI g), CARRERII h), aliorumque opera ita innotuit, ut qui eum praeterire vellet, jure veluti hospes in pathologicis, nosologicisque rebus *) argueretur.

a) Aphor. 50. sect. VII. b) Auct. de morb. l. 2. n. 20. et l. 3. n. 4. et Coac. Praenotior. l. 2. cap. 2. n. 11. c) Prae-med. l. 1. cap. XII. d) De morb. particul. cap. I. e) Sepulchret. anat. l. 1. sect. 1. obs. 76. 77. 78. 79. ubi et BALLONIO, ROSEINGKIO, HENRICO AB HEERS, et SAVOLA depromuntur observationes, scholiisque illustrantur. f) Nosol. method. cl. 3. ord. 3. gen. 18. g) Synt. morb. symptom. cl. X. ord. 1. gen. XIII. Recusum 1776. Vienna. cl. XI. ord. 3. gen. XII. h) Maled. et flammaz. P. 3. sect. 1. chap. 2.

*) HIERONYMVS MERCYRIALIS (var. lect. l. V. cap. III.) quid sit morbus solstitialis apud Plautum in Trinummio inquirens, haec habet: Forsan autem et pro morbo solstitiali non absolum est intelligere eum, qui a Graecis εὐπλας, a Alexandro (I. Pra. 98.) καύμα, κεφαλῆς, a PLINIO ardeat pitis, ab AVICENNA erysipelas, a RAZE sekakilos, ab HIPPOCRATE sphacelos cerebri nuncupatur, qui licet potissimum in infantibus oriatur, attamen fit etiam in adultioribus, et trium dierum spatio nunquamque perimere solet in aetate, quando, ut scribit ALEXANDER, potissimum inducitur.

§. CLXIX.

Descriptio morbi.

Quantum quidem cum ex aliorum observationibus, tum ex meis ipsis cognoui, his se potissimum notum

notis prodit morbus iste. Acutus protinus capitis dolor accedit, qui occiput praesertim excruciat, non raro aurium alterutram, nec vertici parcit; porrigiturque ad colli vertebrae, atque ad vniuersam pene dorsi spinam, comitante semper ardentissima febre, quae ut ut aegrum adurat, et torreat, sensum tamen ita obruit, ut saepe nec potus, nec cibi quidquam cupiat, sed ne gustare, aut sumere ejus, aut medicamenti ullius aliquid quidem tentet, si ei praebeatur. Accessionibus febris subinde inualefcit, et tum refrigerantur extrema, sed postea recalescunt, incrementum febris impetu.

§. CLXX.

Ad haec facies tumet, rubetque; oculi venis sanguine turgidis distenti, ac fere defixi, immobilesque prominent; mens veluti stupida torpet; aeger ab imo pectore trahit suspiria; ingemiscit subinde; obsurdescit, aut certe difficilius audit; interrogatus respicit quidem alloquentem, sed vix respondet vni plerumque, intercisisque voculis; deinde mox alto silentio premitur, sensusque prope amittit, solo motu supersit, quo adeo irrequieto plerumque agitur, ut locum, quo conquiescat, in cubili inuenire non posse videatur. Exsilit etiam quandoque, inordinate modo huc, modo illuc se reuoluit, modo crura, pedesque dimouet, modo brachia projicit, modo manus ad caput conuertit, modo capillos, modo barbam auellere, modo faciem vnguibus sibi dilacerare aggreditur. Morbo autem jam prouecto, sensibusque prorsus extinctis sedatur, languet, ex toto obmutescit, oculos interdum alta voce excitatus aperit, sed nihil respondet; imo ne annuit quidem, et quandoque vel acriter punctus membra non retrahit, nec ejulatum emittit, apoplectico tum haud dissimilis, atque inter

*Continuatio
descriptio-
nis.*

funestissima haec symptomata citissime interimitur. In pueris saepe vidi resolutionem vnius lateris, aut opisthotonum, aut motus convulsivos aliqua in parte, in primis circa faciem mortem praecedere.

P r o g n o s i s.

§. CLXXI.

*Mortis sem-
pus.*

Exitium vero istud adeo frequens est, vt vix, etiamsi ars naturae quam citissime opem ferat, quisquam euadat. Vt plurimum in tres, aut quatuor dies mors consequitur. Rarissime vltra hosce terminos vita producitur. Interdum tamen ad septimum a), aut ad decimum quartum diem b) aeger resistit, quo tandem occumbit; sic, vt fallax, incertumque haberi debeat HIPPOCRATIS effatum, quod est huiusmodi: *Quibus cerebrum sphacelatum est, in tribus diebus pereunt; si v-ro hos euaserint, sani fiunt c).* Nam eorum vitam in tuto minime adhuc esse, ne post tertiam quidem diem, experientia pluries demonstrauit. Si quid spei superest, id totum a larga narium haemorrhagia expectari licet, nam haec saltem, notante CARRERIO d), pollicetur; contra stillae sanguinis e naribus profilientes perniciem portendunt.

a) Coac. Praenot. l. I. b) AMAT. LVSITAN. cent. I. curat. 9. c) Aphorism. 50. sect. VII d) L. c.

§. CLXXII.

*Qui sani
fiunt, non
recordantur
eorum, quae
acciderunt.*

*Cadauerum
sectiones.*

Si qui vero seruantur, omnium fere, quae eueniunt, inscii, atque immemores remanent, si uerio fides habeatur. Sectiones cadauerum, quorum morte finitum est malum, corruptionem, sphacelum, aut suppurationem, abscessumque in cerebri, aut cerebelli modo corticali, modo medullari substantia patefaciunt: non igitur mirum, si aliquibus paullo

paullo ante mortem, aut post eam pus, exefis ruptisque repagulis, e naribus, ore, auribusue prorumpere visum est. Puellae sexennis, quae ex sphacelismo cerebri intra quinque dies obiit, cadauer sectum est. Dura mater cranio ita adhaerebat, ut difficillime diuelleretur. Ejus vasa, ablato cranio, sanguine plurimum distenta, et praeter modum turgida apparuere. Pia mater aliquanto durior solito inuenta est, sic ut aegre discindi posset. Remotis meningibus, superior loborum cerebri corticalis pars plane corrupta, et putrida coloris plumbei repta est sine vlla puris effusione. Medullaris substantia, quoad discerni potuit, intacta erat. Credibile tamen est, cortice cerebri inflammato, et turgenti medullam quoque compressam fuisse. Nihil in ventriculis, nihil in cerebello praeter naturam visum est, si seri aliquantum excipias, quod sub cerebello effusum ad medullam oblongatam, et initium spinalis usque protendebatur, fortasse opisthotoni, qui postremo superuenit, vera causa *).

*) Huic aegrotanti ego quoque praesto fui. Sectionem cadaueris instituit CAIETANVS VIDEMARIVS auditor olim meus, nunc praestans Medicus ordinarius in magno Vindobonensi nosocomio, a quo etiam morbi historia conscripta est, quam hic inseruisse non erit, ut puto, superuacaneum, cum egregie omnia symptomata, quae maxime diagnosin continent, in ea diligentissime referantur. Puella sexennis aliquantum cacochymica, et facie pallidiuscula, acrimoniae acidae, quam indicabant faciei, labiorum, oris, gingiuorum, fauciumque non admodum rubens color, sitis exigua, voracitas, digestio celerrima, faecum aluinarum, et fudoris acidus odor, et demum mollis, et laxus habitus, acrimoniae, inquam, acidae non expers, mense Iunio ann. 1779, variolis, quae tum epidemicae erant, et quidem confluentibus correpta fuit. His exsiccatis, febris secundaria quotidiana in modum exacerbans persistit, ad quam depellendam pluries acoprotica, multum seri lactis, et corticis peruiani, aliaque antiseptica data fuere. Tandem in variis corporis partibus rubri, dolentesque parui tumores prodire, quorum alii

resolusi sunt, alii vero suppurationem facere, et pus bonum fecit effuderunt. Hinc febricula deuicta, et abscessibus satis diu repurgatis, et ad cicatricem demum perductis, cum aegre conualesceret, in rus translata est, ut aëris purioris beneficio, et continuato tonicorum, atque antisepticorum usu pristinas vires, et valetudinem acquireret. Autumno satis valens urbem repetiit. Per hiemem, quae varia admodum, atque inconstans fuit, crebro coryza, et tussi rheumatica non parum molesta conflictata est. Vere aduentante, atque subitis mutationibus temporum obnoxio, parum sibi cauit ab insolatione, ab aëre frigido tam nocte, quam die, a ventis, aliisque vicissitudinibus tempestatis, eo perniciosioribus, quo magis excalescens erat cubiculum, e quo egrediebatur ad aërem frigidiorum.

As die 17. Maii 1780. circa vesperam repente de acui capitis dolore conquesta est, qui a vertice ad aures usque porrigebatur, sed ad dexteram magis, quae etiam externe videbatur ab eo affici. Dolori successit febris cum vomitu bilioso conjuncta. Nox irrequieta fuit.

Die 18. idem plane dolor; urina alba, tenuis, cruda; pulsus celer, durus, intermittens; pauca loquitur; ut plurimum despicit. Purgata est leni eccoproxico; quo dejecta sunt pauca excrementa. Circa meridiem subriguit, toto corpore doluit; postea subsequuta est febris ardentissima, cum sensum omnium stupore. Respuebat quaecunque ei offerebantur praeter aquam cum syrupo de acido succo mali citrei, quam avidissime hauriebat.

Vespere sanguis primum e vena brachii eductus est, qui crusta pleurifica obtegebatur. Post venae sectionem illico pone aures utrinque emplastrum ex cantharidibus applicatum. Non tamen hinc remittebantur symptomata. Imo nocte proxima facies intumuit, sed sine rubore: oculi fere immoti prominabant, respiratio suspiriis interdum interrompebatur, ingemiscebat subinde, et veluti surda, et stupida videbatur.

Die 19. iterum mittitur sanguis liurudinibus temporibus applicitis. Latum vesicans vertici impositum; cruribus vero, et plantis pedum epispastica. Post meridiem extrema refrigerantur; vespere vero ardentissima febre se se expandent recalescunt. Interrogata respicit alloquentem, non respondet; obscura tamen, et submissa voce conqueritur. Idemdem e lecto exsilit, modo huc, modo illuc se jactat, modo crura, modo brachia dimouet, interdum etiam capillos velere,

lere, et faciem dilacerare tentat manibus. Noctu rursus hirudines admouentur, sed naribus.

Die 20. eadem. Clysmata, quae subduntur nutriendi consilio; vix retinentur. Post meridiem extrema perfrigerantur; ac caput magis incaluit; pulsus frequens, celer, debilis, inaequalis, intermittens, respiratio difficilis, et pene stertorosa, coma somnolentum. Nocte prouecta summo cum calore febris exardescit. Hinc pedes aqua calida fouentur, et fronti linthea ex posca expressa apponuntur.

Die 21. eadem, sed adhuc pejora. Jam jam moritura videbatur. Circa meridiem alius sponte laxata est. Hinc quasi subleuata, et ab orci faucibus reuocata videbatur. Nocte opisthorono accedente omnia in pejus ruunt.

Die 22. nihil mutabatur, et viribus fatiscentibus post meridiem e viuis excessit. Quae in cadauere deprehensa fuerunt, jam supra memorauimus.

§. CLXXIII.

Ex morbi hactenus descripti diligenti, quoad fieri potest, historia liquet, eum esse repentinum, et acutum capitis, modo vniuersi, modo aliquarum ejus partium, sed in primis occipitis, aut verticis dolorem, febrī vehementi continua comitatum cum sensuum, mentisque primum stupore, deinde etiam abolitione, saluo interim corporis motu irrequieto, et manuum erratica agitatione, quam carphologiam vocant; qui intra paucos dies in carum, aut apoplexiam desinens vitam cum morte, vt plurimum, commutat.

Quid sit iste morbus.

§. CLXXIV.

Liquet praeterea, causam ejus proximam grauissimam esse debere, et quae *ἐγκεφάλων* *) perniciosissime labefactet, ejusque functiones penitus destruat. Vniuersim cerebri late sumti inflammationem esse putant, et quidem ejusmodi, vt breui tenerrimam ejus compagem corrumpat, et in putridum tabum convertat. Quamobrem plerique ex nuperis scriptoribus *cephalitidem*, veteres vero *sphacelismum*, *sphacelum*,

* *Encephal.*
Causa proxima.

celum, fiderationem, itemque absciffum cerebri vocant; illi nomen a cauffa, hi ab effectis, quae eam fequuntur, deducetes. Nam credi nequaquam potefl, verum fphacelum, et veram cerebri corruptionem ab initio in hujusmodi morbo HIPPOCRATEM pofuiffe; cum non nullos interdum eundem, et fanos fieri cognouerit, et affirmarit. Quis autem cerebro corrupto, et vere fphacelato feruari poffit? Verba igitur HIPPOCRATIS fano modo accipienda funt, quemadmodum GALENVS a), DYRETVS b), aliique interpretes animaduertunt.

a) *Aph. 51. Sect. VII. et l. 2. de loc. affect.* b) *L. 1. et BALLONIVS Definir. Medic.*

§. CLXXV.

*Quae fedes
paſſantur.*

Verum non modo cerebrum proprie dictum, partesque ejus penitiores, fed etiam cerebellum, et oblongatam, fpinalemque medullam peſſime hac inflammatione plus minus affici, multa cum magna verie ſpecie ſuadere videntur. Intimum enim commune ſenſorium ab ea opprimi oportet, vt ſenſus primum ſtupeant, atque hallucinentur, deinde penitus intercipientur: cerebellum vero, atque oblongatam fpinalemque medullam, vnde potiffimum neruos habent praecordia, et muſculi ad artus ſpectantes, ita irritari neceſſe eſt, vt anxietas, inquietas membrorum jactatio, motuſque inordinati conſequantur, donec his perfecta inſenſibilitas, ſive *anæſtheſia* finem imponat.

§. CLXXVI.

Cauffae remotae.

In cauffarum remotarum cenſum veniunt ſanguinis acrioris, et bilioſioris copia, et feruor, ejus concitatio caput verſus impuſus, inſolationis vis, aëris conſtitutiones calidae, et humidae, acre epidemicum, putridae febres, contuſiones, vulnera, aliaeque exteriora, a quibus non ſolum generatim inflammatio

inflammationes cientur, sed speciatim phrenitidis ea species, quae inflammatoria (§. CLXXXIX.) dicitur, confieri consuevit.

§. CLXXVII.

Non tamen cum phrenitide inflammatoria vnum, *Discrimen inter sphacelismum, et phrenitidem, atque alios capitis morbos.* eundemque morbum esse cerebri sphacelismum putares velim, quamquam vtrique communis causa esse possit. Nam non leue discrimen est inter vtriusque naturam, et phaenomena. Phrenitis enim quacunque ex causa fiat, delirium acutum, et aspiduum est, et quando ab inflammatione pendet, plerumque ferox, et audax cum perpetuis vigiliis. Contra sphacelismus, ut dictum, repentinus, et acutus capitis dolor est cum stupore, et quadam sensilitatis diminutione, breui in anaesthesiam desinente. Fortasse loci etiam affecti ratio differentiam facit. In phrenitide magis exteriora, in sphacelismo interiora cerebri, et cerebelli occupari probabile est. Sed qua ratione vnus ab altera differat, opportunius dicam alibi, vbi phrenitidis (§. CLXXXIV. ad CXC.) historia tradetur. Nunc ostendam, quae differentia inter eum intercedat, atque apoplexiam, epilepsiam, reliquosque soporosos affectus. In apoplexia mox ab initio et motus, et sensus omnino feriantur, et nulla, si purus morbus sit, febris adest: contra in sphacelismo et febris acuta perpetuo tenet, et sub finem tantum sensus, et motus omnis exstinguitur. Eadem ferme de causa sphacelismus discrepat ab epilepsia, in qua, etsi mouendi facultas supersit, tamen motus vehementes, inordinati, inuoluntarii, aegro nempe nec sciente, nec volente, fiunt. In sphacelismo animi nutum, voluntatemque sequi, atque ad certas actiones dirigi videntur; nec demum spuma vlla ex ore profluit. Febris praeterea indiuisibilis eum comitatur, non vero epilepsiam. Carotici porro, et lethargici pro-

fundo somno opprimuntur, fereque immobiles jacent nisi vi extrinseca excitentur. Febrisque vel ab iis abest, si primario morbo laborant; vel ea soporem jam antecessit ut princeps morbus, et causa; vel sopori superuenit, non vero una, ut in sphacelismo, exorditur.

C u r a t i o.

§. CLXXVIII.

Si unquam, hic certe quam citissime ad ea properandum est, quae valentissime inflammationem solvunt, ne corruptio, gangraena, suppuratio, aut abscessus cerebri, et cerebelli hominem interficiat.

v. s. Itaque sanguinem larga manu tam e venis, quam arteriis, prout alibi jam pluries (§§. XXIV. CXXIII. CXXIV. CXXV.) praeceptum est, mox ab incipiente malo detrahare oportet. Quod si neque iterata phlebotomia, neque arteriotome quidquam profecerit, e naribus sanguis ut erumpat, danda est opera; nam hac via sponte solutum quandoque morbum Clinici testantur. Inter ea, quae ad sanguinem e naribus proliciendum adhiberi a medicis solent, PETRVS SALIVS a) DIVERSVS expeditissimum omnium auxilium, nempe hirudines, deligit, quas interioribus narium partibus admouendas suadet, ut repetita etiam applicatione, et spongia ex aqua calida expressa, et cerebro admota ubertim sanguis emanet. Hoc enim auxilii genere aliquos a se restitutos, ac servatos vir expertissimus asseuerat.

*Hirudinum
applicatio
internis na-
ribus.*

a) L. c.

§. CLXXIX.

Reuellentia. Reuellendum quoque efficacissime a capite est cucurbitulis tam siccis, quam scarificatis, quas plurimas admoueri, atque altius defigi oportet; frictionibus item, et ligaturis dolorificis extremarum partium,

um, quas balneis etiam tepidis, et mollienti foue-
 expedit; et demum cantharidibus emplastro ex-
 ptis, quæ humeris, et scapulis apponi possunt,
 exulcerent. Interest præterea aluum leniter, sed
 is bene ducere, abdomen exterius, interiusque
 collire, et capiti ea, quæ reprimunt, et refrige-
 nt, et simul resoluunt, imponere. Releuato dein-
 cerebro ptarmica a non nullis proponuntur: sed
 tunc consilium videtur gratis odoramentis, et mi-
 nistris spiritibus, et suauis olentibus cerebrum re-
 care, quam acrioribus stimulis concutere, aut
 irritare.

§. CLXXX.

Raro accidit, ut ante quartam diem cibus dari
 possit; tribus enim primis vel nihil alimenti aegri
 piunt, vel etiam eos alendi occasio adimitur, quia
 hæc morbus est, et sæpe eo spatio pereunt.
 præterea, si fieri possit, plurimum aquae cum oxyme-
 re, et nitro bibere cogantur, quo et resoluendae
 inflammationi, et viribus sustinendis satis prospici-
 tur. Transacto vero triduo, si res ex voto ces-
 sata sit, aliquantum releuari incipiunt, et sensuum
 suorum recuperare; tuncque alii possunt, sed tenuiori
 victu, et partitis vicibus paulatim. Vinum, do-
 nec morbus manifeste totus discussus sit, omnino
 recusandum est. Postea vero et vino, sed
 diluto, et aqua diluto, paulloque liberaliori cibo
 ut liceat.

*Cibi dandi
 tempus.*

*Vfus vini
 quamdiu
 omittendus.*

CAPUT VII.

DE DELIRIO, VARIISQUE EIVS
GENERIBVS.

§. CLXXXI.

* *Paraphro-*
syne. *Paracope.* *Paraphro-*
nesis. *nesis.* **O**mnis imaginationis, mentisque a recta
 ne aberratio in vniuersum *παράφρεση*
παράνοη * a), vel *παράφρεση* * a Graecis
 minatur, a Latinis vero delirium, infania, vel im-
 pientia. Fere illud delirantibus accidit, quod
 dormientibus, dum somniant, sic vt non
 somnia deliria dormientium; *deliria* vero
 tium somnia dici possint.

a) FERNEL. *Patholog. l. V. cap. 2. et Lexic. Med. Co-*
stello-Brunon. v. Delirium.

§. CLXXXII.

Differen-
tiae.

Complura sane existunt deliriorum genera,
 que vna est eorum natura. At praecipua
phrenitidem videlicet, *paraphrenitidem*, *mania*
melancholiam, in quibus modo imaginatio, modo
 ratio, modo vtrique simul deprauatur, hic ex-
 plicanda suscipiam, quod ad haec quatuor reliqua
 omnes species commode reducuntur, reiectis
 finem paucis verbis de *fatuitate*, tametsi haec
 ad Medicum vnquam pertineat.

§. CLXXXIII.

* *Phreniti-*
da. *Phrenisia-*
fin. *Phrenes.*

A primo genere vt exordiamur, scire licet
phrenitida *, siue *Φρενιτίασις* *, a voce *Φρένις* *, id
 diaphragma, aut etiam *praecordia* deriuatam
 quod in his partibus mentis, et prudentiae
 vetustissimi medicorum a) collocabant. Hinc
 nes infanientes, cum ex praecordiorum culpa
 pere crederentur, phrenitici antiquitus appellab-

a qua sententia non longe abfuisse videtur HIP-
CRATES ipse, cum phrenitidis signa tam in *ter-*
de morbis b), quam in eo, qui inscribitur *de af-*
fectionibus c), libro (quamquam hic discipulo ejus
ALYBO a GALENO tribuatur) enumerans, specia-
liter de dolore praecordia, et septum transversum
flexante mentionem faciat.

a) AVCTOR *de morbo sacro* N. 18. *et de virg. morb.*
b) N. 9. c) N. 10. et 12. ed. Marinell.

§. CLXXXIV.

At postea, ut recte notat VOGELIVS a), cum ab
HIPPOCRATE, tum a CORNELIO CELSO, qui plu-
rima ex eo in latinum sermonem transtulit b), phre-
nitidis ea insania dici coepit, quae et acuta, et conti-
nua, et in febre est. Hujus autem ingens erat apud
eos varietas. Siquidem, inquit idem C. CELSVS c),
et phreniticis alii hilares, alii tristes sunt; alii faci-
li continentur, et intra verba desipiunt; alii insur-
gunt, et violenter quaedam manu faciunt, atque ex
his ipsis alii nihil, nisi impetu, peccant; alii etiam ar-
tem adhibent, summamque speciem sanitatis in captan-
do malorum operum occasionibus praebent, sed exitu
perduntur.

*Phrenitis
qualis Hip-
pocrati et
C. Celso.*

a) Praelect. de cogn. et curand. morb. §. 57. in not. *).
b) De Medicin. l. 3. cap. 18. c) Ibid.

§. CLXXXV.

Paullatim vero ab illorum doctrina non nihil de-
ditum est, idque nominis non delirio solum acuto,
et continuo, cumque febre conjuncto, sed ei spe-
cialiter, quod ferox, et audax esset, tributum a); ex
quo, ni valde errauerim, quod ab inflammatione
meningum, et cerebri, quam proximam phrenitidis
causam jamdiu credere coeperant b), non nisi ve-
ementem, audacemque furorem, et desipientiam
sciri posse opinarentur *).

*Phrenitis
quid deinde
voluerit.*

a) BOER-

a) BOERHAAV. *De cogn. et curand. morb.* §. 771. WIG. *Instit. Med. Clinic. P. I. cap. 2. sect. I.* §. 288. RIN. *Method. medend. febr. cap. 2. de phrenitid.* b) Vid. GALEN. in *praediction. l. I. text. 38.* RIVER. *Med. l. I. cap. XI. de phrenitid.* NIC. PISO *de morb. et curand. l. I. cap. X.* FERNEL. *Patholog. l. V. cap. LXXXIII. Medic. observ. l. 2. p. 66.* et alii bene multi.

*) Qui phrenitidem esse docuerunt membranarum rebus inflammationem, distinguendamque idcirco a ceteri ipsius inflammatione, fortasse ita senserunt, quod haberent illas sensu exquisito pollere, hoc vero nequaquam. Inter eos, qui huiusmodi sententiam tulerunt, meriti primum locum BAGLIVIVS, FRID. HOFFMANNVS, LINIVS, et demum SAVVAGESIVS, qui propterea inflammationem peculiari *cephalitis* nomine donavit a *phrenitide*, siue meningum inflammatione eam sejungeret, distingueretque. Sed fallaci opinione decepti perfesto videntur; nam Hallerianorum periclitaciones, et criticae observationes euicerunt; rem contrario modo se habere, nimirum sensu meningibus carere, non vero cerebrum. Compertissimum praeterea est, in phrenitide quando ab inflammatione pendet, non solum meningibus inflammari, sed etiam cerebrum saepissime. Nec sane fieri potest, cum summa vicinitate, et communicatione nectantur. Neque reticere licet, phrenitidem quando id est ferox, et audax cum febre delirium, et insensatam, illaesis omnino meningibus, quemadmodum lectis cadaueribus patuit. Qua de re videatur CARRERIVS in *Tractatu Des Maladies inflammatoires* sect. I. chap. I. et 2.

§. CLXXXVI.

Phrenitides etiam tacitae, et non feroces.

Verum jam GALENVS in commentario ad illa HIPPOCRATIS verba: *tremulae, obscurae desipitiae, et ubi aegri continuo quasi attrectando aliqui palpant, valde phreniticae* a): palam erroris eos denuciavit, qui phreniticum crederent esse neminem, nisi exsiliret e lecto furens, et vociferaretur, impetumque faceret. Taciturnas autem eiusmodi mentis emotiones in phreniticis, vt supra (§. CLXXXIV. ostensum est, ante GALENVN ipsam CORNELIVS

LSVS commemoravit. Nostra vero aetate idem
 ac ceteris praestitit Cl. SWIETENIUS, utpote
 non solum eas ex Hippocraticis monumentis *b)*
 promtas, verum etiam a semet ipso visas recen-
 satque hisce omnibus adductam GALENI senten-
 tiam *c)* confirmat.

*Praedict. l. I. text. citat. b) Coac. n. 68. c) Com-
 ment. in Boerhaav. aphorism. §. 770. et 771.*

§. CLXXXVII.

Praeterea illud accedit contra eos, qui phreniti-
 dem ab inflammatione meningum repetunt, quod
 saepe constitit ex anatomicis observationibus WIL-
 LAMII, MORGAGNII, CARRERII, aliorumque pro-
 fectorum non indiligentium, non modo meninges,
 sed etiam *a)* cerebrum ipsum inflammatum appa-
 uisse, quin tamen vllum delirium, nedum ferox,
 vehemens subsequutum *b)* sit. Id praesertim in
 macelismo cerebri (§. CLXXXVIII.) persaepe manife-
 stum est. Imo ab eisdem observatoribus certo
 vincitur, frequentius cum meningum, et cerebri
 inflammatione soporosos copulari affectus, atque
 ap lenes potius, et tacitas desipientias, quam fe-
 rex, et audax delirium.

*Phrenitis
 non a sola
 inflamma-
 tione me-
 ningum.*

*a) CARRER. l. c. P. 3. sect. I. chap. I. p. 312. b) BONET.
 Sepulchres. anatom. l. I. sect. VIII. obs. I. 13. 16. et MOR-
 GAGN. l. c. epist. VII. N. 2. 6. 9. II. 13. 15.*

§. CLXXXVIII.

Demum quamvis in dissectionibus phreniticorum ca-
 veribus graues illarum partium (§. CLXXXVII.)
 inflammationes *a)*, suppurationes, corruptiones,
 abscessus interdum inuentae fuerint *b)*, sic ut
 inde phrenitidem originem habuisse negari ne-
 queat: attamen sine vera etiam inflammatione de-
 lirium ferox, continuum, et febre acuta stipatum,
 quale

*In phreniti-
 corum cada-
 veribus re-
 perta.*

quale nempe volunt phreniticum, ab aliis saepe causis plane diuersis, dissimilibusque natum esse spicia pariter ostenderunt, vt nullum dubium de re superesse possit. Nam in phreniticorum pite alias sola gelatinosa, siue mucosa mater concreta nimirum lympa interstitiis vasorum matris intercepta, atque aliqua feri effusi portio exhibuit *c*); alias paucum serum sub meningibus et concreciones polyposae, albae, durae, exiles singulis durae matris sinibus *d*), aut serum mucosum, aut subrubrum inter meninges, aut intra ventriculos dispersum *e*); alias in plexibus choroidae hydatides non paruae *f*), et non raro in ipsius cerebri medulla complura vasa conspicua, nulla vero ejus cortice; interdum etiam tumores, fungosae excrementariae, pustulae in summa meningis durae osseae in ea concreciones, et tandem membrarum, et cerebri ariditas *g*) magna.

a) MORG. epist. cit. n. 13. et alibi; ubi etiam multa vasa praeter modum sanguine turgida in meningibus, quae in cerebro reperta dicuntur. *b*) *Id. ib. n. 2.* BOURQUET *l. c. obs. 3. 4. 5. 7. etc.* ELLER. *observ. de cogn. et curat. morb. sect. VII. mihi p. 128.* LIEVTAUD. *Precis de Med. malad. intern. de la Tête l. I. p. 209.* LANZONI *Epist. N. C. Dec. 3. an. 9. obs. 113.* MOEGLING. *ib. cent. VI. obs. 22.* TISSOT *Avis au Peupl. chap. X. p. 183. 184.* MORGAGN. *l. c. Ep. VII. n. 7. 13. et alibi.* *c*) MORGAGN. *ib. n. 13.* *d*) *Id. ib. n. 11. 13.* *e*) *Id. ib.* *f*) *Id. ib.* *g*) LIEVTAUD *l. c.*

§. CLXXXIX.

*Multiplex
phrenitidis
caussa.*

Ex quibus patere arbitror, phrenitidem in quibusdam tantummodo fieri a cerebri, in aliis a meningum, aut vtriusque loci inflammatione, aut certe a quadam vasorum sanguiferorum distentione quae tamen tanta non sit, vt cerebrum valde premat, sed irriter solum, et commoueat; in aliis vero

effusa lymphæ, aut fero, sed acri, et mordaci, salso, aut a mucosa pituita in cellulofum texturam exsudante, aut a polypofis concretionibus fiftulis venofos obftruentibus, humorumque refluxum mordantibus, aut ab reliquis cauffis paullo ante (§. CLXXXVIII.) recensitis, aut a pluribus earum conspirantibus **).

Mirabitur, et quidem non injuria, quifpiam ab vna eademque cauffa, inflammatione videlicet meningum, et febri modo *sphacelismo* (§. CLXXV.), modo soporoso affectus (§. CXL), modo delirium ferox, et audax, modo placidum, et taciturnum, siue vtramque phrenitidem (§§. CLXXXV. CLXXXVI.), diffimiles adeo morbos, modo etiam delirium nullum proficisci. Si caussam is agerent, hanc in loci affecti diuersitate, in vario inflammationis gradu, variæque ejusdem agendi ratione, ac potius sitam esse, verissimum reputarem. Quando enim inflammatio cerebri medullam, quæ idearum, et cogitationum sedes præhibetur, siue proxime, siue remote irritat, agitatque, quam comprimit, idque sine vlla ratione, aut intermissione fit, delirium ferox, perpetuum argat necesse est; siue *phrenitis* ex sententia recentiorum.

Contra si irritatio inaequaliter, remissiusque eam agit, tunc *phrenitis* quidem, sed *spuria*; delirium nempe nec perpetuum, nec ferox, sed interruptum, et placidum.

Si vero ad medullam non propagetur, nullum delirium consequitur. Quod si inflammationis ea sit vehementia, vt cerebri medullam vrgeat, sensusque interiores præteriti obruat, en *soporosos affectus*. Cum vero cerebellum, et medulla oblongata, et spinalis præcipue irritentur, dum cerebri interiora potius comprimuntur, cumque sanguinis ea sit conditio, qua ad corruptionem et *sphacelismum* inclinet, facile euenit, vt anxietas, inquietudo, somnolentia, sensuum stupor, aphonia, atque alia, quæ in *sphacelismo* cerebri fieri diximus, consociantur.

*) Varias esse phrenitidis caussas etiam Cl. STOLLIVS ostendit, idque comprobatur compluribus phreniticorum anatomicis sectionibus. Vid. ejus *Ratio medendi in Nosocomio Vindobonensi*. P. 3. sect. 3. *Dissert. de causis et sedibus phrenitis*. p. 175.

§. CXC.

*Quomodo a
tam diuersis
caussis deli-
rium efficia-
tur.*

Cum igitur tam variae, et multae phrenitidis
lirii caussae videantur esse, pro varia videlicet
guinis, et reliquorum humorum congestione,
rata natura, aut motu, pro varia affecti cerebri
te, et ratione, aut mala ejusdem, et meningum
stitutione; necessario sequitur, vt non vna cerebri
aut meningum inflammatio phrenitidis effectus
habenda sit. Illarum vero omnium, quaecumque
demum fuerint, vis, atque actio eo spectat, vt
guinis motum vel retardando, vel intercipiendo,
vel incitando, vel vasa cerebri, meningumque ob-
struendo, replendo, irritando, distrahendo sic ce-
rebrum ipsum intime exagitent, acriterque afficiant,
vt inordinati, et plus minus vehementes in medul-
laribus ejus fibris motus (vnde etiam neruorum ap-
penforum vis intendatur) suscitentur, et quaedam
idearum veluti monstra mentem, rationemque sub-
vertentia, et deprauantia enascantur. Qui motus
si valde increscant, motus etiam conuulsiui totius
corporis insequuntur.

§. CXCI.

Phrenitis ergo duplici modo spectari potest, nem-
pe vel ex parte caussarum, vel ex parte singularium
ejus symptomatum. Atqui caussae adeo obscurae
plerumque sunt, incertae, multiplicesque, vt mi-
nime planum, expeditumque sit ex his certam ve-
ramque ejus naturam attingere. Quare consilio
judico, quod etiam aliis in morbis tenendum est,
eam per peculiare, et proprias affectiones, quae
sensibus obuiaae sunt, describere, et repraesentare
nulla videlicet caussae, quae dubia, aut fictitia esse
possit, facta mentione. Esto igitur phrenitis deli-
rium continuum, vniuersale, plerumque acutum, et fe-
rox cum febre acuta *) conjunctum.

*Definitio
phrenitidis.*

*) Sim

*) Similem huic definitionem praetulerunt alii **CARRIVS**, et **SWIETENIVS**. Posita huiusmodi definitione, quae naturae magis consona videtur, reliquum est, ut corruant eorum definitiones, qui *phrenitidem* dixerunt *delirium vehemens*, et *furiisum ex inflammatione meningum*, *cerebrique ortum*, aliaeque ejusdem generis. Neque firmiori nisi fundamento fortasse videbitur illa, quam tradidit **VOLATILIS**, *phrenitidem* in uniuersum appellans eam febrem malignam, in qua constans insania cernitur. Nam hac ratione excluditur *phrenitis*, quam *meningum*, et *cerebri inflammatio simplex*, aliaeque causae malignitatis minime participes efficiunt, quamque certae obseruationes possibilem commonstrarunt, ut supra dictum est.

§. CXCI.

Huic viam quodammodo praeparant, occasio- *Causae pro-*
nemque porrigunt aetas iuuenilis; temperamen- *egumenae, et*
tum sanguineum, aut cholericum; regio, et tem- *procasae-*
ticae.
pestas praeferuida; liquores fermentati, spiritusque
ardentes; vigiliae protractae; vehementiores ani-
mi affectus; curae, et studia intensiora; alimenta,
et medicamenta acria ingesta; haemorrhagiae na-
rium, aut cuiusque alius consuetae excretionis re-
tentio; inflammatoria diathesis; serosa colluies;
iners, lentus acerque humor; putrida, et biliosa
cacoehylia; dyscrasia scorbutica; sanguinis disso-
lutio putris, altiusque in cerebri penitiora adyta
penetrans; metastasis anginae, pleuritidis, peri-
pneumoniae, variolarum, morbillorum, miliarium,
aut petechialium exanthematum, arthritidis, poda-
grae, erysipelatis, lochiorum, lactis in puerperis,
in primis non lactantibus, scabiei, aliorumque ab
acri lympham morborum; miasma epidemicum; fe-
bris acuta, vehemens, ardens, maligna, petechia-
lis, miliaris, lenta nervosa, et perniciose quaeuis;
dolores capitis atrociores; frigida nimis, aut nimis
calida capiti imposita; ictus, contusio, vulnus, cra-
nii fracturae; et demum morsus venenati, imo ve-

vena quaedam, vti belladonna, siue solanum furiosum, hyoscyamus, stramonium, cicuta aquatica, et reliqua.

§. CXCH.

*Insolatio
frequens
phrenitidis
caussa.*

His (§. CXCH.) tamquam frequentissimam phrenitidis euentem causam adiungunt plerique, sed in primis Cl. TISSOTVS a), incautam insolationem, potissimum verno, atque aestivo tempore. Radius enim solaribus, quibus caput diutius obiectum fuerit, vasa primum dilatantur, cruor rarefcit, atque ebullit, in aliena spatia irrumpit, ignea materia in motum cietur, fortasse aer insitus, et coërcitus a soluitur, et elasticam formam acquirit, liquidissima deinde exhalant, ac diffantur, reliqua densantur, siccescunt, acria redduntur; hinc magna in vasis aestuatio, tensio, irritatio; vno verbo ea cuncta fiunt, quae sanguini in *ἐγκέφαλον* *) valentius provocando, atque congestionem inflammatoriae inducendae aptissima vniuersim habentur.

* *Encephalon.*

a) *Avis au Peupl. T. I. chap. X. Du coup de soleil.*

§. CXCV.

*Differentia
ex scripto-
rum placitis.*

Communiter phrenitis diuidi solet in *primariam*, et *secundariam*. Primaria dicitur illa, in qua cerebrum primario afficitur, febrisque eodem tempore, aut paullo post accedit: secundaria, in qua cerebrum quidem laborat, non tamen primario, atque ab ipso initio, sed secundo, siue morbi progressu; veluti quando aliis morbis acutis, aut febribus superuenit. Febris in hac vel iam antea vt primarius morbus aderat, vel vt comitans aliunde orta cum ipsa complicatur, vel etiam vt symptoma adiungitur. Interdum haec phrenitis appellatur *symptomatica*, quando nimirum alterius morbi adhuc praesentis, vti febris acutae, malignae, aut epidemicae,

demicae, pleuritidis, peripneumoniae, variolarum, morbillorum, ilei etc. symptoma est. Nolim tamen, vt secundaria, et symptomatica, in quibus cerebrum idiopathice affectum ponimus, confundantur cum illo delirii genere, quod a causa alibi existente, cerebrumque sympathice tantummodo perturbante excitatur, quodque, ea remota, illico cessat; nam id potius ad *paraphrenitidem* *) attinere videtur, vt deinceps exponam. Rursus *primaria* plerisque eadem est cum phrenitide vera; *secundaria* vero cum symptomatica. At ex aliorum sententia *phrenitis vera* ea haberi consuevit, quam inflammatio meningum, et cerebri parit; *spuria*, quam aliae causae, cerebro tamen, ejusque tunicis inhaerentes. Verum quaeri adhuc potest, *verane* phrenitis ab aliis etiam causis, quam ab inflammatione, quandoque exstiterit.

*) Non paucae phrenitides a Cl. STOLLIO (l. c.) descriptae verius ad paraphrenitidem spectant.

§. CXCV.

Quare in hac discrepantium sententiarum varietate, vt omnis evitetur altercationis occasio, rectius fortasse *phrenitis vera* dicetur ea, in qua delirium perpetuum, audax, ferox, garrulumque cum febre acuta excandescit: contra *spuria*, in qua delirium neque adeo continuum, neque audax, sed placidum, aut taciturnum est, neque febris adeo vrget. Vtramque siue veram, siue spuriam, tum primariam, tum secundariam in medentium commodum, ratione a causis ducta, distingui licet in *sanguineam*, in *serosam*, in *mixtam*, in *metastaticam*, in *purulentam*, et sic porro. Rursus *sanguineam* praestat subdividere in *phlegmonodem*, et in *eryspelatodem*. Nec absolum est, *serosam* quoque in duas tribuere, alteram videlicet a viscido, crasso, ac mucoso humore vasa

Quae dicitur nobis, quae spuria phrenitis.

Subdiviso in sanguineam, serosam, mixtam, metastaticam, purulentam.

Sanguinea duplex. Duplex etiam serosa.

L 2

cerebri,

cerebri, meningumque hinc illinc obstruente, alteram a lymphâ tenuiori, et magis acritate, quam spissitudine peccanti, atque alienis, noxiisque recrementis infecta, cerebrum, meningesque irritante progenitam. Atque ad hasce differentias vniuersae fere causae phrenitidis commode perstringi posse videntur. Ad eas igitur Medicus animum advertat necesse est, si secundum rationalis medicinae praecepta suis aegris opitulari velit.

§. CXCVI.

Distinguitur a phrenitide delirium febrile, quod in accessibus intermittentibus fit.

Scire etiam magni interest, diuersum esse a phrenitide delirium illud, quod vehementiores intermissionum febrium accessiones comitatur, quodque tum solum ingruit, atque manifestatur, quando febris exacerbatur, atque increfcit; remittit vero, et cessat, quando febris inclinât, et decedit. Hanc delirii speciem alii *delirium febrile*, alii, vti LOMMIVS, *paraphrenesin*, alii simpliciter, vti CARRERIVS, *paraphrosynen*, id est delirium, vocant. Differt enim a phrenitide, quod intermissionem habeat, et per circuitus redeat, dum contra in phrenitide ex superioribus cognouimus perpetuam esse desipientiam, et minime interruptam. Quâ demum ratione a phrenitide discernantur paraphrenitis, mania, melancholia, aliaeque insaniae, patebit ex iis, quae infra tradentur.

Diagnosis.

§. CXCVII.

Signa phrenitidis speciatim sanguineae.

Phrenitidem *sanguineam* (§. CXCVI.) antecedunt vigiliae continuæ, acutus capitis dolor, et calor ingens, quaedamque insolita ad iram, furoremque animi procliuitas, imo interdum ipsa mania. Ad haec accedit febris acuta, et vehemens; pulsatio arteria-

arteriarum in vniuerso capite valde molesta, in primis temporalium; oculorum insueta mobilitas; eorum, et faciei totius rubor, tumor, ac toruus aspectus; mentis perturbatio subita, aut sensim oborta, plerumque in fomno incipiens, deinde perpetuus ejus error, modo cum audacia, et furore, modo sine his; rerum, etiam praesentium, obliuio facilis; pulsus frequens, velox, ab initio saepe magnus, postea paruus, inaequalis, contractus, valde tamen durus, et chordae instar tensae renitens; respiratio magna, et rara, aut inaequalis; oris, et linguae ficitas, atque asperitudo; nullus plerumque sitis sensus, tametsi valde lingua, et fauces arecant; vrina pauca, flammea, modo tenuis, et aquea, modo turbida; nullus somnus, aut si quis obrepat, interruptus, et spectris, somniisque perturbatus.

§. CXCVIII.

Causae etiam, quae morbo occasionem dedere, *Quibus notis confirmetur diagnosi.* plurimum ejus naturam illustrant. Dispicendum igitur est, utrum eae fuerint tales, quae sanguini ac-
cumulando inflammationique exsuscitandae idoneae censentur; temperamentum an sanguineum, aetas, habitus corporis, vitae ratio respondeant; an euacuationes sanguineae defecerint; an metastasis inflammationis alicujus partis praecesserit? Ista enim probe indagata iudicium de phrenitide sanguinea, atque inflammatoria multo probabilius efficient. Si *Signa sanguineae phlegmonodis.* simul soporosa affectio, aut potius coma vigil concurrat, tumeatque facies, et collum, sanguis e vena missus densior sit, spissior, et tenaci alba crusta, quam dicunt pleuriticam, tectus, *phrenitidem phlegmonodem* indicabunt. Si vero vigiliae magis, *Signa sanguineae erysipelasodis.* quam somnus; furor, quam taciturnitas; dolor capitis lancinans magis, quam pulsans; flauescens cutis color potius, quam ruber; sanguis detractus te-

nuis, rutilus, flauo fero innatans, temperamentum cholericum; aestiuum tempus; febres biliosae, ardentes, putridae stationariae fuerint; conjecturam ex his facere licebit, *phrenitidem eryspelatodem esse*

§. CXCIX.

*Secundariae
et sympto-
maticae.*

*Serosae
utriusque.*

Similia superioribus (§. CXCVII.), sed plerumque minus vehementia eueniunt, vbi *phrenitis secundaria* est, alteriusque morbi symptoma: multo etiam mitiora, si *serosa* potius fuerit; quae praesertim ex temperamento phlegmatico, habitu pituitoso, aetate puerili, aut senili, victu humido, regione palustri, vita deside, vultu decolore, pulsu molli, exiguo ad frontem calore, non magna temporaliu arteriarum pulsatione, minore tum linguae, tum faucium ariditate, aliisque, quae supra (§. CIL.) notauimus, apparebit. Grauitatis potius, quam acuti doloris sensus, major ad somnum procliuus *lentorem*; punctiōis perceptio, atque agrypnia *acritatem et tenuitatem* feri, et lymphae patefaciunt; vt nihil memorem antecedentia, ex quibus maximum lumen affulgebit. *Mixtam* ex vtraque causa, sanguinea nimirum, et serosa, significabunt notae vtriusque propriae vna consociatae. Sola anamnesis *metastaticam*, aut *purulentam* indicabit. Rariores vero, occultioresque ejus alias causas (§. CLXXXVIII. CLXXXIX.) ex prima morbi origine sedulo indagata, peculiarique, atque insueto symptomatum genere diuinare oportebit. Sed arduum sane opus hoc est, et perspicacissimum, solertissimumque inuestigatorem requirit.

§. CC.

*Signa quaedam
cuilibet
phrenitidi
prope communia.*

Ceterum cuicunque phrenitidi commune est multa sine sensu, atque ordine effutire, ridere, plorare, irasci, proflire, et fugam tentare; ingrauescente deinde

deinde malo manibus tremere, floccos earpere, festucas colligere, muscas venari, stragula complicare, dentibus stridere, et demum in soporem, vel *carum* summa cum virium, et pulsuum imbecillitate delabi, vel neruorum distentione corripì, morte paullo post tragoediam claudente.

P r o g n o s i s.

§. CCI.

Hoc genus dementiae est longe acutissimum, *Signa exitii futuri.* quippe quod intra breuissimum tempus enecare solet. Apud Aegyptios saepe intra paucas horas, vt refert PROSPER ALPINVS a), homines perdit. Narrat enim phreniticos se complures vidisse, qui tribus, quatuorue horis perierint; contra quam GALENO contigit b) obseruare. Vt plurimum tamen intra tps, quatuor, aut septem dies occidit. Id autem futurum prope declarant continua tum infania, tum vigilia; aluus, atque vrina pertinaciter compressa, aut hujus color albidus ex saturata, aut tenuitas ex crassa quae erat, subito accedens; deglutiendi difficultas, aut impotentia sine villo interiorum faucium visibili vitio; aut gutturis, cervicisque sine tumore dolor; difficilis crurum extensio; syncope, aut neruorum distensio.

a) *Medic. Aegypt. l. I. cap. 13. p. 23.* b) *In l. 3. epidem.*

§. CCII.

Exitiosum quoque est, sudorem frigidum supervenire, extrema perfrigerari, et non recalescere, aut delirium in lethargum, aut soporem sine bona causa commutari. Gangraenae enim, aut abscessus, aut infarctus ad summum perducti indicium est. Idque certius fiet, si febris se remittere visa sit, si

Alia signa exitii impendentis.

vomitum aeruginosa exprimantur, faciem pallor occupet, pulsus langueant, inaequaliterque subsiliant, et mentis aliqua, licet brevis, quemadmodum paulo ante mortem interdum accidit, redeat tranquillitas.

§. CCIII.

*Signa mala
stillae sanguinis,
urinae crudae,
aut nigricans.*

**Enaeorema.*

Male praeterea ominentur sanguis e naribus prodire nitentis exiguae, et paucae stillae, itemque urina semper aquosa, et tenuis, aut post quaedam coctionis indicia in crudam, et percolatam conuersa, aut *ἐναιώρημα* *) nigrum exhibens. Quorum alterum morbidum ad caput materiae translationem; alterum humorum corruptionem, et quasi necrosin indicat. Nulla, aut plane exigua spes relinquitur in phrenitide ex metastasi orta, aut labantibus jam viribus, longoque morbo exhaustis superueniens. Hinc fortasse est, cur metuenda magis ea censeatur a PLATNERO, quae paulatim ingruit, insurgitque, quam quae repente adortur; quamquam utraque periculi plena nobis videatur. Generatum delirium cum risu discriminis minus habere creditur, quam illud, quod cum moerore, anxietate, silentio, aut metu est.

§. CCIV.

*Signa boni
exitus.*

Quando vero leuiori gradu morbus incedit, et mature medicina ei adhibetur, non raro soluitur narium haemorrhagia, vel fudore multo, calido, vndique manante, vel alui fluxu, vel haemorrhoidibus, vel catameniis, vel varicibus in cruribus reclusis, vel aliqua alia euacuatione, cuius utilitatem ostendit mitigatio symptomatum, et functionum omnium successiva redintegratio. Pus interdum per aures, aut alia loca cum salutis spe effluere visum est; quod tamen rarissime usu venit. Bonum insuper esse consuevit, multam aquam ex ore, aut naribus

aribus ferri, aut aures diebus criticis, et signis cotionis apparentibus obsurdescere, aut pectus, aut tus doloribus corripitur cum capitis leuamine. Nam interioribus ad exteriora mali vim transferri, iudicium est.

§. CCV.

Post deuictam febrem non rarum est aliquamdiu ^{Varia mor-} adhuc delirium produci; imo interdum in ^{borum suc-} *maniam* ^{cesso.} ut *amaurosin* desinere, quando nimirum, ut aliqui applicant, vasa cerebri dilatata, atque oppleta, postquam febris cessauerit, nequeunt se a materia obruente expedire, sed cum eadem veluti concreunt, intercipiuntque sanguinis, aliorumque humorum circuitum; aut quando materies morbida interioribus cerebri sedibus ad neruos opticos, ut acusticos transfertur; vel demum quando (id quod etiam probabile est) intima cerebri medullas structura sic labefactata est, ut ad pristinam vbiue integritatem restitui amplius non possit. *Maniam, et fatuitatem* perpetuam relinqui saepissime a phrenitide, in quam puerperae ex lochiis retentis accidunt, auctor est SWIETENIUS a). Ego ipse mentis imbecillitatem ex hac causa profectam videre mihi adhuc iuueni contigit in venusta, alioquin iuua, optimique habitus, et temperamenti muliere, quam lochia ob adspectum infantis mortui improvide eidem objecti compressa phreniticam reddiderant.

a) *Comment. in BOERHAAV. §. 774. pag. mihi 149.*

C u r a t i o.

§. CCVI.

Phrenitidi *phlegmonodi* (§§. CXCV. CXCVIII.), praesertim primariae, ea omnia conueniunt, quae teris inflammationibus, in primis largissimae sanguinis

guinis missiones e venis brachii, pedis, colli, frontis. Nec temporali arteriae parcendum quodque est, a cujus sectione saepe plurimum haberi expectari licet *). Haemorrhoides quoque hinc nibus pro re nata aperiri debent: nam raro eas fluxum fallere, et saepe delirium sanguine ex stillante compesci, multorum, et praesertim swa TENII auctoritate atque experientia compertum comprobatumque est a). Narium item haemorrhagia, aut hirudinum ope, aut stilo immisso, alia idonea ratione proleeta plurimum conferre visa est. Imo pone aures hirudines apponitissime solent, tantique eas facit FR. CASIMIRUS MEDICVS b), ut nullam in phrenitide secundaria, morbis acutis videlicet accedente, sanguinis detractionem putet ea praestantior, quae fit per hirudines pone aures admotis.

*) CL. SIMSIVS plus in libra sanguinis ex arteria temporali educti confidit ad curandam phrenitidem, quam triginta uncias e vena quacunque emissis. Vidit autem cius decem, vel duodecim sanguinis sic extracti delirium, ferocem, minacemque intuitum, atque verum ruborem sublatum, et somnum tranquillum subsequutum, a quo aeger expectatus omni periculo vacat. *Malad. epid. p. 12.*

a) In BOERHAAV. §. 702. b) *Collect. Observ. Med. Pract. T. 2. p. 469.*

§. CCVII.

*Antiphlogistica.
Pedum balnea.*

*Enemata.
Eccoprotica.
Aegri post
sus quinam.*

Insuper dari intrinsecus debent antiphlogistica, potiusque largior, qui diluat, et temperet, et narium cordis, atque arteriarum irritabilitatem inhibeat, manus, et pedes in calidam demergi; in aluminis jici enemata, quae laxent, et refrigerent; eccoproticis intestinorum excretio sollicitari, ut reuulsio facilius capiti derafo imponi ea, quae humectent, mollificent, auocent, aestum coercerent, aut leniter reprimant. Praestat quoque aegrotantem erectum, capite deorsum

ere, interdum residere, aërem frigidiusculum capere, leuiter tegi, a luce prohiberi, ad silentium, quietemque componi. Fracto jam vero febris impetu, resolutaque ferme inflammatione, si nimia *sensibilitas*, atque neruorum *ataxia* videatur adhuc delirium, vigiliasque protrahere, hypnoticis; vel opio ipso, refracta tamen, et cauta dosi uti, inter- *Hypnotica quando.* am innocuum non modò est, sed utile, ac necessarium.

§. CCVIII.

Cum vero satis jam sanguinis detractum videtur, vel vires largiori euacuationi ferendae impares sunt; et nihilominus delirium, et cetera inflammationis effecta in eodem gradu persistunt, nec mitigantur: tunc optimum, tutissimumque praesidium est, cucurbitulas, nisi prius adhibitae fuerint, occipiti, pone aures, dorso, aut cruribus, incisa profundius cute desigere, aut hirudines locis jam *Hirudines.* alibi saepius indicatis, aut epispastica plantis pedum, crurumque suris admouere. Hodie non pauci capillatam capitis partem, resectis crinibus, *Vesicans capiti deraso.* emplastro, quod vesicas excitet, ex cantharidibus tegendam jubent, euentu felici pluries obtento consisti. Sed caute id fieri debet, tumque in primis, ut mihi videtur, cum sopor, et stupor delirio adjungitur, et quodammodo vrgentior est, neque temperamentum, aut habitus corporis, neque nimia neruorum sensibilitas, siue peculiaris ad febres procliuitas aduersantur. In his enim casibus conuenientius est reuellentibus mitioribus, *Reuellentia mitiora.* veluti cucurbitulis ficcis, fricationibus, sinapismis, et balneis pedum, et crurum uti, eoque libentius, quod BAGLIVIVS a) in phrenitide inflammatoria vesicantia plus nocere, quam prodesse arbitratur.

a) Praefat. de fibr. morrit. et l. I. cap. 6. Vid. Comment. de reb. in Med. et Sciens. nat. gest. Vol. 2. p. 400.

§. CCIX.

§. CCIX.

*Sanguinis
missio in cu-
ra erysipela-
tosis.*

In phrenitide porro, quam *erysipelatodem* (CXCVIII.) nominauimus, sanguis mittendus videtur, sed non vrgenda valde, vti in phlegmone ejus profusio. Minori igitur copia, nec plura extrahere eum licet, quod inde delirium inuale-
re, conuulsionesque acciri, saepe *) obseruatum. Id in primis in quibusdam aëris constitutionibus febribusque epidemicis malignis, aut putridis, itaque in febribus nosocomicis non raro euenit. Interdum satis erit per cucurbitulas, aut hirudinum missionem ejus moliri, aliaque adhibere, quate-

Alui ductio.

*Refrigeran-
tia.*

pitate quam lenissime reuellunt. Valilissimum vero est aluum tum enematis, tum cremore tartari, aut sero lactis, cui tamarindi incocti fuerint, subducere; feruorem sanguinis subacidis succis vegetabilium, aut vbi valentius agendum est, spiritibus vitrioli, sulphuris, aut nitri restinguere; acritudinem biliosam, atque *alkalescentem* diluere, denotare, corrigere non solum illis, verum etiam potu largo, farinaceo, acescente, frigido, et si aestas, temperamentum, tempestas, regio, aut aegri assuetudo consentiat, etiam niuato. Caput, si unquam, hic certe deradi, atque aceto aqua diluto, siue pota frigide, aut egelide tantum, perfundi, et foueri, pedibus interim in calidam demissis, aut pannis laneis ex calida expressis inuolutis, necesse omnino.

*Quae capiti
imponenda.*

*Simsii obser-
vatio.*

*) Fortasse ad hanc speciem spectabat ea phrenitidis venae sectio, referente SIMSIO (*Malad. epid. p. 13.*) res prosternebat, et mortem post horam afferebat; vero lanei ex calida expressi, et pedibus circumducti moperere, aduocato sudore leni, profuerunt. Hisce phreniticis oculi erant rubri, inflammati, et furentes, lingua sicca, cutis ardens, delirium magnum, pulsus durissimus. Moriebantur plerique die tertio. Qui diem quartum perabant, seruabantur, atque euadebant. Abusus liquorum calefacientium, et frigus susceptum morbo occationem praebebant. Tempus autem erat vernum.

§. CCX.

Nec valde ab hac curationis methodo (§. CCVIII. *Quae cura-*
 IX.) discrepare debet ea, quae phrenitidi *sympto-*
ticas, aut *secundariae* (§. CXCIV.) adhibenda est. *rio sympto-*
maticae et
 posae vero pro diuersa causae natura (§. CXCIV.) *serosae?*
 modo volatilia remedia, et vesicatoria, et quae acrius
 atant, reuelluntque, accommodantur; modo ab
 abstinendum est, et potius acritas diluentibus,
 operantibus, et diaphoreticis oppugnanda. Ex
 quoque vero genere curationis, quod sanguinea,
 serosa postulant, componi debet ea, qua *mixtae* *Quae mix-*
 CXCIX.) occurrendum est. Generatim autem, *tac?*
 spuria fuerit, opus est non iteratis adeo sanguinis
 missionibus, nec tanto antiphlogisticorum appa-
 ratu, aut certe pro causarum, vnde fit, varia ra-
 one alia, atque alia curatio requiritur. Delirium *Febrili?*
 pro, quod in febrium augmento incidit, iis discu-
 tur, quae febrem ipsam tollunt. Illud autem, *Sympasbi-*
 od a saburra primarum viarum fouetur, emetica, *cae ex sa-*
 cathartica exigit, nec sanguinis eget missione, *burra ga-*
frica.
 pote quae noxia omnino a) foret.

a) BOERHAAV. et SWIETEN. §§. 85. 620. 701. 702.

§. CCXI.

Aëris etiam, in quo aeger versatur, temperies ad *Diaeta.*
 gidam, humidamque inclinet, oportet; nec alio
 , quam tenuissimo vtendum victu. Retuso de-
 de et febris, et phrenitidis impetu, si leue deli-
 um, aut coma, aut alia cerebri affectio adhuc per-
 anset, viresque sint imbecillae, non amplius san-
 inis missione, aut purgatione corpus vexandum;
 equiete, expectatione, et blando potius cibo ab-
 mandum est reliquum a) curationis.

b) SWIETEN. l. c.

PARA-

PARAPHRENITIS.

§. CCXII.

Quotuplex
paraphreni-
tis?

Nunc ad *paraphrenitidem* me conuertam. Haec vox non vno apud omnes sensu vsurpatur, sed aliis laxius, ab aliis pressius. Illi voce hac comprehendunt quodcumque delirium cum febre, quod ab aliqua viscerum siue pectoris, siue abdominis inflammatione sympathice inferitur. *Paraphrenitis* autem hujus tot species constitui possunt, quod morbi, quorum symptoma ea est. Huc a nonnullis deliria etiam referuntur, quae ab Otite, et Paronychia extremi digitorum articuli, atque vehementiore cujusvis partis dolore, et cruciatu nervorum consentientem vim pronascuntur. Haec pariter redigi possent eae desipientiae, quae febribus acutis superueniunt, siue cerebrum idiopathice, siue sympathice e vermibus, bile, fordibus perimarum viarum compatiatur. Ex qua postrema causa ita crebro desipere homines solent, ut 70. HENRIC. RAHNIVS a) cum TISSOTIO putet, et viginti deliriis tam acutis, quam chronicis, obsecim hypochondriorum vitiis tribuenda esse; idem confirmat adductis in medium observationibus, quibus ostenditur, cerebrum in illis labem prae se habuisse *) nullam, quamquam non semper huiusmodi apparens cerebri integritas certo signum delirium sympathicum fuisse. Sunt demum paraphrenitidis nomine illud delirium intelligendum, quod aliae causae, quam inflammatio, cerebrum afficiunt, quodque *phrenitidem spuriam* aliquibus dici, supra (§. CXCV.) significatum.

a) *Comment. de reb. in scient. nat. et med. gest. XVIII. P. III. p. 456.*

*) Tot modis cerebrum laedi potest, tamque obsecumque inconspicuis, ut, ubi in eo nulla laesio oculis et storum se ostendit, dubitari adhuc possit, an sympathice

ac ne, fuerit phrenitis. Non enim protinus cerebrum
 aelsum licet pronuciari, atque aliunde delirium ortum,
 ando in eo vitium patens, ac manifestum non detegitur.
 erum RAHNII, et TISSOTII sententiam confirmat suis
 eruationibus STOLLIVS, *Rat. medend. T. 3.*

§. CCXIII.

Qui vero pressius paraphrenitidis vocabulo, et *Quid stricte*
 is proprie se vti dicunt, non aliud eam esse cum *paraphreni-*
 RHAAVIO contendunt, quam veram diaphra- *tis Boerha-*
 tis inflammationem, quacum perpetuum deli- *vianis.*
 m conjungi, HIPPOCRATEM jam, et GALENUM
 uisse perhibent a). Diaphragma enim, cum
 de neruosum, spasmisque ob musculosam fabri-
 m maxime obnoxium habeatur, vbi inflammatio-
 m contraxerit, facile in consensionem adducere
 ebrum, atque ita commouere creditur, vt non
 is inde, et continua insania consequatur.

SWIETEN. in BOERH. §§. 907. 909.

§. CCXIV.

Negari quidem haud potest, mentem interdum *Delirium*
 phragmate inflammato, praesertim cum morbus *saepe abest*
 uescit a), moueri, et desipere: sed illud quo- *ab inflam-*
 certissimum est, sicut ex multorum fide, et se- *matione dia-*
 m cadauerum indubia demonstratione b) con- *phragmatis.*
 e, delirium ab inflammatione tam tendineae,
 m carnosae diaphragmatis partis persaepe ab-
 e; ac proinde non esse delirium huiusce morbi
 rium, atque inseparabile symptoma. Quod
 et ipsi non semel cadauerum sectionibus com-
 uimus alias, sed praecipue non pridem in
 am viro, amico nostro, ex inflammatione con-
 e diaphragmatis partis, quam herpeticus acer
 or retentus, illucque delatus conciuerat, intra
 os dies denato. Hunc perpetuus quidem sin-
 as, at nequaquam delirium vllum, ad vitae vf-
 extremum anxii, discruciauitque.

a) ETT.

a) ETTMULL. *oper.* T. 2. p. 565. P. SALIVS de *aff. parit.* cap. 8. CARRER. *oper. citat.* sect. 2. chap. 6. p. 494.
 b) WILLIS *De Anim. Brui. part.* 2. cap. 10. MORGAGNI *epist. anat. med.* VII. n. 14. CARRER. L. C. MICHELLE *de CONI lstor. regionas. de' mali etc.* P. I. p. 209.

D i a g n o s i s.

§. CCXV.

Signa.

Paraphrenitis primo loco (§. CCXII.) exponitur, quoniam symptoma aliorum morborum fere est, et horum praesentia, et comitatu dignosci debet. Quae vero diaphragmatis inflammationem subsequitur (§. CCXIII.), ea in primis ex respirationis laesione, et loci dolore *) innotescit, distinguiturque a phrenitide. Namque in phrenitide dolor pullans caput afficit, in paraphrenitide diaphragmatica dolor acutus praecordia torquet, et costas spurias inter, et imas dorsi vertebrae concluditur. In illa respiratio magna est, et rara, praesertim inter initia; in hac celeris, parua, inaequalis, dolorem adaugens. Praeterea dolent hypochondria, tenduntur furtim veluti retracta, abdomen inspiratione virquidquam mouetur, adeo enim eam dolor cohibet; saepe anxietas, tussis sicca, singultus, atque alia, quae pleuritici patiuntur, hic quoque super adduntur.

*) Sed melius hoc innotescet, ut arbitror, in *capite Pulmonum inflammationibus, morbisque affinis.*

Prognosis et Curatio.

§. CCXVI.

Quocunque modo paraphrenitidis vox accipitur, semper morbi grauitatem, et periculum aliportendit. Sed omnium dirissima, et maxime metuenda est, quam septi transversae inflammatione cit. Haec uti a causis, quae pleuritidem mou-

ieri solet, eundemque fere exitum habet, ac sae-
 culuma pleuritis; sic quoque curationem eandem
 exigit, quae pleuritidi, ceterisque inflammationibus
 adhiberi consuevit.

MANIA ET MELANCHOLIA.

§. CCXVII.

Haecenus de deliriis, quae febris comitatur.
 Restat modo, ut ea, quae sine febre sunt, brevissime
 explicentur. Primum venit *Μανία* *); quae com- * *Mania.*
 muni omnium sententia definitur delirium sine fe-
 bre, sed furiosum, et audax. Febris igitur defe-
 ctu a *vera phrenitide* discriminatur. Attamen non
 infrequens est, *maniae* praesertim adultae, et con-
 firmatae febrim tanquam epigenomenon superue-
 nire. In hac autem insania plures simul ideae, et
 cogitationes perturbantur, et mentem exagitant
 cum aucto virium robore, audacia, furore: quo fit,
 ut longe differens videatur a *Μελαγχολία* *), in qua * *Melancholia.*
aut alteri ideae, aut objecto tantum mens perti-
natiter adhaerens hallucinatur aberratque cum metu,
et tristitia; in reliquis vero praeclare sana, et rationis
optime compos.

§. CCXVIII.

Ad melancholiam, tamquam ad genus, spectant * *Lycan-*
ανθρωπία *), et *Κυνανθρωπία* *), in quibus me- * *stropia.*
 ancholici se lupos, aut canes putant, horumque * *Cynan-*
 animalium mores, vivendi rationem studiosissime * *stropia.*
 imitari conantur. Neque hinc sejungenda est No- * *Nostalgia.*
 -*αλγία* *), siue ingens moeror, et dolor, quo quis
 conicitur, dum a patria inuitus abesse cogitur, sum-
 moque desiderio ad suos redeundi vnice tenetur,
 et angitur. In hanc animi aegritudinem omnium
 oronissimi sunt Helvetii *), Germani, et quicun-
 que editoribus in locis degere soliti se in alienas,

humilioresque regiones vident translatos, nouosque mores, nouumque vitae, et victus genus inire debent. Tanta est eiusmodi melancholiae vis, ut milites, si quando ea corripiuntur; corripiuntur autem saepissime; nullo discrimine vitae, nulloque mortis, suppliciiue timore a defectione, et fuga deterreantur, et mori malint, quam diutius patriis laribus carere. Quam ob rem, nisi compotes voti fiant, agrypnia, moerore, aepesia, languore, anxietate, stupore, cordis palpitatione, febre lenta, et macie confecti breuissimo tempore e vita decedunt.

*) Nostalgia fortasse a *νόστος*, redeo, et *ἄλγος*, dolor. Melius *nostomaniam* vocauit HARDERVS, quasi redeundi desiderium, siue furorem. Aliis, ut ZWINGERO, placuit eam vocare *pothopatridalgiam*, a *πόθος*, desiderium, et *πάτρις*, patria, quasi diceret moerorem, aut dolorem ex desiderio patriae, item *philopatridomaniam*, *nostopatridalgiam*, *nostopatridomaniam*; quorum cuique facilis etymologia. IO. IACOBVS SCHEVCHZERVS, ut de suis ciuibz etiam hoc nomine bene mereret, conscripsit dissertationem de *nostalgia* lectu dignam, quae exstat in T. I. pag. 397. *Comment. Acad. Instit. Bononiensis*. De eodem morbo typis Basileae prodit quoque IACOBI HARDERI dissertatio absolutissima, quam consulere plurimum refert. In Diario medico, quod Venetiis edebat PETRVS ORTESCHIVS, Medicus perdoctus, et amicus noster singularis, (T. 4. p. 372.) reperitur *De Nostalgia brevis tractatio*, quam C. PELLEGRINIVS Venetus in Heluetiorum utilitatem, et commodum euulgauit; dignaque est, quae legatur, quamquam a SCHEVCHZERI opinionibus aliquantum dissentiat.

§. CCXIX.

Reliquae melancholicorum varietates, quando se aut reges, aut proceres, aut praesules iactant, aut mortuos se, aut in vasa fictilia, aut dolia conuersos credunt, aut aliquam partem sibi esse constringunt ex alia materia, quam ex ossibus, et carnibus constitam, aut cancos, ranas, serpentes intus gerere queruntur, aut alio pertinaci, et singulari mentis errore

errore insaniunt, non habent peculiare, et distinctum quoddam nomen, sed genericum tantummodo retinent melancholiae a). Verum prout ab hypochondriorum vitio, aut ab vteri affectibus originem traxerit melancholia, *hypochondriaca*, aut *hysterica* nominatur. Quarum haec si cum effreni concubitus cupiditate, et tentigine conjungitur ita, ut obuius quisque ad coeundum prouocetur, *Nymphomania* aut *Metramania* *), siue *furor uterinus* dici solet. Furori demum ex amore, qui a *nymphomania* interdum omnino differt, et virorum magis proprius est, quamquam foeminae ei obnoxiae etiam sunt, *Erotomania* nomen est **). Melancholicis etiam affectionibus adnumerant non nulli *Tarantismum*, siue *morbum saltatorium*, quia qui eo corripuntur, saltandi cupidine exardent, atque ad sonum quemdam, Apuliae populis familiarem, *tarantellam* dicunt, ad choreas incitantur, saltantque tamdiu, donec sudoribus profusissimis langueant. Sic eos curari fama est. A Tarantulae morfu morbum nasci, et nomen habere volunt cum BAGLIVIO multi. Alii cum STRAHO etiam sine ejusmodi morfu morbum huncce in Apulia, aliisque regionibus calidioribus endemium obseruari, et melancholiae hystericae, aut hypochondriacae speciem esse contendunt. At si a venenato Tarantulae morfu vere induceretur, de eo agendum esset alibi, ubi de morbis a morfibus venenatis genitis sermo habebitur. Quo etiam spectabit *hydrophobia*, siue aquae horror, et metus, qui morsum animalium rabidorum subsequitur, quamquam ad deliria, atque hallucinationes a plerisque referri soleat b).

a) Nosologi tamen hodierni singulis hisce speciebus nomina peculiaria tribuunt. Sic SAGARIVS conficit quindecim species, nempe 1. melancholiam vulgarem, 2. amatoriam, 3. religiosam, 4. argantis, 5. moriam, 6. attonitam, 7. errabundam, 8. saltantem, 9. hippanthropicam, 10.

scytharum, 11. anglicam, 12. beatificam, 13. zoanthropicam, 14. enthusiasmum, 15. phrontis. Vid. explicatio-
nes apud Sagarium, *System. morb. symptomat. Cl. XIII.*
ord. III. Gen. XX. p. 743.

*) Nymphomania deducitur a Νύμφη, sponsa, vel rectius
a Νυμφών, thalamus nuptialis, et μανία, furor. Significatio
est: furor sponfarum, siue recens nuptarum, vel deside-
rium thalami, siue viri furiosum. Sed fusius de ea, et
opportunitius, ubi de morbis mulierum. *Metramania* vero
a μήτρα, id est matrix, siue uterus, et μανία, furor ducitur.

**) Erotomania est ab ἔρως, et μανία, videlicet insania
ex amore.

b) De *Tarantismo* vid. IO. FRID. CARTHEUSERY (de
morbis endemiis pag. 44.) apud quem cuncta ad hunc mor-
bum spectantia inuenies summatim exposita. Hydropho-
bia, siue paor aquae non videtur mihi spectare ad *hallu-*
cinaciones. Est enim oesophagi et ventriculi affectio spa-
smodica, qua a potu arcentur. Neque semper cum ea
delirium, et rabies coniungitur. Vidi hydrophobos vsque
ad extremum mente constantes. De morfu canis rabidi
consuli possunt ex nuperrimis sequentia: *Benigni Canel-*
lae De Viganis Ripensis Tyrolensis dissertatio de hydropho-
bia. Oenipont. 1774. Observations sur la nature, et sur le
traitement de la rage etc. par M. PORTAL Yverdon 1779.
Compendio di notizie interessanti circa il veleno de' rabbia
animale di FELICE ASTI in Mantova 1778. Quibus addi
potest ornatissimi viri, nunc *Protomedici Vrbinaris* IO. BAPT.
FALETHI epistola ad Cl. PAVLUM BAPTISTAM BALBYM
Botoniensem: De immani quadam passione hysterica, et aqua-
fuga; ubi non nulla quoque ad hydrophobiam spectantia
disputantur. Diar. med. P. ORTESCHI ann. 1766. p. 196.

§. CCXX.

Melancholia
et Mania
saepe se mu-
tuo exci-
piunt.

Etsi vero melancholiam, et maniam, deliri-
modo, et gradu differre inter se (§. CCXVII.) non
inepte scripserim, haud tamen dissimulandum est,
affines inter se natura esse hosce affectus, vt, WIL-
LISIO, MORGAGNIO a), aliisque adnotantibus, sae-
pe vices commutent, atque alteruter in alterutrum
transeat. Quae vicissitudines in causa saepe sunt,
vt Medicus ob taciturnitatem, et metum, aut lo-
quaci-

quacitatem, et audaciam in eodem aegro identidem alternantem, dubius, ancepsque haereat, vtrum melancholicum, an maniacum declarare eum debeat. Vtraque autem aegrotatio diuiditur in *primariam*, quae scilicet sine vilo corporis morbo, sed cerebri tantum vitio fit, et in *secundariam*, quae a sanguinis totius deprauata diathesi, aut a viscerum quorundam laesa functione proficiscitur.

a) Vid. *Epist. anat. med. VIII. n. I.*

§. CCXXI.

Causae etiam vtrique malo fere communes esse solent. *Mania* proxime oriri videtur ex ea cerebri constitutione, in qua tanta idearum perturbatio contingit, vt furor, et audacia, et virium muscularium augmentum consequatur. *Melancholia* vero ab eo cerebri statu, qui vnam, vel alteram ideam animo pertinaciter exhibeat, quam remouere pro libito haud liceat, quaeque iudicandi recte facultatem laedat, imo metum, moeroremque plerumque incutiat. Paulo remotius huiusmodi mentis perturbationes efficiunt vel vitia solitis cerebri partibus innata, aut adfita, vel toti corpori, et in primis vniuersae humorum massae inhaerentia, vel in aliquo a capite quamuis diffuso viscere, aliaue sede locata. Ad priora, vt ex anatome maniacorum, aut melancholicorum didicimus, pertinent corticalis, vel medullaris cerebri substantiae ficitas, durities, vel contra laxitas, mollities, atque humiditas nimia; corporis callosi, vel medullae oblongatae, vel glandulae pinealis vitiata compages; ventriculi aqua repleti; vasa atro cruore turgida, et distenta; meningis tensae, aut laxae, aut corruptae, aut sero sanguineo suffusae; polypi in sinibus durae matris, aut lapilli, aliaque laesionum genera; quamquam horum pleraque in aliis etiam capitis morbis saepe

deprehensa sint, neque in quavis mania, et melancholia reperiri soleant. Quo mala etiam cranii conformatio, aut tumores quicumque, etiam externi *), et prava cerebri dispositio nativa, hereditaria, aut acquisita, ictusque spectare videntur. Posteriorum classem constituunt omnia, quae humores condensant, et cogunt, quae subtiliorem eorum partem disperdunt, aut crasin ipsam corrumpunt, et resolvunt, ut liquorum fermentatorum, aut spirituum ardentium abusus; frequens ebrietas; venus nimia; aer calidus, et siccus; insolatio; studia immodica; graviora animi pathemata, ira in primis, et moeror; profundae meditationes; amor insanus; ambitio honorum, et dignitatum immoderata, aut spes frustrata; terror ingens, et subitaneus **); funestii, et repentini nuntii; quorum multa etiam sine alia humorum labe ita sensorium commune subvertere possunt, aut nervos, nervorumque principium sic labefactare, ut huiusmodi morbi facile enascantur. Itemque ea, quae plethoram inducunt, et cerebrum versus humores prouocant, aut acrem sanguini imprimunt dyscrasiam, ut euacuationes sanguinis, ichoris, scabiei, haemorrhoidum, mensium suppressae; scorbutica, venerea, arthritica, podagrica, aut febrilis, et morbida ***)) materies ad cerebrum tracta; diuturna hypochondriaca, aut hysterica affectio; atra bilis in visceribus abdominis defixa, etque irritans, vel inde dimota, soluta, et in circuitum rapta; saburra biliosa; melancholica diathesis; obstructions imi ventris; acria quaecunque retenta; temperamentum sanguineum, cholicum, aut atrabile, et similia.

*) Maniam a tumore externo *super sinistro bregmatis* esse in confiniis *futurae lambdoidis*, et *sagittalis* nato probabiliter profectam memorat FRIDERICVS GABR. GOTTLIEB SIERNVS (*Collect. Societ. Medic. Haunniens. vol. I.*

p. 86.), eoque ad suppurationem perducto, atque inciso Manatam.

**) Interdum ita vehementi terrore afficitur sensorium commune, ut talis in eo excitetur idea, quae nullo postea modo deleri possit; ideoque nihil cogitur, nisi hoc unicum ab inuitis etiam, et reluctans, in quo pessima melancholiae species sita videtur. SWIETEN §. 1108.

***) Non solum materia febrilis non satis emendata, aut imperfecte expulsa maniam procreat, nam saepe diuturnas febres intermittentes hoc malum subsequitur; verum etiam quaecumque morbida materia, quae excernenda fuisset, retenta, et relicta. Imo idem praestat fortasse secretio ipsa lactis quandoque impedita, nedum lac ipsum corruptum, et repressum.

§. CCXXII.

Maniam vero frequentius ortam ex scabie, herpetibus, impetigine, aliisque cutaneis morbis exsiccatis, aut improvide repressis; ex Plica polonica recisa; ex tempestate nimium calente, aut contra perfrigida; ex copia, stagnatione, et corruptione feminis, seminaliumque humorum, quos *aphrodisios* vocant, docent medicae historiae. Sed prae hisce omnibus subitam, acutamque maniam inferunt hyoscyami, et stramonii, siue daturae semina, et radices, baccae solani furiosi, siue belladonnae, cicuta aquatica Wepferi, aliaeque fortasse plantae venenatae bene multae, et praecipue quaedam fungorum, siue boletorum genera. His non nulli addunt morsus venenatos quorundam animalium, in primis rabidorum.

Maniae frequenter causa.

Plantae venenatae, et causae.

Diagnosis.

§. CCXXIII.

Diagnosis delirii vtriusque, tam maniaci, quam melancholici, ejusque specierum, et varietatum ex illis, quae jam (§§. CCXVII. ad CCXX.) exposita fuer, facili negotio eruitur. Sed potissimum ad ea,

Melancholiae quinam magis obnoxii?

quae antecefferunt, animum aduertere oportet, quorum paullo ante, causas recensentes, mentionem fecimus. Hinc scire oportet melancholicum magis obnoxios esse, ut supra (§§. CCXXI. CCXXII) indicauimus, eos, qui malo hypochondriaco, aut hysterico diu conflictantur, qui viscerum abdominalium vitiis, praesertim scirrhis laborant, qui salutaribus sanguinis fluxibus consuetis carent, qui curis molestis anguntur, qui immodicis desideriis indulgent, qui ex parentibus nati sunt melancholici, quique sanguine crasso, et viscido abundant, et ad cerebrum variis ex causis vberius, quam par est, eum alliciunt, et congerunt. Melancholiam vero

Signa imminuentis melancholiae.

ipsam appropinquare commonstrant tristitia, metus, et diutinae vigiliae, atque hominum consuetudinis odium. Paullatim increfcit luctus, et lacrymae saepe funduntur, quamquam non nullis etiam perpetuus, aut facilis risus accedat. Omnes autem vanis, intentisque cogitationibus distinentur, adeo ut per saepe defixis humi oculis veluti stupidi haereant, vel subito falsis imaginibus quodammodo excitati celeriter, suspiriis emissis, procedant, et morveantur. Inualecente vero jam morbo hominum

Praesentis jam melancholiae.

conspectum, et conuentus fugiunt, solitaria loca quaeritant, ibi quasi occultati, et suis phantasmatibus occupati, taciturni, et desidiosi vitam transigunt. Qui grauius laborant, se vel pecudes, vel deos, vel defunctos, vel fragili ex materia constantes credunt; quare alii canum latratum, aut lupo- rum ejulatum, aut gallinarum cantum voce imitantur, vel, utpote mortui, cibos, et potus recusant, alii occurrentibus cedunt, veriti, ne diffringantur. Alii praeterea in iram leui ex causa propendunt, valde instabiles, et saepe de minimis, ridiculisque rebus solliciti; modo liberales, et prodigi, modo tenaces, et auari, et modo mortem vehementer

perti-

vertimescunt, modo, quod mirum, in desperationem delapsi violentas sibi manus inferunt. Contra maniam imminere praefagiunt per uigilium contumax, cephalalgia, aurium tinnitus, risus insolitus, ut insolita, et praeter consuetudinem ad irascendum rocliuitas, et morositas. Vbi jam mania se exse-
cit, oculi rubent, palpebrae creberrimis motibus gitantur, et sic affecti loquaces, litigiosi, furentes omnia clamoribus complent, toruo adspectu, ac trui minantur, aucto virium robore praepollentes in uosuis adstantes impetum facile faciunt. Vtrique
ue melancholici, siue maniacy, anxii esse solent, vi-
gilant, frigoris, aeris, tempestatis inclementiam in-
noxie sustinent, et, nisi vi contineantur, e fenestris
se praecipites dant, aut in puteos, flumina, lacus-
demergunt, aut aliter sibi mortem consciscere
tentant. Quum ab hypochondriis malum fit, facies
allet; extrema frigent; cordis palpitatio frequens,
praecordiorum anxietas crebro accedit; respira-
tio profunda, atque intercisa est; caput dolet; venter
ignescit; intestina obmurmurant; flatus attollun-
tur; ructu, aut vomitu aliquid ejicitur, quod sa-
pore acido, aut amaro mordicat; appetitus modo
igit, modo deficit; pulsus rari, tardi, aut inae-
uales, et languidi, aut mirifice varii deprehendun-
tur. Vbi vero ab vtero, aut ab hysterica passione
at, praefocaciones; mensium inordinata, aut defi-
ens excretio; fluor albus; vrinae aquae, copio-
se; tenesmus vesicae, stranguriae, ischuriae; pol-
tiones, tentigo; hypogastrii, ouariorum, vteriu-
umores multiformes, dolores, inflationesque se-
rodunt. Similia autem contingunt quoque hy-
pochondriacis, interdum ex sola neruorum sensibi-
ori mobilitate. Reliquarum cognitio differentia-
um, itemque caussarum, quae eas gignunt, par-

*Maniae fu-
turae indi-
cia.*

*Signa veri-
usque deli-
rii commu-
nia.*

*Signa ejus,
quod ab hy-
pochondriis
est.*

*Signa ejus,
quod ab
vtero fit.*

*Reliquarum
specierum
diagnos.*

tim ex signis supra recensitis, partim ex animi petatur.

P r o g n o s i s.

§. CCXXIV.

*Hereditaria
vix curabi-
lis.*

*Item prima-
ria.*

*Secundaria
curabilior.*

*Tutior quae
cum risu,
quam cum
moerore.*

*Quae em-
cuationes
salutares.*

*Hippocratis
praesagia.*

In vniuersum omnes insaniae difficulter curantur. *Hereditaria*, aut a vitiosa cerebri constitutione oriens, vix spem aliquam relinquit, et si quando conquiescit, facile recidiua fit. Difficilis pariter curatio est *primaria*, quae nimirum a phantasiae, mentisque errore sine alio corporis vitio pendet; nam librum intimae cerebri fabricae aliquam significationem contra *secundaria*, quam suppressae euacuationes, errata in victus ratione, aut morbidus corporis habitus intulerunt, frequentius arte, et temporis opem resipiscit. Tutior ea est, quae cum risu, et laetitia, quam quae cum studio, et moerore coniungitur; recens item curatur interdum, vix vnquam inueterata. Plerumque sanitatem exspectare licet a narium haemorrhagia, ab haemorrhoidum, catameniorum fluxu redeunte, aut reuocato, ab alui profluuiio, a varicibus crurum, ab aqua inter cute, a scabie, a quartana, aliisque intermittentibus febribus, abscessu, ab aëris, tempestatis, regionis, aetatisque mutatione. Huc pertinent non nulla HIPPOCRATIS praesagia: *'Insanientibus si varices, aut haemorrhoides superuenerint, insania solutio fit a)*. *Ab insania dysenteria, aut hydropsi, aut mentis emotio, bonum b)*. *Dolor ad pedes, et pectus subiens, aut vehemens tussis oborta, insania soluit c)*. *Si insania solvatur absque dolore ad pedes, vel ad pectus, aut tussi vehementi, caecitas sequitur*. Ulcera vero in facie, aut pedibus orta vix aliquando boni, nihil vero amissa prorsus appetentia pollicentur. Contra bene sperare iubent herpes, et serpiginis alicubi efflorescentes; nihil enim magis cerebri morbum

orbos leuat, quam huiusmodi acrimoniae ad exteriora translatio.

a) *Aph.* 21. *sect.* VI. b) *Aph.* 5. *sect.* VII. c) *De*
diac. 65. d) *Ibid.*

§. CCXXV.

Melancholia hypochondriaca, aut hysterica reli- *Hypochon-*
tis longe facillior curatu esse consuevit. Hac af- *driaca, et*
fectis saepe nigra per aluum ad iudicationem prode- *hysterica fe-*
cit a). Saepius viros, et praecipue seniores affli-
git; rarius foeminas, sed in his pertinacior, dete-
riorque est. Interdum melancholia in epilepsiam,
rursus epilepsia in melancholiam vertitur. In- *Successiones.*
terdum excipitur a continua amentia, a conuulsio-
nibus, ab apoplexia. In vehementi, et furiosa men- *Signa pra-*
tis emotione, accedentes tremores exitio sunt, inquit
Auctor Coacarum b); item dentium collisio, aut stridor
praeter consuetudinem c), aut dentium reficatio
perniciem denotat d). Mors instat, si coma, epilep-
sia, aut virium lapsus superuenerit. Somnus, sed *Somnus*
placidus, plerumque insanientibus quibuscunque *quando boni*
remedio, aut solatio est. Non vero cuilibet mor- *ominis.*
bi remissioni fidere conuenit; nam cito, et inopi-
nato exasperatur.

a) *Coac.* N. 486. b) *Num.* 93. et *Praed.* I. 14.
c) *Coac.* N. 235. d) *Ibid.*

C u r a t i o.

§. CCXXVI.

In omni mania, et melancholia, et praecipue in *Regimen*
ea, quae ab ideis perturbatis, *diaceticum.*
deprauatione magis, quam corporis vitio dependet,
loci, et vitae mutatio pernecessaria est. Peregrina-
tione enim, corporis motu, et noua obsectorum
subinde exhibitione, nouisque successiue rerum ima-
ginibus, atque impressionibus falsae, inordinataeque,
aut fixae idearum species paullatim delentur, aut in
ordinem, quo par est, rediguntur. Remouenda
quippe

*Nostalgia
in primis.*

quippe ea omnia sunt, quibus aegrotans ad amorem, vel iram, vel odium, vel moerorem fuit accitatus, imo ludis, cantu, concentibus musicis, jucundisque amicorum colloquiis ad hilaritatem eliciatur. Idque in primis melancholicis saluter est. *Nostalgia* praeterea aërem puriorem, loca tiora, victus rationem ad morem patrium commutatam, et demum in patriam reditum, qui omnia reliqua auxilia vincit, expostulat.

§. CCXXVII.

*Sanguinis
missio.*

Cathartica.

Sanguinis missio saepius maniacis, quam melancholicis, opportuna est; tumque potissimum, cum plethora, aut suppressa aliqua sanguinis euacuatio, aut aëris feruor, aut vini potus causam morbo dederit. Venae jugulares, aut vena frontis, imo arteriae temporum hic vtilissime incidi solent. Praestat insuper aluum soluere, medicamentis ad certum intervalla repetitis, in sanguineo, biliosoque temperamento mitioribus; acrioribus, validioribus, in pituitoso, aut melancholico, inter quae hucusque niger, ejusque extractum celebratur.

§. CCXXVIII.

*Quae Mvtzellio
beneficet cura-
tio.*

Cl. MVTZELLIVS a) melancholiam ex moerore, vita deside, et vitio viscerum in hypochondriis fixarum, pluries feliciter expugnauit, data singulis diebus potione, quae habet tartari tartarifati semunciam, extracti centaurei minoris drachmas duas, aquae fontanae uncias octo. Quando amara respuantur, extracti loco tantum mellis despumati, quantum opus esse videretur, substituebat. His autem omnibus interponebat subinde laxantia aluum. Non modo melancholiam hac methodo, sed maniam ipsam radicitus pluries extirpatam narrat. enimvero humor atrabilaris soluitur, emendatur, ejiciturque.

Comm. de reb. in M. et Sc. nat. gest. Vol. 4. pag. 92.
 179.

§. CCXXIX.

In maniacis temperamento feruidiore, aetate juvenili, bono habitu, exercitatis, et rebus calefacientibus deditis aëscencia quaeque, quin acida etiam fortiora, quibus sanguinis aestus, tenuitas, alina acritas, nimius nervorum sensus, nimiaque rarum irritabilitas refrenantur, vñui sunt praetentissimo. Quo nomine etiam frigidae potus sumopere commendatur. Acetum destillatum, in calente soluta sit ad drachmam dimidiam sacari, et gummi arabici ope, deinde aqua florum ambuci diluta camphora, multis verbis celebravit *Quando acida conveniant.* *Aquae frigidae potus. Camphorae eximia virtus.* *BOCHERVS*, et post eum alii a). Et sola camphora, sed aucta sensim ejus dosi ad drachmam, ultrae in die curatas manias, quae cetera remedia eluant, commemorant medicae historiae b). At petitis periculis comperi, interdum ab ejus usu maniacos, qui videbantur aliquantum pacati, quoscunque camphoram resumerent, iterum excaecasse, atque in furorem actos fuisse; fortasse quia in cordis, sanguinisque motum incitat, et calorem, quo humorum omnium expansionem adauget. Hoc casu fortasse tolerabilior ejus vsus reddetur, si in aceto permixta, et soluta propinetur. Quare *Melancholici videntur.* n potius melancholicis adjumento esse, et torrens quasi stupentibus, cum pulsu parvo, raro, et *At MVTZELLIVS* stupore melancholici laboranti camphorae semunciam quotidie per hebdomadas c) dedit frustra. Tanta saepe est horum inuincibilium complicatio, et circumstantum varietas, vt remedia vel praestantiora haud per respondeant; imo contrarios quandoque actus pariant. Si quid vero hac super re licet pro-

Camphorae proferre, camphoram tum prodesse equidem *aprior usus.* diderim, cum *sensibilitas nervæ* tantummodo videtur excedere, non autem irritabilitas: nocere, irritam esse, vbi illa languet, et torpet, aut nimia est, et vasa non satis depleta. Camphora enim *sensibilitatem* certo imminuit; auget vero *stabilitatem*, et sanguinis d) feruorem.

a) LOCHER. *Observas. Practic. circa Lucm venæ.* quæ et maniam etc. Vienn. 1762. p. 57. et seqq. ORTIS *Giornal. Med.* 1765. p. 10. Vtebatur autem LOCHER hac formula: Rec. Camphor. drachm. semis, *sambuc. canar., mucilag. gummi. arabic. an. drachm. j.* Huius in mortar. marmor. trit. add. acet. calid. unc. semis, *sambuc. unc. vj. syr. flor. pap. rhœad. unc. j.* M. b) DAVY KINNEIR in libro inscripto: *Saggio delle Trasferenze Filosofiche di TOMMASO DERHAM* Vol. 4. p. 90. et JOH. GRAEN *Prax. med. reformat.* p. 132. HOFFMANN *Med. stem. T. IV. pars. IV. cap. VIII. observ.* 8. ORTESCHI *Giorn. Med. T. 2. ann. 1763. p. 373.* DALL'ARNE *Sagg. di Medic. Practic. P. 2. observ.* 13. c. 14. BOENNEKEN in *Colleg. Francon. etc. vol. V. P. 28. p. 294. et in Comment. de M. et Sc. nat. gest. vol. XI. p. 525.* c) *Comment. de vol. IV. pars. 1. pag. 93.* d) Vid. *Theses de Camphora ejusque virib. a SEBAST. SEVERIO in Gymnas. Ticinens. pug. an. 1776. et BASSIAN. CARMINATI De animalibus mephitisib., et nox. halitib. interitu etc. l. 3. cap. 3. p. 17.*

§. CCXXX.

Bahma tepida.

Maniacorum furor, et audax temeritas per balneis tepidis, quæ humectant, laxant, perturbationem adjuvant, atque efficacissime a capite tollunt, domatur, et cohibetur. Neque id auxilium melancholicis minus prospere cedit, quod eo tempore corpus ita mutatur, ut etiam in sensorio contenta pertinax illa, et fixa fibrarum inflexio, a qua phantasmata quaedam idearum simulacra animo repræsentantur, tandem, ut ita dicam, relaxata quodammodo complanentur, deleaturque. Id autem citius certius præstatur, si, dum totum corpus tepore

Scilicet aquæ frigidae in capite.

remollescit, et meabile redditur, aqua frigida super in caput derafum destillet. Legenda est storia Maniae cum priapismo, quam ejusmodi ratione curavit D. DE MONCHAV *a)*. De Maniae hy- *Frigida capi-
piis applica-
ta.*
pericae pari curatione per balneum octo horas fin-
dis diebus iteratum, et per assiduam linteorum
qua frigida madentium capiti applicationem, quae
perne incredibilis videtur, a Cl. POMMIO pera-
ta, ut rara, et mirabili mentionem faciendam in
io Diario medico *b)* censuit ORTESCHIVS, doctus
ne vir, et nuper immatura morte nobis ereptus.
sed multo prius per largum aquae gelidissimae po- *Frigidissi-
mae potus.*
tum, et capitis bis, vel ter in die iteratas adspersio-
nes curatos maniacos legimus a docto, expertoque
Medico Cremonensi, nobis amicissimo, MARTINO
HISIO *c)*.

a) ORTESCHI *Giornal. Med. T. 4. p. 105.* *b)* *Id. ib.*
2. p. 412. *c)* *Lettere Mediche, Lett. 1. p. 24. et seqq.*

§. CCXXXI.

Non modo autem frigidissima caput irrorari ma- *Balnea fri-
gida.*
nibus maximo est emolumento, verum etiam vni-
versum corpus in balneum frigidum demergi *a)*, id-
ue in primis fuit illis, qui robore, et aetate flo-
rentes, plethorici, feruidissima aestate, post immo-
rum vini meracioris potum in maniam inciderunt.
empla, quae id satis comprobent, exstant apud
DIETENIVM *b)*, aliosque, quos quisque pro libi-
to poterit consulere. Sed memoratu dignum est
etiam, quod Medicus, et Geometra longe clarus,
FRANCO MICHELLOTTIVS conterraneus meus de
Adami juuene reliquit; qui, cum iter mari faciens
sub solis ardori diu objecisset, seque vino intem-
peranter repleuisset, acutissima mania correptus est,
que ab ea largis sanguinis missionibus, tenuissimo
usu, potu aquae gelidae, ejusdem etiam in caput proje-

projectione, et simul frigidis balneis, suadente, et jubente ita eodem doctissimo viro, felicissime liber c) euasit.

a) MEAD. *De venen.* p. 139. et 140. b) *Comment.* BOERHAAV. §. 1127. Vid. etiam ORTESCHI, *Giorn. med.* T. 4. p. 124. WILLIS. *Parthol. cap. X.* c) *Hist. de l'Acad. des Scienc. ann. 1734.*

§. CCXXXII.

Opii usus. De opii effectibus in mania, et melancholia non conuenit inter Auctores. Quidam opium summae utilitatis esse praedicant; alii narcotica quaeque vituperant, et maxime noxia affirmant. Non dubito, quin vtrique experientia duce loquantur: sed quam difficilis, et rara est verae experientiae ratio! Celeber maniacorum curationibus Medicus, sicut apposite animaduertit SWIETENIUS a), opii duo grana mane, et totidem vesperi maniacis dabat, et si somnus non sequeretur, augebat paulatim dosin, donec optato effectu potiretur. Et reapse nihil utilius, praestantiusque inueni, post necessarias euacuationes, refractasque aliquantum aegri vires, ad vigilias arcendas, et nimiam sensibilitatem, morbisque perturbationem sedandam, componendamque, quam opium, cuius etsi magnas etiam doses maniacis sine noxa interdum ferri, magister vix peries demonstrauit, nolim tamen, nisi prudenti experimento, et iustis primum dosibus tentatis, et largiores, atque insolitas quis progredi audeat. Ut enim interdum in peculiari idiosyncrasia, quibusdamque aegrotantium constitutionibus calor, motum sanguinis, faciei ruborem, vigilias, et corporis iactationes adauget, sic quandoque in aliis bus praeter expectationem, et consuetudinem etiam gua etiam dosi veterum inducit mortiferum. Nemo ergo inconsulto, et temere hoc, alioquin utilissimum

*Cautelae in
usu somni-
ferorum.*

adimento vti licet. Quare non nullis mos est a papaueris albi nostratis praeparationibus primum incipere, et, prout res postulauerit, deinde ad cautum, et prudentem opii vsum transire. Tutius ejus extractum gummofum*) a virosa, et noxia resina segregatum recentioribus habetur. Ceterum MEADIVS ipse b), quanquam non valde somniferis amicus, his tamen vtendum esse concedit, quando aegri aut ingenti terrore agitantur, aut peruigilio consumuntur.

a) L. c. §. II27.

*) Opium constat ex duabus partibus, gummofa vna, resinosa altera. In resinosa infidet vis quaedam virosa, stupefaciens, et nervis noxia; in gummofa facultas anodyna, et sedans, et blande somnifera. BEAUMAEVS excogitauit enchirelin, qua gummofam resinosa exueret, opiumque sic haberet multo praestantius: sed ejus processus cum longissimo tempore egeat, vix vllus est, qui hujusmodi extractum, vt vocant, paratum in officinis apud nos habeat. Quare gratiae habendae sunt Cl. BVCQVETO, qui (*Mémoire de la Société Royale de Médecine Vol. I. p. 403.*) rationem longe faciliorem, quam illa BEAUMAEI est, parandi extractum opii gummofum tradidit. Inditur in mortario opium, et teritur leuiter. Tum affunditur aqua frigidissima, et iterum conteritur, vt aqua colore imbuatur. Colorem sic aqua, vt chymici loquuntur, decantatur. Residuum opio noua affunditur, idque iteratur, donec aqua non magis coloretur. Aquae sic eductae, et percolatae leni calore euaporentur. Quod in fundo remanet, est extractum gummofum parte virosa, et narcotica exutum.

B) *Monis, et Praecept. med. cap. 3. p. 51. ed. Londin*

§. CCXXXIII.

Inter sedantia, somnumque inducentia nostra *Extractum hyoscyami.* etate celebrari coeptum est hyoscyami extractum, siue rectius succus leni igne condensatus, et concretus, tamquam efficax, excellensque remedium in maniacis, melancholicisque deliriis. ad GREDINGIVS sex et viginti de eo accuratissime

tissime factis periclitationibus, et scripto fideliter traditis non modo sibi, verum aliis etiam bene multis persuasit, *hyoscyamum nec tuto posse exhiberi usu interno hominibus, nec remedium esse in melancholicis et maniacis morbis, ut quibusdam videtur, saluterum a).*

a) *Aduers. Med. Practic.* LUDWIG. P. I. p. 71.

§. CCXXXIV.

Moschus. Quibus opii usus non arridet, aut non satis bene respondet, aut extractum hyoscyami suspectae, accipitisque facultatis est, hi moscho eundem in finem uti poterunt. Diaphoresin enim blandissime mouet, et somnum arcessit; hinc in mania tamquam resoluens, atque anodynum pharmacum a) adhibetur utiliter. Homini *erotomania* laboranti moschum cinnabari junctum magno adjumento fuisse, ex WALLII, et LOCHERI observationibus b) accepimus. Maniacum annum agentem quadragesimum puluere Tunquinesi, qui ex granis sedecim optimi moschi, et cinnabaris natiuae, atque antimoniales, cujusque granis duodecim constat, bis dato curauit Cl. SEBASTIANVS c). Nec minori cum fructu maniaco cuidam moschi quinque et viginti grana *pro una dosi* data narrantur a BROOKSIO in suo *Dispensatorio generali* d). Duo autem in moscho adhibendo sunt probe obseruanda, vix nimirum liberaliori manu detur, et nitro, aliisque temperantibus vis ejus calefaciens mitigetur. Alio aut nihil boni praestat, aut permolestam agitationem, aestuationemque inducit.

Pulvis Tunquensis.

a) LANGE *Miscell. verit. fasc. I. p. 98.* b) *Transil. Philosoph. n. 474.* LOCHER. *Oper. cit. p. 62.* HAARTMAN *Act. Acad. Reg. Scient. Suecic. Vol. XXIII. p. 267.* c) *Act. Acad. Elect. Mogunt. T. 2. p. 483.* d) LUDWIG. *Com. de reb. in Med. et scient. nar. gestis. Vol. V. pag. 425.*

§. CCXXXV.

Nymphomania, sicut etiam in viris furor cum *Nymphomania, et sasyriasis.* satyriasi *), oppugnari solet sanguinis missione iterata, catharticis, potu aqueo cum nitro, balneis potissimum frigidis, fotibus ejusdem naturae assidue applicitis, victu herbaceo, et parco, et tandem, ubi licuerit, connubio; quod valentius sane, et certius praesidium est: quamquam furorem vterinum viderim etiam in foeminis viro strenuo nuptis, qui per aliquot hebdomadas, imo menses pertinax eadem vehementer torset, nec destitit, donec vtero tandem conceperint. Interdum vero veneris stimulo furentes oportuit inedia, objurgationibus, flagrisque ad verecundiam, continentiamque reducere.

*) Tentigo, siue erectio veretri sine rei venereae appetitu dicitur proprie *priapismus*, cum rei venereae desiderio ardenti, *sasyriasis*.

§. CCXXXVI.

Adolescens maniacum sanguinis missionibus repetitis, catharticis, balneis tepidis, frigida capitis irroratione, sero lactis, camphora; qua tamen in maiorem furorem, iteratis experimentis, eum agi comperi; nitro, lacte ex seminibus frigidis expresso, et remediis opium habentibus diu frustra vexatum, tandem pristinae restitui integritati, postquam detexti causam, ex qua morbus ortus erat, nempe impetiginem, cui jamdiu obnoxius fuerat, retropulsam. Tum autem ei dedi *aethiopem antimoniatis.* bis quotidie ad quadraginta, et ultra dies, quo non modo ipse paullatim resipuit, sed impetigo etiam veterem metacarpi vnius manus sedem reuocata; valetque perbelle in hanc usque diem, septimo anno labente. Memoranda quoque hic est curatio maniae chronicae, quam SCHLICHTINGIUS cogitavit, atque ad optimum finem a) perduxit.

Ptyalismus per mercuriales lixiv. Rasum caput linimento mercuriali bis in dies singulos perfricandum curavit, donec ptyalismus moreretur, quo aegrotans perfecte sanatus fuit. Et

Inoculatio scabiei. MVTZELLIVS melancholiam, quae in stuporem summum degenerauerat, nulli cedentem remedio, scabiei inoculatione, raro sane exemplo, feliciter tandem b) fustulit, et propulsavit.

a) *Nov. Act. Physic. Med. Acad. N. C. T. I. p. 346.* b) *ORTESCHI Giornale Med. an. 1762. N. 28.*

§. CCXXXVII.

Sanguis asininus. Quae jactantur de sanguine asinino e venis collae aut aurium extracto, et linteis excepto, deinde aqua florum hyperici soluto, et expresso cum aceti tantillo, aut sine eo etiam, Maniacis propinando, veluti specifico antidoto, vetularum magis, quam medicorum rationalium (venia FRID. HOFFMANNA), et BOENNECKENII b) dixerim) fidem videntur me-

Abscissio testiculorum. TAVDIVS c) proponit, saccharique saturni a duobus ad octo grana usum, ut furor compescatur, quem idem cl. vir magni facit, alteram ut crudelem, et periculi non expertem, alteram ut venenum lente interficiens proscribimus.

a) *Med. Syst. T. IV. P. 4. cap. VIII. §. 23.* b) *Bigg casuum medic. etc. 1744., et ORTESCH. Giorn. med. T. 2. p. 158.* c) *Précis de méd. L. I. sect. 2. p. 206. edit. 1766. Paris.*

§. CCXXXVIII.

Emetica, et oleosa quando conne- niant. Quando ab ingestis venenatis (§. CCXXII.) furor inductus est, et cito ejus causa cognoscitur, properandum est ad emetica, ad oleosa, et pinguis cum aqua tepida remixta, ut celerrime fursum, deorsumque excutiat. Enemata etiam laxantia iterato subter data, ut quidquid intestinis altius inheret, subtrahatur, plurimum boni praestabunt. *La item*

item affatim potum veneni, praesertim caustici, acti-
tatem egregie demulcere aptum est. Sed nihil effi-
caci^{Acida vene-}us ad hoc veneni, praesertim si e vegetabilibus^{nata} sit, genus infringendum contemperandumque, vbi^{tabilium vim} temperant.
jam in sanguinem irrepere inceperit, nouimus, quam
acida vegetabilia, et praesertim acetum purum, aut
aqua dilutum.

§. CCXXXIX.

Victus ratio omnibus insanientibus esse debet ex-^{Dietā.}
quisita, maniacis paullo tenuior, melancholicis non
ita. His vero vini aliquid identidem permitti pot-
est, quo timor, et moeror propulsetur. Sed illud
maxime curandum est, ne furor, aut desperatio ae-
gros perdat. Quare diligentissime eos custodire, et
vinculis etiam, si res vrgeat, continere oportet;
imo et nunc humaniter monere, et hortari, et ver-
bis delinire, nunc increpare, et seuerius ad obedi-
tiam, officiumque compellere. Melancholicis saepe
remedio fuit subita vehementior animi commo-
tio, qua debebatur pertinax, et fixa idea, siue cogi-
tatio, circa quam mens oberrabat. Hinc modo
fraude aliqua error mentis emendandus, modo vno,
modo alio strategemate, prout e re videbitur, sic
utendum, ut resipiscant *).

*) Apud Gallos magno in pretio habetur liber *De Me-
lancholia, et morbis melancholicis* a Cl. ANNAEO CAROLO
LORRYO Parisiis ann. 1765. editus, quem etiam consulere
non erit inutile.

F A T V I T A S.

§. CCXL.

Superest, quemadmodum supra polliciti sumus,
ut aliquid de *fatuitate* dicatur, quam Graeci Μώρω- * *Morofin.*
riv*, aut Μώριαν * vocant. In hac homo nec fu- * *Morian.*
it, nec moeret, nec pauet, nec angitur, nec agryp-
nia consumitur; sed imbecilla est tum mente, tum

memoria, sic vt hebes, et rationis expertis nugis, jociſque vt infans delectetur, inania, et ludicra infectetur, neque ſibi, neque aliis inſenſus ſit. A reliquis igitur inſaniis, quas haecenus explanauimus, diſtinguitur, quod ſit ex communi medicorum ſententia *debilitas, aut abolitio operationum intellectus, et memoriae abſque illo furore, et motu corporis inordinato a), aut metu, aut moerore, aut febre.* Non nullis *ſatuitas, et amentia* ſynonyma ſunt. Vide-
 * *Ania.* tur tamen amentia, ſiue *ãvoia* *, ſummus ſatuitatis gradus, in quo nimirum omne rationis lumen, omniſque imaginationis vis deleta, aut prorſus obſta-
 ta b) appareat. Quoniam vero huiusmodi mentis imbecillitas a cauſſa, quæ auferri plerumque nequit, puta capitis malâ conformatione, cerebri labefactata, aut indurata compage, aut alio quopiam inuincibili ejuſdem vitio, ſæpe ab ortu ipſo, non raro a morbis prægreſſis deriuante, dimanat; idcirco vix locum in morbis, qui ſub medicinae poteſtatem cadunt, inueniri poteſt. Fatuos enim, atque amentes ſanare quis ſperet?

a) CALDAN. *Inſt. Pathol.* §. 303. b) VOGEL. *op. cit.* §. 750.

INSTITVTIONVM
M E D I C I N A E
P R A C T I C A E

VOL. III. PARS ALTERA.

THE
HISTORICAL
AND
GEOGRAPHICAL
DESCRIPTION
OF THE
COUNTY OF
SURREY

BY
JOHN H. COLEMAN

PARS ALTERA.

CAPVT VIII.

DE NERVORVM DISTENTIONE, ET RIGORE.

§. CCXLI.

Ab animalium functionum, atque interiorum sensuum laesionibus, motusque voluntarii vitiis, de quibus haecenus actum est, ad morbos, qui in aucto animali motu continentur, gradum facinus. Itaque si pars aliqua, aut vniuersum corpus modo contrahitur, modo laxatur, motibusque alternis, atque insolitis praeter voluntatis assensum, aturaeque ordinem concutitur; *motu clonico* *, siue ^{*A κλονος*} *convulsio*, aut, vt verbis latinissimi c. CELSI vtat, ^{*graeca voce,*} *eruerum distentione* a) laborare dicitur. Si vero ^{*quae motum inordinatum*} *indatur*, et rigeat, nulla intercedente relaxatione, ^{*senat.*} *etque constanti, et vehementi musculorum flexionum, aut extendentium, aut aliorum quorumque flexione fiat, motum tonicum* *, et *σπασμὸν* **, vt ^{*A τίνος*} *iraeci vocant, vel, vt Latini, conductionem, et nervorum rigorem* b) esse tradunt Pathologi. ^{*nempe, contentio.*} ^{*** Spasmus.*}

a) L. 3. cap. 23. p. 172. ed. Comin. b) Id. l. 4. cap. 25. ed. Comin. COEL. AVRELIAN. Acur. morb. l. 3. p. 71.

§. CCXLII.

Ad primum genus (§. CCXLI.) referri debent *Ad primum* *alepsia*, de qua infra aliquanto fufius, motus con- ^{*genus qui spectant*} *ulsi vagi, conuulsiones tam hystericae, quam hy-* ^{*morbis.*} *ochondriacae, et chorea sancti Viti, siue scelotyr-*

be SAVVAGESII, quae alterna est, atque inordinata crurum, pedum, et quandoque manuum simul commotio, et quasi resilitio, siue potius trepidulum contra voluntatem, inconcinnumque saltationis, atque gesticationis quoddam genus, quandoque cum mentis obfuscatione, et vocis, et loquelae impedimento conjunctum; demum tremor, frigus, horror, rigorque febrilis. His nonnulli adjiciunt *tartarum*, qui verius, ut supra (§. CCXIX.) dictum est, summa videtur esse ad saltandum proclivitas, et plerumque cum aliqua mentis perturbatione conjuncta. Ad alterum (§. CCXLI.) tetanum; emprosthotonos*; opisthotonos*; ipasmus cynicus*; risus sardonicus; strabismus; obstipitas; ipasmus phryodes, siue flatulentus, vulgo cramпус; satyriasis; priapismus, alique spasmi singularem aliquam partem affligentes, de quibus spiciam suis locis.

* *τῆτανος*.
* *ἐμπροσθότονος*.
* *ἐπισθότονος*.
* *κυνικός*.
* *σατυρία*.
* *πριαπίσμος*.

a) PLATNER. *Art. med.* §. 644.

§. CCXLIII.

Tetani varie species.

In tetano ita contrahuntur muscoli antagonistae totius corporis, ut totus homo immobilis, et rigidus factus in neutram inclinet partem, et trunci lignei speciem referat, sola sensuum integritate persistite. Quod si aliquae tantum partes ejusmodi vigore afficiantur, tunc *tetanus particularis* nominatur, ad quem spectat speciatim emprosthotonos, opisthotonos, alique peculiare spasmi. In emprosthotono muscoli ad anteriora corpus flectentes tenduntur, obrigescunt, atque adeo illud antrosum incurvant. Opisthotonos demum est, quando corpus ad posteriora contrariam ob causam reuoluitur, inflectiturque**). His tribus potissimum modis spasmo obrigescere corpus humanum, docent medici, negantque aliter incuruari posse, aut solere. Exemplum

tamen

amen adducit ex VALSALVA MORGAGNIVS a) pascui cujusdam, quo in latus corpus^{***}) flectebatur. Ante VALSALVAM vero aliqua ejus indicia vidit FERNELIVS b) in aegrotō quodam, qui quotiens, hieme dumtaxat, sed bis, terue quotidie spasmus affligebatur variis. Ejus caput primum in accessu vibratione quadam ex intervallis contorquebatur; ita sensum malum per cervicem frigoris sensu devolvebatur: cumque inter scapulas irrueret, illaesa mente, integrisque sensibus opisthotono corpus rigeat. At cum in alterutrum latus, aut in brachium, aut in crurum lequeretur, ita arte id protinus contrahebatur, ut nulla adstantium vi exporrigi, extendique posset. HAENIO vero obtigit observare virum tetano c) laborantem, qui aliquoties sinistrum in latus contractus fuit, itemque mulierem, quae a violenta colli contorsione obstipio capite laborans per intervalla in laevum atus sic incurvabatur, ut romanam literam C referret. Hanc tetani speciem vocavit ipse pleurothotonon, ^{Pleurothotonon, siue tetanus lateralis.} quartoque loco ponendam contra MERCVRIALIS TSORBAITII opinionem jure concludit. Alii hanc speciem tetani lateralem appellant.

*) Caput antorsum flectunt muscoli sterno-mastoideus, ~~sterno-mastoideus~~, rectus anticus major, rectus anticus minor: collum longus colli; spinam psoas parvus; femur psoas magnus, et iliacus internus. Quorum utrinque unus est.

**) Caput retrorsum flectunt splenius capitis, bivensor cervicis, complexus, trachelo-mastoideus, obliquus superior, rectus posticus major, rectus posticus minor. Hi quoque duplices sunt, utrinque unus. Collum tria paria, splenius colli, spinalis cervicis, interspinales cervicis. Spinam sacro-cervicalem, seu Hombocostalis, multitudine spinarum, longissimus dorsi, spinosus dorsi, interspinales dorsi, interspinales lumborum.

a) De sed. et caus. morb. Epist. X. n. 2. an. ejusmodi, in exio, quia die quinto, quo obiit aeger, incidit, a reposito opposito latere repetenda?

***)) Ad latus flectitur caput a recto laterali; collum ab intercostalibus prioribus, et posterioribus, a scaleno quadruplici,

phici, antico, postico, tertio, et quarto; spina e quatuor
lunbarum, ab intertransversalibus, dorsi, et lumborum ac.
Vid. PLENCK. Prim. Lin. Anatom.

b) De Part. morb. et sympt. l. V. cap. 3. p. 135. n. 29.
c) Rat. med. T. X. cap. IV. p. 135.

§. CCXLIV.

*Spasmus
cynicus.*

Spasmus cynicus labiorum morbus est. Si enim
labia, musculis faciei contractis ex vno latere, vel
etiam ex utroque, aures versus adducantur, osque
canis ringentis quodammodo exhibeant, *spasmus
cynicus*, quem alii *oris distortionem* vocant, tenes
dicuntur. A spasmō cynico haudquaquam diffi-

*Risus sardo-
nicus.*

re quibusdam videtur *risus sardonius*, cum hunc
quoque in eadem oris distortionem consistere si pe-
tent, aut si quam intercedere differentiam largian-
tū, in eo tantummodo sitam volunt, quod in risu
sardonico aegri etiam delirent. Morbus quippe
est, quem *sardonia* herba, siue *apium risus*, (*rom-
culum sceleratum* quidam ex Botaniciis vocant) induci
re creditur. Vtūque sit, eorum nobis opor-
tius magis probatur, qui risum sardonicum tum sibi
existimant, quando maxilla inferior vna cum lingua
laryngisque musculis voci, et loquelae famulantibus
conuellit, succutiturque in ridentis modum. Sa-
pe ab hac causa in hystericiis affectionibus, concu-
rente etiam thoracis, ac diaphragmatis spasmodico
motu, risus immodicus, cachinnosque effusos videtur
est, quin *sardonia* herba comesta inculari possit.

§. CCXLV.

Strabismus.

Strabismus ea est oculi spastica inuersione, quae
opticus, ut ait *Savvagesius* a), divergere oc-
tur. Fit autem id mali genus, si musculi oculi
mouentes inaequaliter tendantur, vel eorum aliqui
vehementius conuellantur. Trahitur enim ad eam
partem oculus, quae conuulso musculo responde-

Strabismus

Strabismus ea est etiam oculorum praua directio, quam, aliquo ex eorum musculis paralyti tacto, antagonista praeualens efficit; verum haec strabismi species rectius ad paralyticos, quam ad spasticos, et conuulsiuos morbos pertinet.

a) *Nosol. Cl. IV. Ord. I. Gen. I.*

§. CCXLVI.

Obstipum caput, siue *obstipitas* adesse dicitur, cum colli spasmus caput immobile reddit, aut praeter naturam flectit, vt in eo posito obrigescat. *Spasmus* vero *physodem* efficit subitanea, fugax, dolorifica vnus, aut plurium musculorum in aliqua parte contractio, quae frequentius in manibus, et pedibus, aut cruribus cum molestissimo cruciatu contingit. In ea prout extensores, aut flexores musculi afficiuntur, membrum vel tenditur, vel contrahitur vehementer. A flatibus nomen accepit, quod eum ibi his gigni veteres putabant. Penis demum rigida, pertinax, inuoluntaria, incommoda, et molestissima tentigo, *satyriasis*, et *priapismus* constituit, illa cum concubitus desiderio coniungitur; hic si in eo esse potest, vt supra iam indicauimus.

§. CCXLVII.

Ad spasticos, conuulsiuosque motus (§. CCXLI.) pertinere quoque possunt *suffocatio hysterica*, globus in gutturo in foeminis, et viris hypochondriacis adhaerens, *hystericus* ideo aut *hypochondriacus* dictus; singultus, vomitus, tussis, angina, et aphonia conuulsae; interdum *asthma*, interdum cordis *palpitatio*, interdum *incubus*, siue *ephaltes*, *trismus*, siue stridentium, siue etiam valida maxillae inferioris superiorem adductio, et *), vt ita dicam, adpresio; nam vtrique symptomati denotando adhiberi nomen video; palpebrarum, oculorumque clonici motus, vti *nictatio*, itemque *oscitatio*, *pandiculatio*,

Obstipum caput.

Spasmus physodem.

Satyriasis et priapismus.

Suffocatio hysterica. Globus hystericus.

Singultus. Vomitus. Tussis. Angina. Aphonia. Asthma. Cordis palpitatio. Incubus. Trismus.

Nictatio. *Oscitatio.* *Pandiculatio.* *latio*, atque aliae affectiones huiusmodi, quae plerumque aliorum morborum symptomata esse solent.

*) Morbus est neonatis, atque infantibus non infrequens, saepeque mortalis.

§. CCXLVIII.

Diuisio.

Itaque spastici, ac conuulsui morbi diuidantur necesse est in *uniuersales*, et *particulares*, in *internos*, et *externos*, in *primarios*, et *secundarios*, in *idiopathicos*, et *sympathicos*, et *symptomaticos*, et sic porro. Interiores autem partes aequae, ac exteriores, conuelli frequentissime, atque inde innumeras affectiones, quas flatibus olim, vaporibus, atque vtero tribuebant, profluere, nemo vnus, qui corporis humani fabricam, et functiones nouerit, vquam inficiabitur. Corpus demum vniuersum motibus *clonicis*, siue *conuulsuis* quando ita premitur, ut sensus, et loquendi potentia illaesi maneant, *simplex* tum *neruorum distentio*, siue *conuulsio* esse dicitur: distinguque haec a vera debet, ac perfecta *leptesia*, in qua totum vtique corpus conuellitur, sed interni, externique sensus omnino feriantur, et cessant, ut infra patebit.

*Simplex
neruorum
distentio
quaenam?*

C a u s s a e.

§. CCXLIX.

Causa proxima.

Princeps, atque, ut loquuntur, proxima horum omnium morborum causa *) est violenta, atque inuoluntaria contractio musculosarum partium, et omnium, aut quarundam tantummodo, prout vniuersum corpus, aut partes quaedam afficiuntur: quam induci ab *aucta* praeter naturam *irritabilitate Halleriana*, verisimillimum est. Haec autem in clonicis motibus vel inaequaliter, et per intervalla musculos quosque, vel alternatim antagonistas solum; in tonicis vero vel assidue, et continenter

inter omnes, vel alterutros dumtaxat ad se se con-
ahendum impellit. Animaduertendum tamen est,
on semper requiri, vt vis irritabilis supra naturae
odum increseat; sed interdum sufficere, eam in
tagonistis sic imminui, vt integri musculi languen-
bus, ac quodammodo laxatis robore, et nisu suo
aestent.

*) Ex BOERHAAVII, ejusque discipulorum sententia, in
ibus eminet ANTONIVS COCCHIVS doctrina et nominis
lebritate spectatissimus (*Bagni di Pisa* cap. 4. p. 202.),
asmodum, et convulsionum causa proxima statuitur in
aequali liquoris cerebrosi distributione, vel ex cerebri
suis vitio organico, vel ex irritatione per nervos aliunde
cerebrum propagata, vel copia, et diathesi aliorum hu-
iorum turbata.

§. CCL.

Augetur autem *irritabilitas*, siue vis muscularis ^{Quo modo}
el nutu voluntatis, vel sensorii communis condi- ^{irritabilitas}
one, quae ad naturale sensuum, et motuum ex- ^{augetur?}
citium requiritur, subuersa, vel sanguinis, alio-
umque liquorum per cerebri, nervorum, aut mus-
ulorum vasa circuitu hinc illinc deficiente, aut in-
quali reddito; vel demum irritatione nervis, aut
usculis illata. Quidquid igitur cerebrum, ner- ^{Causae}
os, musculosue praeter naturae leges commouere, ^{motus.}
ellicare, vel quouis alio modo percellere potest, vt
nnes, aut aliquae partes ad motum, contractio-
emque citra voluntatis imperium concitentur, erit
oque causa remota motus aucti, atque adeo con-
ulsionum cuiusvis generis.

§. CCLI.

Ex remotis vero causis aliae sunt proëgumenae, ^{Remotarum}
catarticae aliae. Ad proëgumenas refero pri- ^{aliae proë-}
m natiuam, aut acquisitam irritabilitatem mayo- ^{gumenae,}
quam esse communiter soleat; sensibilitatem ^{alae proë-}
simam; temperamentum sanguineum, et bilio- ^{catarticae.}
sum;

sum; habitum corporis tenuem, teneramque fibrarum omnium constitutionem; capitis malam conformationem; peculiarem a parentibus ductam; nervorum affectiones procliuatatem; grauiiores animi affectus, diuturnasque sollicitudines; veneris, vini, rerum salutarum, acrium, aut acidarum abusus. Sed ita constituta haec sunt, et comparata, ut modo proëgumenarum causarum, verum etiam procatareticarum interdum vice fungi queant.

§. CCLII.

Procatareticae.

In procatareticarum censum potissime veniunt ira; terror; tristis nuntius; hypochondria, vteri, aliorumque abdominis viscerum labe; obdramenta acuta; halitus venenati; acres, aut putridi humores intra caluariam, aut vertebrarum thecam congesti, effusi, stagnantes, qui cerebrum, cerebellum, medullam oblongatam, spinalemque irritant; atque id omne tandem, quod peculiari modo sensibilibissimas medullae cerebri, nervorumque fibras pungere, vellicare, urgere, distrahere, aut inflare, labefactare, aut sanguinis, lymphae, succique alluentis circuitum in cerebri, spinalis medullae, gangliorum, nervorum, et musculosarum partium vasis incitare, aut retardare, aut inordinate, inaequaliterque promouere potest *).

*) CL. HALLERVS (*Elem. Physiol. T. 4. l. 10. sect. V. §. 27.*) haec apposite scripsit: *Cerebri medulla cerse aliquo profundius irritata per uniuersum corpus horridae convulsiones cientur, uti dudum excitauimus. Experimentis videmus, sed morbi similia faciunt. Convulsiones superuivisae sunt a cerebro compresso (BLANCARD. op. chirurg. 556.), et vulnerato (KAAVW. R. 325.); a cerebri ventriculo aqua plenis (SAVIARD. obseru. 89. APPERLEY obseru. 118. BONET. Prodrom. anat. pract. c. 76. de convuls. serv. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BARTHOLIN. cent. III. 80. RHOD. cent. I. obseru. 49. HARDER. APIAR. obs. cum foetibus plexus choroid., (WILLIS p. 131. 114.)*

nonnulla repletione vasorum meningum (Idem Consult. p. 174. 175., BONET. obs. II. 12. 22. addit. obs. I.), *etiam folis* (Idem FORST. de sens. intern.); *ab hydrocephalo* (SEVERIN. Chirurg. effic. P. 2. p. 125. CONRING. Herm. med. p. 12. BARTHOL. hist. 80. cent. 3. CORVIN. hern. cerebr. p. 12.); *a sanguine mero, sed nimio in cerebrum compulso* (KLOEKHOF de frig. nerv. inim. Mém. pref. T. 3. p. 452.); *a grumoso in ventriculo quarto sanguine* (TURNER. Case of surg. p. 42.); *a pure in cerebro* (WILL. l. c. p. 52.), *eiusque ventriculis*; *a sanie, et muco in iisdem ventriculis* (BONET. l. c. obs. 13. 33.); *a cerebri parte consumta* (ARCAEVS p. 50. TVLPIVS l. IV. c. I. BONET. obs. 19. 21. MANOCHAL. Mém. de l'Acad. de Chir. T. I. P. 2. p. 154 155.), *aus scirrhusa*. (FANTON. observ. 20).

§. CCLIII.

Huc spectant arthritica, rheumatica, scorbutica, venerea, atrabilaris, exanthematica, vlcerosa, febrilis, aut cujusque similis alterius indolis materies, acritasque; pleraque ex venenis medicamenta, ex hydrargyro, aut sibiio depromta; expirationis, sudoris, scabiei, crustae lacteae, tineae, herpetis, impetiginis, vlcerum, fonticulorum, aliarumque consuetarum excretionum retrocessus, retentio, exsiccatio; liquores seminales exuberantes, acres facti, corrupti; pus, sanies, lotium, serum, atque alia his affinia, quocunque modo siue per vasa, siue per cellulares telas, siue per membranas quascunque proxime nervis, musculis, spinali medullae, aut cerebro ipsi admoueantur, incumbantque.

§. CCLIV.

His (§§. CCLII. CCLIII.) addendae quoque sunt *His addenda.*
vigiliae nimis protractae; quaecumque affectiones dolorem acerbiorum inferentes; febres malignae, exanthematicae, putridae; vulnera; neruorum puncturae; fibrarum sensu praeditarum ex parte tantummodo sectio, reliquis integris distractis, nec satis

tis vim, pondusque aliarum sustinere sine cruciatu potentibus; exostoses; caries; ossa diffracta; horum acuta spicula; aliena innata, immissa, illapsa; aëris subitae, et graues mutationes; acre frigus susceptum; atmosphaera aestuans, tetris, noxiisque halitibus onusta; ebrietas; ciborum infalubrium, puta fungorum, esus; plethora quaecunque, et huic contraria vacuitas, et ingens humorum iactura; cacochymia; praua primarum viarum saburra, praesertim in pueris, infantibusque; aluus adstricta; meconium testitans; lac nutricis victu, aut animi motibus vehementibus vitiatum, aut acescens factum, aut in ventriculo, atque intestinis acidum factum; vermes; dentitio; variolosum, morbillosum, miliare, scarlatinum, aliudue malignum miasma. Non paucis opinio insidet, risum sardonium, aliasque faciei conuulsiones potissimum a diaphragmatis inflammatione, aut aliis ejus laesionibus oriri. Sed apud I. HENRIC. RAHNIVM a) videre est observationes, quibus demonstratur, spasmos ejusmodi cujusvis etiam alius visceris, quod nervos ab intercostali pari recipiat, vitiis, et laesionibus gigni posse.

a) *Comment. Lipj. Vol. XVIII. p. 454.*

§. CCLV.

Causae Tetani magis propriae.

Haecenus de communibus omnium spasmodorum, et conuulsionum causis. Nunc eas persequar, quae Tetani, ejusque differentiarum, et graduum sunt magis propriae. In his frequentiores censentur asperissimum frigus; potus gelidus aestuanti corpori ingestus; subitus e loco calido in frigidum transitus; somnus sub dio, et corpore humi protenso captus, in primis humidior in loco, et pot largiorem liquorum fermentatorum potationem; febres acutae; vulnera capitis; ictus vehementes; contusiones, contusionesque cervicis; punctura, aut

aut laceratio partis neruosaë, tendineae, musculo-
sae; ossium luxationes, et fracturae; membrorum
amputationes; vini amplior vsus in sauciatis; ichor,
sanies, pus retentum vulneribus exsiccatis, aut iusto
citius cicatrice obductis; abortus; serosa acris col-
luuies; putrida cocochylia primarum viarum; ver-
mes multi, magni, teretes ventriculum, et duode-
num occupantes; diaphragmatis vulnera, similes-
que causae *).

*) Tetani species omnes sunt populis calidiorum regio-
num familiares. Causae manifestae in infantibus plerum-
que censentur meconium retentum, saburra gastrica, ver-
mes; in adultis incauta post calorem, aestumque refrige-
ratio, sed saepissime exiguum vulnus, vel punctura; ex
qua decimo, vel decimo quarto die post accedit spasmus,
vulnuscule ut plurimum iam sanato. WILLIAM HILLARY
Observat. on the Changes of the air. Lond. 1759.

§. CCLVI.

Anatome detexit, praecipuam sedem morbi, quan- *Sedes morbi
ex anatome.*
do primarius, atque idiopathicus est, cerebrum esse,
et spinalem medullam, sed frequentius, et certius
hanc postremam. Id jam cognouit FERNELIVS,
deinde confirmauerunt plures alii. LIEVTAVDIVS
in spasmis, ac conuulsionibus, in quibus sensus, et
linguae vsus seruatur, medullam spinalem affici non
dubitatur; atque inter ejus inuolucra ut plurimum
humorem aqueum effusum reperiri affirmat a).
Eandem tuetur sententiam BILFINGERVS, imo su-
premam medullae spinalis partem speciatim labo-
rare existimat, et, si vnquam in cerebro vitium fuit,
ex eodem in medullam spinalem illud propagari b)
contendit. In viro, quem inter alia postremis vi-
tae diebus excruciauerant *superiorum artuum toni-*
cae conuulsiones per intervalla recurrentes, cranii
fornice, et subiecta crassa meninge ademptis, paucae
effusi sanguinis guttae supra tenuem meningem sub

O 2vertice

vertice conspectae sunt prope latus sinistrum longitudi-
nalis sinus: vasa autem, quae per eandem hanc me-
ningem, hemisphaerium cerebri dextrum conuescentem,
reptabant, valde erant sanguine distenta, et nigrican-
tia. In anfractibus cerebri totius stagnabat aqua fer-
me limpida. In ventriculis aquae vix aliquid. At
multa ad magnum occipitis foramen sic, ut pronum
esset intelligere, illac in spinæ tubum non defluere po-
tuisse, ex quo reapse mox effluxit, cum spina ad imam
thoracis partem dissecta c) est. Obiit ex Tetano in
 Nosocomio Bononienſi ann. 1752. vir sanissimus,
 et optimo corporis habitu praeditus, qui in mor-
 bum ex suscepto post largam vini potationem in-
 genti frigore inciderat. In cadauere ejus dissecto
 inuenta est intra duram, et piam matrem, qua me-
 dulla spinalis cingitur, magna vis feri viscida, et fla-
 vescentis d). Observationem apprimè similem
 habet Cl. ZVLATTVS d^o) de Tetano ex eadem pro-
 pèmodum causa nato in quodam pistore, in cujus
 cerebri ventriculis, et tota fere medulla spinali in-
 ventum est serum viscidum, flauum, et non nihil
 acre. In sectione hominis opisthotone defuncti,
 cujus historiam nobis reliquit BONTIVS e), appa-
 ruerunt cerebri ventriculi materia viscida, glutinosa,
 lutea, vitello oui persimili, et non parum foeten-
 te oppleti. Serum quoque, perpaucum quidem,
 sed falsum in sinistro cerebri ventriculo reperit
 cujusdam juvenis, quem Tetanus confecerat, Cl.
 VALSALVA f). In aliis vasa tenuis meningis tur-
 gida, et sub eadem humor gelatinae instar occurre-
 runt g). Vasa item piaë matris supra lobum poste-
 riorem vtrumque, sed magis sinistram, infarcti
 sanguine in cadauere tetano peremti ita erant, ut
 purpurasceret. Sub eadem tenui meninge stagna-
 bat humor lentus, albidus, ad utrosque lobos late
 effusus. In occipite vero ad cerebelli basin feri ru-
 belli

belli cochleare deprehensum est, referente HÆMIO h). Sed in his postremis obseruationibus nulla fit de spinali medulla commemoratio. Si ea fuisset inspecta, aliquid fortasse, quod superiores confirmaret, exhibuisset. Postremo ex Cl. MORGAGNII monito non tantum ad copiam humoris effusi, aut stagnantis, sed potius ad acrem; irritantemque naturam his in casibus attendere oportet.

a) *Précis de Médec. Malad. intern. de la rés. livr. I. p. 215.* b) *De Tetano lib. singular. theoretic. practic. p. 57. et seqq. Lindaviae 1763.* c) MORGAGN. *Epist. anat. medic. X. n. 13.* d) DALL'ARMI *Sagg. di Medic. Prat. P. 2. p. 92.* d*) *Miscell. di var. letterar. T. 2. p. 147.* e) *De medic. Indor.* f) MORGAGN. *epist. cit. n. 2.* g) *ib. n. 19.* h) *Rat. med. P. X. cap. 3. p. 123. et seqq.*

§. CCLVII.

Tetanus, vt reliqui morbi conuulsiui (§. *Tetani divisiones.* CCXLVIII.), vel vniuersum corpus tenet, vel aliquas partes dumtaxat. Hinc prima ejus differentia oritur, qua distinguitur in *vniuersalem*, et *particularem*. Vniuersalis iterum vel est *exquisitus*, vel *non exquisitus*. Ille acutorum instar repente, et cito aggreditur, et decurrit; hic lente, et pedetentim. Ille igitur subitaneus, brevis, acutissimus est; hic successiuus, habitualis, recurrens, et recidiuus a). Vterque, siue vniuersalis, siue particularis sit, exquisitusque, vel non exquisitus, differt ratione sedis caussarum, atque originis. Nam modo *idiopathicus* est, modo *sympathicus*; modo *protopathicus*, *Differentiae.* siue primarius, modo *deuteropathicus*, siue secundarius, aut *symptomaticus*. Causae etiam ipsae differentias aliquas faciunt, quae a quibusdam tamquam species habentur, cum tamen reapse non sint, nisi simplices varietates, quas sane praestabit omittere, ne earum numerus sine necessitate nimium increascet*). Plerumque sine febre accedit, et perstat; interdum *Quomodo febris invadat.*

febris superuenit, et saepe eum soluit. Interdum ipsa antecedit; quo fit, vt pro signo indiuisibili haberi ea nequeat. Illud potius perpetuum est, quod dolor acerbe, et quasi per subsultus partes spasmo correptas discruciet.

a) CHRIST. LVDOV. BILFINGER. l. c.

*) Exstat in *Rat. med. T. X. p. 115.* HAENII *Dissertatio de Tetano.* Ibi §. VII. p. 182. aliquot ejus historiae medicae de Tetano referuntur; sed non omnes ad Tetanum spectare mihi videntur. In *hist. I. mandibulae immobilitas* ex angina memoratur. Dubito, vtrum verus tetanus, et vera conuulsio ea fuerit? Dubito etiam, an maxilla immobilis in *historia quarta* (pag. 189.) descripta conuulsione esset, aut potius anchylosis ex lue venerea, quae certe non aberat? Dubium mihi pariter subit, num maxilla immobilis (in *hist. quinta* p. 190.) reddita spasmo tribuenda sit, cum ex tumore, et carie antri hygmoriani, a quibus muscoli temporales, et masseteres tendi, torquerique potuerunt, repeti posset. Tetanus certe non fuit, sed rheumaticus, arthriticusue affectus, quem *historia sexta* p. 192. exhibet. Etenim si, quoties partes aliqua rheumatico humore infestantur, dolent, rigent, immobilesque fiunt, toties tetano eas correptas diceremus; profecto tetanus non rarus morbus, sed frequentissimus, obuiusque esset 1).

1) Non negandum tamen est, interdum Tetanum tam phaenomenis, quam exitu, et curationis ratione adeo cum rheumatismo acuto affinitatem habere, vt *rheumaticus* tunc dici possit. Id nuperrime indicauit, docuitque CL. JO. BAPTISTA MARZARIUS Medicus Taruinus, jam alio ingenii, et scientiae medicae documentis editis notus, peculiari obseruatione, quae exstat in nouo Diario Medico Veneto T. 2. n. V. p. 176.; dignaque est, vt legatur, vtpote quae continet consuetaria quaedam non minus noua, quam Clinicis apprime necessaria. Fatetur tamen, Tetanum ad nervosos affectus generatim spectare, vt ex ejus epistola tertio idus Mai. an. 1785. ad me data palam colligitur.

§. CCLVIII.

Signa Tetani imminetis.

Quando Tetanus lente, et velut ex insidiis adoritur, non facile praenideri potest, nisi vulnus, aut aliae

aliae caussae, ex quibus oriri consuevit, antecesserint. Plerumque tamen appropinquantem morbum indicant grauius capitis dolor; oculorum caligo; lipothymiae; syncope, molestus ad scrobiculum cordis, aut sub cartilagine ensiformi sensus, a quibusdam pro pathognomonico signo habitus; tremores; et pectoris, abdominisque alternantes subsultus. Sed certius indicium est, cum rigor jam ^{Signa praesentis} aliquod membrumprehendit, puta collum, maxillam, aliamue partem. Vbi vero jam morbus praesens est, riget totum corpus, ut inflecti nequaquam possit, quemadmodum jam supra (§. CCXLIII.) exposui, maxillae firmissime clauduntur, faucesque non arctantur modo, ut quaeuis ingesta per nares redeant, verum etiam tendi, atque obdurari videntur. Sensus plerumque supersunt; interdum tamen, si grauissimus casus sit, abolentur. Corpus friget, interdum sudore frigido perfunditur; pulsus paruus, lentus, debilis, depressus percipitur; nonnunquam concitatur ut in febre; respiratio, in primis ubi funestum exitum res comminatur, anxia, difficilisque est; oculi defixi manent; facies ut plurimum pallet, quandoque rubet, si HIPPOCRATI, atque ARETAEO credimus; vrinaeque etiam supprimuntur, aut certe parcius fluunt. Simul ac vero aegri incipiunt iactari; stuporem, et formicationem in membris queri; pruritus, doloresque lancinantes huc illuc percipere; solutionem proximam fore indicium est. Solutum demum morbum subsequuntur faucium siccitas, calor, mador, lassitudo, et quaedam in abdomine inquietudinis a) perceptio.

a) BILFING. l. c. p. 47.

§. CCLIX.

Neque hoc morbi genus confundi licet cum catalepsi, aut paralyssi, aut rheumatismo grauiori, aut ^{Quomodo differat a catalepsi, aliisque affectibus.} conge-

congelatione, aut anchyloſi, ſimilibuſque affectibus. Nam neminem fugit, in catalepi, et paralyſi corpus flecti, vt nobis libuerit, facile poſſe, nec vero villo modo rigere, vt in tetano; quod diſcrimen luculentius apparebit, ſi vtriuſque morbi jam tradita (§. CCLVIII.) deſcriptio cum notis (§§. CCXLIII. et CCLVIII.) conferatur. In rheumatismo vero grauiori non deest mouendi poteſtas, ſed tumor partium, muſculorum, aut ligamentorum inflammatio, dolorque ad quemlibet motum acerrimus impediunt, quo minus libere mouendi facultas exerceatur. In anchyloſibus etiam cuique perſpicuum ſit, motum deficere non rigore, et ſpaſmo muſculorum praeter naturam, et voluntatis juſſum con tractorum, ſed vitio articulationum ipſarum. Quis vero ex frigore congelatos non diſtinguat a tetano correptis? Corporis alor ſummus, reſpirationis, et pulſuum defectus, altus veluti ſopor, et ſtupor, membrorum, ſi vi flectantur, nulla reſtitutio ad priſtinum ſtatum, cauſaeque antecedentes congelationem ſatis patefaciunt. Cauere etiam oportet, ne pro tetano, ſiue ſpaſmo maxillae inferioris, ſiue triſmo tonico accipiatur *triſmus rheumaticus*, quem ſacit rheumatica materies circa muſculos, articulationemque maxillae congeſta, aut *triſmus* a tumore parotidum, aut ab inflammatione ſynanchica genitus, aut *triſmus vlceroſus*, aut *anchyloſicus*, quem ſcilicet vlcera oris, et faucium; cicatrices, abſceſſus; genarum, aut mandibularum ad angulos coallitus, aut etiam anchyloſis, aut alia manifeſta cauſa inducit. In hiſ enim ſingulis inſpectio oris, et muſculorum maxillam mouentium mollities diſcrimen facile detegunt *).

*) At legendus eſt abſolutiſſimus, et labore prope indicibili conſcriptus WENCESLAI TRNKA DE KRZOWITZ S. R. I. Equis. in Regia Vniuerſitate Tyrnauienſi Anaſtor Profiſſ.

*Yessoris Pub. et Ordinarii Commentarius de Tetano plus
m ducens clarissimorum medicorum obseruationibus, nec
omnibus hactenus cognitis aduersus Tetanum remediis
ructus. Vindobonae 1777. in 8. pag. 465. In hoc eni-
nia, quae tum a veteribus, tum a recentioribus, nu-
rimisque scriptoribus de Tetano edita sunt, in vnum
lecta, ac ordinate digesta reperies.*

§. CCLX.

Reliqua demum signa diagnostica tam *tonicarum*, *Signa mor-*
am *clonicarum* affectionum cum ex superioribus *borum con-*
teant, non est, cur hic repetantur. Illud solum *vulsiuorum*
iiciam, eos, qui conuulsiuis morbis conflantur, *communia,*
iuerim modo pallere, modo rubore suffundi,
modo vehementius incalescere, modo frigere, et
quandoque sudoribus manare; vrinasque modo in-
supprimi, modo vberiores, crebras, et tenues
itti; aluum vero modo pertinaciter claudi, mo-
praeter morem, et modum laxari. Restat po-
mo, vt motus, quos conuulsiuos dicimus, a *tre-*
re discernantur. Hic motum quemque volun-
tium comitatur; illi inscio, quiescente, nec qua-
aduertente aegro plerumque fiunt. Tremor
im, etsi veluti gradus quidam conuulsionis habe-
possit, a facultatis tamen motricis imbecillitate,
equalique neruorum in musculos actione saluo
erim voluntatis imperio proficiscitur. In vera
em conuulsione abest motus voluntarius, non ita
nen, vt in paralyfi, in qua membrum resolutum,
motu carens trahi, et quoquo versus flecti po-
t: in conuulsione, quia tensum, aut contractum,
violentia, et doloris tormento non potest.

EPILEPSIA.

§. CCLXI.

Quoniam morbis conuulsiuis epilepsiam supra
CCXLII.) adnumerauimus, ejusque tractationem

paullo fusiores polliciti sumus; hoc loco fidatam praestabimus, naturam morbi non infrequentis, et saepenumero permolesti, causas, ac si quoad tamen fieri potest summatim, explicamus.

Descriptio epilepsiae.

Itaque qui hoc morbo capiuntur, in terram repente concidunt, toto corpore quatiuntur, sensu destituti, sic ut epilepsia proprie dicta definienda.

Definitio.

sensuum omnium tam interiorum, quam exteriorum subitanea interceptio cum violenta, alternaque motuum lorum prope omnium voluntati famulantium commotione, et relaxatione, plus minus perdurans: tandem homo ita affectus ad pristinam integritatem et quietem redeat, quid ei contigerit, plane ignarus, et nescius. Atque haec est vera, et perfecta epilepsia, siue, ut aliis nominatur, *morbis sacer, herculeus, lunaticus, comitialis, caducus, et puerilis.* Hodie vero tale nomen illi tantummodo affectui tribuendum volunt, qui per vices reuertatur, diuturnus, siue chronicus vere sit; nam reuertentem, nec iterato reuertentem *malum* *lampsiam* nominare; qualis est in primis illa, quam pueri ex dentitione, aut ex retento meconio, aut ex varioloso, aut morbilloso miasmate incidunt, quin tamen, ea causa sublata, eidem obnoxii sunt.

*) Epilepsia dicitur etiam *επιληψία* ARISTOTELI, HIPPOCRATI, videlicet quasi comprehensio, aut comprehensio. Credebant enim veteres, epilepticos a daemone corripri, enormiterque agitari, et quati. Morbum quod *sacrum* dixerunt, quod nequiret humana arte tolli, sed vina; vel quod sedem animae occuparet; vel de quod Graecorum mos esset, quidquid magnum esset, *sacrum* vocare. Apud ipsos enimvero saepe *sacrum* magno est. Hinc *sacra nos*, *enqora sacra* apud ROMANOS. Praeterea *sacer* valet, ac execrabilis, ut apud VIRGILIUM: *Auri sacra fames quid non mortalia etc.* cetero tamen *sacer*; et *major* morbus perinde est. Hercules etiam nuncupatur, quod eodem laborauerit Hercules, quod inuincibilis fere deprehensus sit. Sic eum quoque vocant.

hauit ARISTOTELES. *Diuinum* placuit PLATONI eum
 cere, quod diuinam animae partem in eo discerni
 edidit. Multis porro de causis *lunaticus* audit, sed po-
 ssumus, 1. quia interlunio nati saepe eidem obnoxii visi
 unt; 2. quia phases lunae sequi creditur; 3. quia a luna
 flagitiosos homines poenae loco infligi putabatur. Sed
 missis priscae theologiae deliramentis, tanta fuit semper
 e lunae influxu in hunc morbum apud omnes persuasio,
 epilepsiam idiopathicam in solis, et lunae coitu corripere
 pserit RIVERIUS (*cap. de epileps.*), nec dubitauerit no-
 ra hac aetate MEADIVS (*De imper. sol. et lun.*) non modo
 eterum opinionem propugnare, verum etiam observatio-
 es adducere, quibus ostenderet, eam crescente luna, at-
 ue in ipso maxime plenilunio suas accessiones repetere.
 Denique *comitialis* morbus dictus est, quod, quotiescun-
 que aliquis in comitiis eo percussus prolabebatur, vt ma-
 gna in hominum frequentia vix vitari potest, comitia re-
 gionis ergo interrompebantur: *caducus* demum ex casu;
nerilisque, quod pueris in primis infestus est.

§. CCLXII.

Fere eadem, quae apoplexiam, epilepsiam quo- *Signa prae-*
nuncia.
 ue antecedere consueuerunt, nimirum capitis gra-
 titas, vertigo; aurium tinnitus; scintillae oculis
 buersantes; linguae tarditas, ac difficilis inflexio;
 omnis profundior, vel insolitae vigiliae; somnia
 turbulenta; insueta tristitia; aut ad iram propen-
 io; obliuio; torpor; stupor; tremor; sternuta-
 nenta; oscitationes crebrae; vberior salivae fluxus;
 ausea; aut contra fames, auctusue appetitus; odo-
 is tetri, aut alieni, et falsi perceptio; pectoris, gut-
 turis, ventrisque constrictio; musculi alicujus dis-
 ractio; scapularum dolor; cordis palpitatio; op-
 pressio; angustia; vrina aquea, et cruda. Non
 ullos paullo ante morbi accessionem corripit ali-
 us particulae dolor, vel spasmus phfyodes, siue
rampus, vel aurae frigorisferae veluti adscendentis
 perceptio. His saepe indiciis praesentitur futura
 ccessio; interdum tamen sine vlllo signo, et repen-
 e, ac elanculo inuadit.

§. CCLXIII.

§. CCLXIII.

Signa praesentis jam epilepsiae.

At ubi jam malum accessit, homo tum subito corruit sensuum expers; motibus clonicis concutitur; subinde immobilis fit, iterumque conuellitur; facie rubet; pallefcit; liuet; intumescit; lingua quae dentibus intercepta saepe discerpitur, ore effertur; et in grauiori casu alui excrementa, vrinae semen inscius, inuitusque emittit *). Pulsus, qui plerumque fortis, magnus, et creber est, alternim euanescit, reditque; oculi modo aperti, et desidia haerent, modo mirifice contorquentur sic, ut non raro, discussio etiam paroxysmo, lusi, et toruere maneant. Non nullis in gutture, et pectore sibilus, ac stertor excitatur; aliis singultus, aut vomitus accedit; plerisque spuma ex ore, et naribus praesertim sub accessionis finem, erumpit, sudor quoque e capite, e collo, aut etiam vniuerso e corpore emanat. Interdum mirae, et rarae incidunt membrorum commotiones, gesticationesque; necesse sunt quibusdam accessione inuadente ejulatus, vociferatio, clamor, aut verba quaedam confusa, etque obscura. Tanta vero saepe est membrorum agitatio, ac conuulsio, ut vel robustis, admodum hominibus distorqueantur, ac luxentur a). Videtur in nobili foemina maxillam inferiorem ita diducam et e sua sede excussam, ut finito paroxysmo os claudere, nisi restituta in suam sedem per chirurgi manum mandibula, nequiverit. Aliam quoque virginem patritiam curavi, cui, quotiescunque epilepsia corriperebatur (corripiebatur autem singulis fere mensibus), humeri sinistri caput in axillae vultum prolabebatur. Cessante denique horrido, terribili quoque conflictu, quod in aliis post pauca minuta in aliis post longius spatium, imo in quibusdam per horas aliquot **) contingit, membra laxantur, et coquiescunt; oculi obscuri, et turbidi apparent; venter

fronti

antis, temporum, faciei, et colli non illico detument; mens stupet, ac torpet; labia nigricant, et li-
 nt; lingua sanguinem fundit; sensus, et motus
 untarii lente redeunt; sed nulla eorum omnium,
 ae acciderunt, superest recordatio, aut cognitio.
 e capitis dumtaxat, pectoris, membrorumque do-
 re conqueruntur, qui sic ad se redeunt.

*) DVRETUS putabat, in epilepsia musculos voluntati
 eruentes contrahi; resolui vero eos, qui sponte mo-
 mur. At SWIETENIVS negat, excrementa ob resolu-
 s sphincteres hic ejici; opinaturque, ideo excrementa
 geri, quod actio validissima diaphragmatis, ac musculo-
 m abdominalium superat resistantiam sphincterum, at-
 ae eadem exprimit, excernitque. Reuera non sensim,
 ed magna vi, atque impetu prorumpunt. *Comment. in*
JOERH §. 1077.

a) VAN SWIET. *ib.* §. 818.

**) Iuuenem sacerdotem tenerioris habitus vidi, qui in
 rtissimam epilepsiam ex graui animi aegritudine incide-
 r. Is per horas prope viginti omnibus sensibus destitu-
 s atrocissimos motus, insultusque clonicos, vnos post al-
 ros sibi, succedentes, quin vnquam penitus desinerent,
 flus est. Iugularium sectio iterata tandem eos compe-
 git.

§. CCLXIV.

Haecenus epilepsiam non modo veram, ac per- *Epilepsia*
 ctam, sed grauem etiam, et communissimam de- *imperfecta.*
 ripsi. Quae enim cum aliquarum tantum par-
 tum motu clonico fit, quaeue non omnes sensus,
 el non omnino supprimit, epilepsiam quidem no-
 mandam esse concedimus, sed leuem, atque im-
 rfectam. Sunt praeterea quidam veluti ad eam
 adus, in quibus vix, aut per momentum solum-
 modo sensus intercipiuntur, vixque vllus motus
 auulsius, aut sane leuissimus vna concurrit, aut
 gri stant, nec humi procumbunt; hos *insultus* *Insultus*
epilepticos, quam epilepsiam dixerim. Ab *epileptici.*
 is vero pedetentim, ac gradatim, si negligantur,
 ad

ad epilepsiam primum leuiorem, deinde graui-
Quidam af- ac perfectam fieri solet transitus. Video etiam
fectus per- quibusdam rarissimos nonnullos casus narrari,
peram epi- quae ad hoc morbi genus referri, dum tamen eorum
leptici habiti. non pauci ad somnambulismum, aut ecstasim,
 anaesthesiam, aut hysterismum, aut ad complicatas
 neruorum affectiones spectare nobis videntur. Sed
 his igitur dicere praetermittam, nemo velim
 arguat negligentiae, aut inconsiderati consilii;
 quae minus, quod insolitae, mirabilesque ejusmodi
 historiae apud obseruationum rariorum collectores
 non desint cuicunque earum cupido indagatae.

§. CCLXV.

Causae. Quod ad causas attinet, hae non aliae esse possunt,
 quam illae, quas generatim tamquam morborum
 conuulsiuorum communes (§. CCXLIX. et seqq.) re-
Differentiae. censuimus. Pro varia autem earum sede illa distinctae
 inprimis magni usus est, quae epilepsiam *idiopathica*
 a *sympathica*, et *symptomata* secernit. In *idiopathica*
Sedes epile- thica causarum sedes ipsum caput est. An
psiae idiopa- in eorum, qui ex hac obierunt, cadaueribus
thicae. cerebrum inuenit callosum, aut flaccidum, aut cor-
 ruptum, aut in ejus ventriculis serum effusum, aut
 in meningibus innata officula, aut in caluaria ossi-
 fices, gummata, cariem, aliaque id genus; inter
 dum tamen, MORGAGNIO testante, nullum ma-
Signa epile- festum vitium. Ceterum epilepsia, quae in capite
psiae idiopa- causam, et sedem habet, certis quibusdam
thicae. cognoscitur. Plerumque nulla sui praesensio
 vadit, et fere semper cerebri male affecti, reli-
 quaeque partibus bene habentibus, indicia, puta cephalalgia
 diuturnam, crebram vertiginem, sensuum, et me-
 tis hebetudinem, torporemque subsequitur, vel
 se relinquit. Causae etiam antecesserunt, quae
 cerebrum proxime affecerint, in primis terror, mor-
 sita

is, hereditaria tabes, ictus, vulnera. Contra in *Signa symptomatica*, cerebro bene constituto, vitium aliquis partis ab eo diffusae occurrit, a quo aegri ut primum de imminente ejus accessione admonentur. Hinc multiplices differentiae pro diuersa *Differentiae ex causarum sedibus* originis sede ab auctoribus traduntur. Interdum stoma-
chus, interdum intestina, aut hypochondria, aut vterus, aut pedum, aut manuum digiti, aut
brachiorum extrema, aliaeque partes causam suppeditant. Quarum causarum etsi pernecessaria medica-
cognitio sit, non tamen specierum numerum ad-
get. A locis tamen, et causis, si nomina dedu-
ntur, ut clarior fiat morbi distinctio, non repu-
auerim. Hinc *stomachica, hypochondriaca, me-
nstrua, atrabilis, verminosa, hysterica*, et sic
propterea appellari poterit.

§. CCLXVI.

Si a stomacho, aut hypochondriis morbus pro-
lat, adsunt cruditatis signa, ructus videlicet aci-
diorum, rançidi, flatu, borborygmi, prauus
sapor, nausea, functiones viscerum abdomina-
lium laesae, anxietas a pastu, et omnium sympto-
matum incrementum; jejunis vero saepe ventri-
li morsus, cardialgia, ventrisque dolores. Ab
epate, et in primis a calculis felleis genitam *) non
equam, referunt auctores, celebratissimi. Hanc
precedunt hepatalgia, siue colica ictERICA, icterus
pinax, recidiuus, diuturnus, et reliqua calculo-
rum felleorum symptomata, de quibus alibi memo-
rimus. Si ab utero, affectio hysterica, fluor al-
bus, hystericalgia, ovariorum tumor, obstructio, ute-
ri minutae, aut deprauatae excretiones, haemor-
rhagiae, atque ejusmodi alia. Si a vermibus, inter
cetera narium pruritus, pallor, sternutamenta, fu-
sces faciei rubores, mydriasis, pauores in somno,
animi

*Signa,
quando a
stomacho est.*

*Signa, quan-
do ab utero.*

*Signa, quan-
do a vermi-
bus.*

animi sine manifesta causa deliquia, dejectiones cinereae, argillaceae, mucidae, tormina, colici dolores, abdominis meteorismus, aut tensio, et primum lumbricorum, taeniarum, vermium cucurbitinorum, aut ascaridum expulsio. A lacte ad coactoque in infantum ventriculo, aut intestinis excrementa alui viridia, aut breui virescentia, et dum spirantia, caseosa, vomitus, diarrhoea, meconio aegre prodeunte, aut retento, flatus, et ejulatus, ventris tumor, aluiusque adstrictio

A dentitione. que inofficiosa. A dentitionis difficultate, temporales aetasque ad id idonea, gingivarum calor, tumor, dolor, ptyalismus, inquietas, capitis grauitas, et

A singulari particula. narum rubor, sitis, et quandoque febris. Ab illa qua singulari particula, vti digitis, pedibus, cubitus, manibusque; doloris in ea, aut spasmi, et contractionis sensus, aut aura frigida ascendens, et alia similis molestiae perceptio antecedens, a

Epilepsiae symptomaticae quales differentiae. initium morbus facere videatur. Symptomaticorum vero differentiae a morbis, quorum symptomata est epilepsia, desumuntur. Praecipuae epilepsiae febri-
brilis, exanthematica, syphilitica, traumatica, melancholica, et sic deinceps; prout a febris, exanthematibus, venerea lue, vulneribus, cachecti-

Diagnosim reliquarum causarum. melancholia, aliisue morbis proficiuntur. Quarum demum causarum (§§. CCLI. CCLII. CCLIII. CCLIV. CELV.) diagnosim comparabit attentae rationum, comitantium, et succedentium comparatio.

Communio cum aliis spasticis et conuulsivis morbis. Neque ista tantummodo de epilepsia, quae origine dicta sunt, sed de quouis etiam spastico, aut conuulsivo affectu, quem supra monstrauimus, intelligantur.

*) Cl. BEAUMES avertit observationem (*Journal de medecine*, T. 57. pag. 320.), qua probare tentat, mortuam mulierem ex epilepsia ab hac causa genita. Sed si epilepsia ipsa esset, et fortasse calculos felleos haberet, et

non satis ex hac obseruatione constat, epilepsiam sympathicam fuisse, cum causae idiopathicae non defuerint. Aliud exemplum epilepsiae ejusmodi in eodem Diario ad mensem Iulium p. 504., ibique dicitur, hoc adesse signum, semper dolorem in latere dextro epigastrii, in toto brachio, et genu ejusdem lateris. Similem huic obseruationem habet HOFMANNVS (*De epileps. observ. 3.*). CONRADVS FABRICIVS (*Act. physic. T. X. observ. 36.*) in epileptico ex hac causa mortuo inuenit vesiculam felleam plenam calculis inflammabilibus, venam postaram sanguine nigro turgidam; nihil vero serosi humoris in cerebro effusi; cerebri substantiam siccam, et compactam; vasa omnino sanguine vacua.

Prognosis.

§. CCLXVII.

Vt cuiusque morbi, si conuulsiuorum aestimatio ex causa, et duratione potissimum elicienda est. Horum autem prognostica signa in vnum cogam, ne quae multis conueniunt, in singulis repeti debeant ad nauseam. In vniuersum nunquam eiusmodi morbi periculo vacare credantur. Idiopathici grauiiores, difficiliioresque curatu sympathicis habentur. Sympathici vero, si diu persistent, aut reuertantur saepius, paulatim in idiopathicos transeunt. Quo vehementior neruorum distentio, aut spasmus, quo diuturnior est, et partes quo plures, nobilioresque afficit, eo majus periculum portendit. Quo etiam peiora symptomata infert, et quo magis actiones vitae necessarias laedit, eo maiorem etiam metuendi causam praebet.

Signa prognostica in genere.

§. CCLXVIII.

Conuulsio, quae febribus acutis, exanthematicis, atque inflammatoriis circa augmentum, aut statum, praesertim post vigilias, delirium, aut soporem, superuenit, valde profecto periculosa est. Ex materia enim morbifica nondum coctionem adepta, neque

Conuulsio febrilis.

que satis ad excretionem parata, in cerebrum, nervosque impacta progignitur. *Convulsio*, inquit *Auctor Coacarum a)*, *febri succedens periculum denunciat; minimum vero pueris*. Iterumque *b)*: *in febre convulsio, manuumque, ac pedum dolores malignum quiddam praenunciant*. Quod etiam innuit *HIPPOCRATES c)*, inquam: *in febribus acutis convulsiones et circa viscera dolores vehementes, malum*. Non nunquam tamen, si coctione facta, et materia evacuationi idonea contingat, eam ad excretionem illicit, morbumque soluit. At tunc convulsio, non habent *Coacae d)*, brevis est, et eadem die desinit. Fereque ejusdem generis esse consuevit, quae variolarum, aut morbillorum eruptionem praecedit.

*Convulsio ab
transitione.*

Magnum quoque periculum incumbit a convulsione, quae copiosiori sanguinis effusioni, aut ileo, vigiliis, hypercatharsi succedit. Consulantur *HIPPOCRATIS* aphorismi II. III. XLV. sectionis V., et IX. X. XVIII. XXV. sectionis VII.: itemque in *Cocis* num. 565., ubi convulsio a vomitibus sine mala pronuntiatur. Non tamen omnis spes scienda est in convulsionibus ex vehementiori thartico natis, etsi eas lethales dixerit *HIPPOCRATES*. Paregorica enim, quae opium habent, et theriacalia remedia interdum eas compescunt. Verum quae vulnere, ulceri, aut abscessui circa cerebrum, aut nervos insignes esistenti accedit, exitium certum comminatur.

a) N. 356. 357. b) N. 3. c) Aphor. 66. sect. IV.
d) N. 15.

§. CCLXIX.

Tetanus.

HIPPOCRATIS effatum est: *Qui a tetano corripuntur, intra quatuor dies pereunt; si vero hos effugerint, sani fiunt a)*. Sed idem *HIPPOCRATES*, non tantè *SWIETENIO*, alibi morbi finem longiorem declaravit. Reuera exstant observationes, quaedocent

ent, Tetanos ad viginti, et triginta dies protrahos fuisse, non tamen ideo sanatos. Ad annum eruenit ille, quem VALLISNERIVS demum curauit. Verum complures historiae tetanorum occurrunt, qui rheumaticae, atque arthriticae affectiones verius erant, quam tetani. *Ab ardoribus vehementibus conuulsio, vel Tetanus, malum b). Conuulsio, vel Tetanus, si febris accedat, soluitur c). Ophthalmicum, si ad eum febris accesserit, urinas geniturae miles soluant d). In Tetano si maxillae resoluantur, ethale est e). Veritas hujus prognoseos multis comprobatur obseruationibus. Videantur Tetanorum historiae, quas scriptis tradidit HAENIVS f), in quibus hoc signum, ubi apparuit, vere lethiferum existit. Febrem conuulsioni superuenire melius est, quam conuulsionem feбри g). A quartanis correpti non admodum conuulsioni obnoxii sunt; si vero, prius correpti fuerant, et postea quartana superuenerit, liberantur h). Conuulsionem muliebria, si circa initia appareant, neque febris accesserit, soluant i). Urinis immixtae arenulae, lateribusque matulae adhaerentes *) nequaquam in conuulsionibus, verum in omnibus fere morbis complurium obseruatione bene ominantur. Vt matronam quamdam affectionibus conuulsivis maxime obnoxiam, cui urinae subturbidae, et albidae prodeuntes magno leuamini erant.*

Conuulsio
in genere.

Febris.

Urinae.

a) Aphor. 6. sect. IV. b) HIPP. aph. 19. sect. VII.
c) Id. aph. 57. sect. IV. d) Coac. N. 362. e) Id. N. 363.
f) L. c. g) HIPP. aph. 26. sect. II. h) Id. aph. 70. sect. V. i) Coac. N. 531.

*) Hic praeterire non possum CL. MORGAGNII locum de urinarum hujusmodi arenulas spectantem, dignissimumque, qui totus exscribatur. Postquam enim IOBERTI, et GRADJI obseruationes retulit de arenis a febricitantibus sub finem morbi, aut post longas febres mictis, tradiditque, qua ratione hae distinguantur ab illis, quas calculi reddunt, nam si fricentur digitis comprimendo, facile dissoluantur, quod non euenit de calculum significantibus,

mox haec subiungit: Porro ego non in febribus solum, in
 essent vernae, aut aestivae, siue autumnales, aut hyemal-
 siue intermittentes, siue continuas, siue benignas, vel cum
 rictulis junctas, siue inter illas medias, aut interdum len-
 tas, disturnas, aut breves, siue in pueris, aut adolescen-
 tibus, siue in viris, siue in mulieribus, et his aliquando in
 praegnantibus, siue demum ex frequentioribus causis, aut
 siue interdum ex singularibus, ut ex ingestis erodente venis
 non solum, inquam, in febribus, verum etiam in non
 aliis morbis a febre sejunctis, et nominatim in capitis mor-
 bis doloribus, et apoplecticis quibusdam affectibus, non
 quam etiam senilibus, animadverti, quotiescunque illi
 nulae apparuerunt, saepius quidem febrem, aut
 fuisse aut finitum, aut fini proximum, sed haud raro
 cum vel declinare necdum coepisset, vel si coepisset, non
 manifesto declinare pergeret, ut dubium adhuc reman-
 gis, quam vellem, non relinqueret. Quemadmodum autem
 morbi siue, aut in declinatione iam certa, et in dies men-
 facta naturae victoriam confirmarent; sic ante declinationis
 initium, aut in dubia adhuc declinatione eandem victoriam
 ut plurimum portenderunt; namque aut morbus feliciter
 omnino desisset, aut si recidiva secuta est, ea lenior, brevior
 que fuit. Semel dumtaxat, quod alias scripsi, hydrope, et
 febrem exceperat, soluto, morbi alii graves, neque vici-
 ves, sed ii quoque eiusmodi, ut ex iis aeger convalesceret,
 successerunt. At semel omnino aegri interitus ex autumna
 maligna febre, quam ego neque ante, nec post illam
 diem inuisi, ut febrisne, an peccatum aliquid postea ex
 ipso, aut ab affidentibus, aut a modico, occiderit, pro
 nesciam, ut neque an arenae illae toto morbi tempore
 sent, an eo primum die apparuissent. Neque enim de
 loquor, quae semper, sed de iis tantum, quae vigore morbi
 declinationem iam accedente, aut hac inchoata, se prope
 incipiunt adhaerens superficiem, ut GRADIVS ait, utrinque
 non urinae, ut in sepulchro descriptum leges, ubi ne
 quidem, in quo haec scripsit, indicatur. Nempe latus
 praelata luce inspiciens, animadvertens vitreas matulas
 tribus areculas tenues adhaerentes, non nunquam tamen
 in urinae superficie natantes, subrufas ut plurimum, sicut
 perraro, quales in juvene quodam, cum febris maligna,
 periculis stipata declinaret, vidiſſe memini. De sed. et
 morb. Epist. 49. artic. 21.

§. CCLXX.

Epilepsia hereditaria, aut ex matris terrore, aut fantasiae perturbatione in foetu orta, aut ex vi- *Prognosis epilepsiae.*
 conformationis, aliisque causis innatis proficiens
 nunquam curatur. Longum esse solet malum,
 quo vehementiores, crebrioresque accessiones
 petit, eo periculosius; nam facile in apoplexiam
 lethalem definit. Quandoque una accessio vehe-
 mentissima hominem e medio tollit. Idque fere
 accidit, cum pluribus accessionibus superatis in unam
 vehementiorem incidit, quae eum demum enecet.
 Ergo, si accessione prehensus post aliquot horas ad
 se non redeat, et multo magis si per intervalla ite-
 rentur convulsiones, et sensus abolitos habeat, certum
 exitum expectari licet. Recens, et quae, licet
 crebros, breuiiores tamen habet paroxysmos, cura-
 tu facillior est, quam inueterata. Iure igitur HIP-
 OCRATES scripsit: *Quum aetatem adeptus fuerit
 morbus, non amplius curabilis est a*). Perniciem quo-
 que affert ea epilepsia, quae ex aqua inter cutem
 nititur, ut ex *Coacis b*) didicimus. Infantes recens
 aetatis corripiens, ut plurimum occidit. In seni-
 bus difficillime abigitur. Vtero gerentibus fortis
 epilepsia abortum saepenumero parit. Phrenitidi,
 ut maniae, aut melancholiae diuturnae succedens,
 iterumque curationem respuit, quia in cerebro vi-
 ta polyposa, aut aliae concretiones eam gignere
 hae sunt, ut ex cadauerum sectionibus c) patuit.
 Multa nobis praesagia de Epilepsia reliquit HIPPO-
 CRATES. Quibus, inquit, *epilepsia ante puberta-
 tem contingit, curationem recipit; quibus post viges-
 imum et quintum annum, eos fere comitatur ad mor-
 tem d*). Addidit aduerbium *fere*, quia ex his non
 ulli etiam sanantur. Similia prope repetit allibi e),
 ubi ait: *Quibus epilepsiae ante pubertatem contingunt,
 curationem habent.* Confirmat autem hanc senten-
 tiam

tiam alio in loco, dum subjicit: *Epileptici pueri maturatione maxime aetatis, regionis, et victus liberantur* (f). Id vero evenit pubertatis tempore potissimum, quo corpus firmatur, nisi epilepsiae causa in spinis quibusdam ossium calvariae, vel eorum carie, vel effusis humoribus, vel scirrhis cerebri tumoribus aliisque vitiis immedicabilibus sita fuerit, sed potius consistat in strumoso cerebri statu g). Sed nullius clarius, et distinctius se se explicuit HIPPOCRATES, quam in libro praedictionum secundo h), cujus haec sunt verba: *Ex his porro, qui a sacro morbo accipiuntur, difficillime quidem liberantur hi, quibus primo contingit morbus, et simul ad virilem aetatem pervenit; deinde hi, quibus corpore in vigore aetatis constituto factus est, et fuerit a viginti quinque annis usque ad annum quadragesimum quintum. Post hos autem, quibus factus fuerit morbus, nullam significationem praebens, ex qua corporis parte initium sumat. At, quibus ex capite initium capere videtur, aut aliter, aut a manu, aut pede, facilius curatur. Vnde differunt etiam haec morbi genera. Qui a capite initium sumunt, ex his gravissimi sunt; deinde qui a latere. Qui vero a manibus, ac pedibus, maxime sanari possunt. Hinc non modo pro aetatis, et vetustatis tum morbi, tum aegroti ratione varia prognosis statuitur, sed etiam illud declaratur, quod epilepsia difficillima omnium sit, quae sine ulla praecedente indicio corripit, itemque idiopathica; minus vero ea, quae sympathice gignitur. Haec enim postrema non raro aptae curationi obest. Symptomaticam quoque, si morbus princeps curationem admittat, vinci, ac depelli posse, docent observationes clinicae. Non nunquam paralyti, abcessu, scabie, aut quartana accedentibus malum finitur. Quae vero epilepsia cum aetatis flore evanescit, ex ARETAEI animadversione, quosdam de-*

format

De idiopathica et sympathica.

ormat, aut manum inutilem reddens, aut faciem torquens, aut sensum aliquem auferens. Ceterum non facile credendum est, victum remediis morbum esse, cum accessiones solito tempore non redeant; allax enim, et anomala est ejus natura. Tunc solum spes affulget, non amplius reuersurum, si aeger iam ab accessionum repetitionibus liber placide dormiat, bene appetat, alacer corpore, ac mente sit, bonum habitum acquirat, et rite egerat. Contra exitium timendum est, si morbus recurrere non desinat, interualla libera quam breuissima relinquat, accessiones longissimas habeat, quibus altus, et diutinus somnus succedat, nec medicamentis discutiat^{ur i}).

a) *De morbo sacro* XIII. 15. b) *N.* 459. c) *FELICI Diff. Del Presag. medic.* p. 155. d) *Aphor.* 15. sect. VII. e) *Aphor.* 7. sect. V. f) *Aph.* 45. sect. II. g) *RUSSEI Oeconom. nat. in morb. acut., et chronic. glandul.* Lond. 1755. p. 96., et *Comm. Lips.* Vol. V. p. 472. h) *N.* 16. i) *AND. PIQUER Prax. medic. Part. I. lib. I. cap. IX.* p. 113.

C u r a t i o.

§. CCLXXI.

In cujuslibet morbi, atque adeo cujusque convulsione, et spasmi curatione ad causas (§. CCXLIX. *et segg.*) respicere oportet. Hinc plethora, ubi peccat, tollenda statim est sanguinis missionibus. Serosa vero colluies hydragogis, diureticis, sudoriferis, sialagogis, vesicantibus, epispasticis, aliisque euacuantium generibus. Hic praecipue diuretica GORTERIO et SWIETENIO probantur, tum in primis, cum morbus a retento, resorptoque lotio effectus est. Inter haec non nulla sunt, quae antispastica etiam facultate se se commendant, ut succinum album, sal ejus volatilis, liquor cornu cervi succinatus, millepedes, lumbrici terrestres, coccinella,

cinella, spiritus nitri dulcis, gummata ferulacea, et similia. Atque haec ipsa locum habere possunt tum etiam, cum lenti, et crassi humores cum solidarum partium laxitate, et atonia morbum aut faciant, au foueant. Inanitas ab haemorrhagiis, aut hypercatharsi, aut quibuscunque nimis euacuationibus postulat analeptica, instaurantia, nutrientia, cardiaca et paregorica. Si nimia partium sensibilitas, aut irritabilitas, aut dolores acerbi, aut vigiliae protractae in causa fuerint, omne anodynorum genus prae ceteris opium remedio est. Haec ipsa conueniunt, ubi ex pauore, terrore, ira, neruorum anxia orta est. Interdum auxiliantur sanguinis detractione, liquor anodynus mineralis *HOFFMANNI*, acetum vitrioli, spiritus antepilepticus *PRZOLHTI*, moschus, camphora, castoreum, assa foetida, emulsa feminum frigidorum, et papaueris albi, syrupus de meconio *SYDENHAMII*, oleosa, mucilaginea, balnea tepida, enemata mollientia, et similia. Acida e fossilibus educta vim nerueam, atque irritabilitatem minuere dicuntur; ac propterea hic quoque accommodata reputantur, praesertim vini spiritus probe edulcata, et correcta.

§. CCLXXII.

Quid agendum, ubi causa venenata est.

Venena ingesta, deglutita, comesta, atque in plantae venenatae, ut cicutae, belladonnae, phellandrium, coriariae, et boleti, oleo, butyro, lacte, hydromelle, oxycrato inuoluuntur, mitigantur, corriguntur, et demum emeticis, catharticis, clysteribusque expelluntur. Tanta oleosorum vis est in sedandis spasmodis, et conuulsionibus, ut eas a veneno sumto genitas balneo ex oleo tepenti comperuerit *FRANC. HIPPOLYT. ALBERTINIVS* Clinicus Bononiensis celebratissimus a). Verum etiam a causa interna natas oleum intrinsecus datum mirae saepe

pe praestat. Patricium virum jam ab anno consensionibus obnoxium, datis binis uncias olei quod vespere coenae loco ad longum tempus, liberat. **WALLISNERIVS & MORGAGNIO** b) memoratus. Vermes, cacoehylia, meconium anthelminthicis, *Vermes, cacoehylia, meconium* eos, eccoproticis, saponaceis, felle bouillo confato, melle, enematibus dejiciuntur. Cruditas quid possunt? *Cruditati acidae quid medeatur? Capitis laesionibus.* Cruditatis, abforbentibus, sapone veneto, amaris, rhabarbro, ejusque syrupo. Irritationem a cranii, catistisque laesionibus inductam terebratio, aliaeque chirurgiae remouent; id quod vsui etiam est in his sedibus, si ex earum consensione malum fiat. Nervus enim punctus, semisectus, aut quavis alia *Nervus punctus, semisectus etc.* ratione distractus, discindi debet; vulnus angustum impliari; ossiculorum fragmenta eximi, aliena educatione, consensioque vinculis intercipi, dolor accommodatis remediis leniri.

a) MORGAGN. De sed. et caus. ep. X. n. 21. b) Ibid.

§. CCLXXIII.

Convulsionibus, quae octavo, nono, decimoque plurimum mense pueris dentientibus accedunt *Convulsionibus a densitione.* in gingivarum tumore, dolore, rubore, febre, yalismo, ventris fluxu, nihil unquam citius, efficaciusque, **SYDENHAMIO** auctore a), compescit, cum sanguinis missio. Ab eodem ad eas sedandas proponuntur paucae spiritus cornu cerui guttae, et aliqua cephalica dilutae, et syrupo idoneo edulcat. Liquorem cornu cerui succinatum praestitit **FRANCISCUS SCARDONA**, qui ex ejus vsu multis saepe effectus obtinuisse affirmat b). Alterutro, aut res postulare visa est, interdum ego quoque is sum non sine emolumento. Interea, si fieri possit, gingivae ipsae mulcendae, laxandaeque sunt in fricatione, linimento anodyno, syrupo althaeae,

mucilagine seminum psyllii, et demum, si tentio et dolor vrgeat, scalpello etiam aperiendae, vt de prodire possit. Dolori, et spasmo consopiendo et let quoque cochlear parum syrupi diacodii, p denter ad intervalla propinatum.

a) *Oper. sect. IV. cap. V.* b) *De cogn. et curand. mor. lib. I. p. 167.*

§. CCLXXIV.

*Conuulsioni
in morbis
exanthema-
ticis.*

Vbi conuulsio variolarum, morbillorum, aut purae scarlatinae eruptionem antecedit, eidem currendum est, ni cito cessauerit, emplastro cerifico ceruici posteriori illico admoto, et praeparato intrinsecus aquae epidemicae cochleari cum laudanum liquidum guttis quinque, ex SYDENHAMIA a), et MEADII b) consilio. Neque, si sanguinis copia simul adsit, alienum videtur sanguinem mittere, et balneis, fotibusque tepidis uti. Lactenti puero conuulso remedium, quod habet aquae cerasorum nigrorum unciam, spiritus cornu cerui quinque guttas, requiei Nicolai grana decem, syrupi violacei binas drachmas, cochleatim, et subinde datum commendatur a quibusdam. Nec tantum infantes puerisque, sed etiam matribus ipsis parientibus tutulari oportet. Nam hae quoque inter vehementes partus dolores, conatusque, congesta circa rebrum sanguinis copia, in dirissimas conuulsiones quandoque incidunt. Tunc volatilia, spiritus, que antispastica calefacientia cane pejus, et affugienda sunt. Sed protinus danda opera est, ut foetu expeditissime liberentur. Sanguinis etiam iterata saepe conuulsiones sedat, et praeparat accelerat c). Si id non iuuerit, manu extrahendum oportet.

*Conuulsioni
a partu.*

a) *Dissert. epist.* b) *MEAD. Oper. p. 43.* c) *MARRIGEAU T. I. l. 2. c. 28. SMELLIE Reflex. on slow & painful Labours etc. p. 60. et seqq.*

§. CCLXXV.

§. CCLXXV.

Vitia quoque sanguinis, peculiareque ejus acritates, a quibus morbus vel excitatur, vel sustinetur, contrariis emendandae, reuellendae, euacuandaeque sunt, diluentibus nempe, attenuantibus, demulcentibus, inuoluentibus, diaphoreticis, antacidis, antialcalinis, antiscorbuticis, antiuenericis, itemque balneis, frictionibus, fonticulis, epispasticis, setaceis, et qualvis excretiones leniter promouentibus. In primis inter alterantia laudantur succi cichorei, taraxaci, fumariae, melissae, beccabungae, nasturtii aquatici aut ex his parata decocta, aut diluta; serum lactis; lac ipsum; jura ranarum, cancrorum fluuiatilium, viperarum, auenae; aquae medicatae; decocta lignorum; antimonium crudum; aethiops mineralis, mercurius, aliaeque id genus, quorum delectus, vsusque caussis, indicationibusque variis prudenter, ac scite accommodandus est. Venericos stimulos, seminisque copiam, nam hinc quandoque conuulsiones nascuntur, imminuunt, cohibent, et arcent venaesectio, victus parior, et refrigerans; abstinentia, aquae potus, antiphlogistica, aescencia, nitrum, cassia, manna, tamarindi, cremor tartari, semina melonum, cannabis, agni casti, folia nymphaeae, et conjugium. His non nulli addunt camphoram, sed perperam; nam potius ad venerem excitandam, quam consopendam valere ipsa videtur. Contra si malum veneris, aut vini abusus, aut diuturna animi pathemata procrearint; continentia, castitas, vini abstinentia, balneum frigidum, cortex peruianus, cascarilla, chalybs, peregrinatio, vectio, exercitatio, aëris, regionisque mutatio, cibi euchymi, ac demum lac robur infirmo corpori, et debitum nutrimentum restitunt. Reuocandae porro sunt euacuationes suppressae, si hae morbo ansam dederint.

*Conuulsioni
a sanguinis
vitiis.*

*A stimulis
venericis.*

*Ab veneris,
vini abusu,
ab animi pa-
thematibus.*

*A suppressis
euacuationibus.*

In

In pueris saepe crusta lactea, aut vlcera manantia, si exaruerint, conuulsionibus causam praebent. Tunc capiti rasō imponi debet aliquid, quod exulceret. Experientia comprobatum est illud, quod constat ex vncia emplastri de meliloto, et pulueris cantharidum drachma vna. Intrinsecus vtiliter etiam datur puluis, aut decoctum *lactae tricoloris*, quae *flos trinitatis* in officinis nuncupatur*). Specificum enim remedium a STRACKIO perhibetur. Vis certe ei inest, qua extrorsum crustae materia propellitur. Vbi pueri remedium respuunt, nutribus, a quibus lac sumunt, datum non caruit effectus.

*) Vulgavit hujus remedii aduersus crustam lacteam tantum laudes peculiari opusculo Cl. STRACKIUS, qui per annos viginti tuto, et bono effectu se usum esse testatur. Decoctum sic paratur: *Rec. Foliorum lactae distae floris Trinitatis recens. vel flocas. m. j. concis. decoq. in lact. vaccini q. s.* Colatura detur potui mane, et vespere. Pulveris forma sic adhibetur: *Rec. Foliorum distae herb. in umbra siccator. q. v. contund. et f. pulv.* De hoc sicut drachma dimidia, et infundatur per datas horas in vaccini q. s. Deind. bull., et mox cola per seccam. Cula haec detur mane, et repetatur vespere. Potest huiusmodi remedium panatellae, aut ossae adjici, prout melibuerit. Lac non inde acescit, non fit nauseosi saporis, sed condensatur in cremoris speciem. Primis octidibus, quum sumitur remedium, crusta lactea augetur, si non est, sitque manifestior et crassior, et diffusior, et vis foeret. Si non est, et latitat intus, expellitur, foras prodit. Continuaturs eius vsus, donec omne malum fese exseruerit. Postea crustae exsiccantur, et decidit quod vtplurimum contingit post quatuordecim dies. Crustarum lapsum oportet per aliquod adhuc tempus remedii vsu persistere, vt fomes omnis extinguatur. tat enim Auctor ex peculiari fermento a matre, aut trice communicato id mali oriri, quin tamen eius remedium definire audeat.

§. CCLXXVI.

*Curatio
specialis.*

Haftenus de remediis, quae vniuersis conueniunt, suis morbis opportuna esse possunt; nunc de

qua

quae speciatim quibusdam eorum magis propria dicuntur. Atque vt a Tetano terribili plane, et simul rarissimo plerumque apud nos morbo ordiar; hunc, ejusque varias species, et gradus conuenientissimum est, si vires ferant, et in primis si cum febris, et diathesi sanguinis inflammatoria copulatur, aggredi, quidquid contra sentiant non nulli a), venae sectione, balneo aquae tepentis, aut olei, enematis, fomentis, vnctionibus, quae molliant, laxent, et blande resoluant, spinae dorsi adhibitis, camphora, moscho, aliisque antispasticis.

Tetani.

Iuue- *Historia Tetani a Störckio curati.*
 nis quindecim annorum citra euidentem causam, postquam aliquot dies per omnes artus dolorem lancinantem conqueustus est, incidit in Tetanum uniuersalem.

Brachia, et manus secundum trunci longitudinem extensas habebat, rigidissimas, et trunco firmissime appressas, crura, et pedes eodem modo affectos. Venter erat tenuis, contractus, et lapidis instar durus, attactu non dolens, spina dorsi rigidissima, collum immobile, maxillae pertinaciter clausae, muscoli masseteres, et temporales tumidi, et duri. Inter dentes incisores fractos exiguum erat spatium, per quod aliquid iussu, aut medicamenti ingeri potuit. Lingua tamen mansit volubilis, oculi viui, mens non oppressa, respiratio satis bona, pulsus aequalis, naturalis non celerior, liber. Hunc sine balneis, et fomentis, quae in nosocomio administrari non licuit, paulatim liberauit.

Cl. STÖRCKIUS equino stercore in cereuisia cocto, solide diligenter applicito; spiritu salis ammoniaci acetato saturati ad drachmam ex tribus aquae rutae racis cochleatim dato; inuncta, et fricata bis in die spina dorsi oleo verbasci, et spiritu salis ammoniaci; cucurbitulis siccis alterno die humeris, et spinae impositis b). Non nullis probantur balnea frigida, in primis si aeger carnosiore corporis habitu donetur, et tempestas aestiua, et praecalida sit.

Frigore

Frigore enim nerueam sensibilitatem sopiri, sanguinisque feruorem temperari non negauerim. Verum ex frigore, et humiditate saepe morbus ortu ducit. Quare haec prudentissimum, et consultissimum medicum desiderant, ne temere adhibeantur.

*Opium vires
praedicantur.*

Omnium vero praestantissima hodie praedicantur et opio parata remedia, audacter, et brevioribus intervallis administrata. Opio enimvero Tetanum cito solutum vidit HOMIUS c), cum reliqua omnia irrita cessissent. Tetani quoque curationem opio initam laudat IO. CHR. ANT. THEDENIUS d).

vim aduersus opisthotonum extollit GUILIELMUS PARR. Is grano opii singulis horis primum, inde altera quaque hora dato, et balneis calidis morbum mitigauit; postea aucta dosi, et continuata sic, ut intra diem grana amplius viginti fumerentur, etiam deuicit. Demum minuit paulatim ejus dosin. Interea tamen vsus est etiam iulapio ex aceto, et camphora, aliisque id genus e). In tetano trismo symptomatico, puta fracturae ossis femoris superueniente, vtilitatem laudani liquidi experiri comprobauit etiam FRID. CHRIST. WINSLOWIUS f).

Moschi laudes.

Opium pariter, et moschi largiores doses, et opportune iteratas commendat WILLELMUS HILLARIUS g). Opisthotono in Carolina meridionali aliisque regionibus calidis familiari (§. CCLV. not. *) ex frigore corporibus calentibus suscepto nocent remedia calida, acria, vesicantia, nec aliquid boni, animaduertente LEONELLO CHALMERIUS h), praestant mitiora euacuantia, emetica, diaphoretica, sic contra balnea calida, opium largius datum, et in plethoricis sanguinis missio vi-

Euacuantia, emetica, et diaphoretica.

Balnea calida, opium, sanguinis missio.

spem faciunt. In balneo autem detinendos esse magis gros suadet ipse, donec pulsus mollior, et plenior euadat. Collum, dorsum, et pectus, dum in balneo jacent, fricandum iubet. Opium repetendum dosin,

fin, quando prioris actio jam defuit, sicque conuandam ejus praebitionem, donec spasmus sub rtilagine ensiformi, discrucians, aliaeque conuulnes se se remittant. Nec omittit interim clysters, fots, linimenta, et aliquot diebus post solum spasmum lene eccoproticum dare. Opisthonom, et trismum, siue spasmum maxillae inferioris, qui vulneratis aeri improvide expositis superaiunt, curauit RICHARDVS HVCKIUS i) medicus strensis graho vno opii qualibet hora per nychemerum exhibitò, aut vncia dimidia moschi sacaro remixta, et cum opii drachma subacta, et lapio aliquo excepta, cochleatimque identidem ita, vt tota compositio intra horas quatuor et vinti absumeretur. At, si quid iudicò, limitandae *Cansio circa opium.* opii laudes; neque ad tam largam dosin vniam ascendendum est, nisi prudentissime explorata prius primarum dosium tolerantia, atque actione temerario ausu, quod saepe vidimus, cum iuvo aegri vita exstinguatur. Profecto qui opium inu liberaliori propinare non timent, felices tantueuentus videntur commemorare, funestos vet et lethiferos casus silentio praetereunt. BILGERVS, etsi opium ab aliis laudari videat, prudissime tamen ejus vsum non modo perstringit, um etiam reprobat, ex eo quod neruos inde detari putat l) *.

a) HILLARY med. obseruat. b) Ann. med. I. p. 10. c) *Sup. medic. sect. VI.* d) *Comm. Lipsiens. volum. XVIII.* 514. e) *Medical observ. and Inquir. T. 4. P. 4. et m. Lips. Vol. XVIII. p. 394.* f) *Collect. Socier. me-Hauniens. vol. I. p. 304.* g) *Obseruat. on the changes the air Lond. 1759.* h) *Med. obs. and Inquir. T. 3.* 26. i) *Med. observ. and Inquir. ann. 1758. p. 87. et m. Lips. Vol. 8.* l) *L. c. p. 100.*

) Cl. quoque 10. BAPT. MARZARIUS in puella tetanomatico laborante, cujus obseruationem supra indicaui, pessima

peffima effecta ex opio notauit, et praefertim fynco-
crebras, et prope lethales. An ex peculiari idiosyncra-

§. CCLXXVII.

*Tetani sym-
ptomati.*

Tetanus tam vniuersalem, quam particularem
ac praefertim maxillae inferioris, vti symptom-
non modo vulneribus, quod paullo ante ex *HVC*
animaduersum est, verum etiam amputationibus
fracturis complicatis, interdum vel simplicibus, le-
xationibusque superuenire, frequentissima chirur-
gorum obseruatio est. Id praefertim in India Ori-
tali passim obseruari narratur. Plerumque
post amputationem die inuadit huiusmodi morbus
et post quatuor, aut quinque dies occidit. Ex-
plum tamen adducit *Cl. BISSETVS* hominis die de-
cimo sexto sanati. Vnicum auxilium ipse con-
dit esse in cortice peruiano, praefertim in regi-
nibus calidioribus, vbi gangraena facile subsequitur
decocti forma largiter hausto, et membris ampu-
tis per splenia ex eodem expressa assidue adhibere.
Trismus vulneratis superuenientem curat
ries Cel. BIGGERVS aa) epispasticis, vesicis
incisionibus genarum, quibus deinde infunditur
oleum terebinthinae, sectione venae iugularis
arteriaeque temporalis, clysmatibus nutriti-
et volatilibus. Venae sectione vero iterata,
ventriculi inflammationi succedit, Tetanus
idem *BISSETVS* affirmat; quod sane verosimili-
mum est. Tetanus vniuersalem sympathicum
di ex vulnere in metatarso pedis, quod sibi faler-
fixerat rusticus quidam, iusto citius coalito.
proluit in primis balneum aquae calidae, et
ris apertio, ac renouatio, vt pus aut ichore
tentum effunderet *b)*. *Cl. MONROVS c)* ad
curationem proponit inunctiones mercuriales.
DE LAROCHEVS Tetanus feliciter curatum narra-

*De sympa-
thico obser-
uatio.*

Nec dissimilem euentum eodem remedio expertus est BOVEIXIVS e).

a) *Medical Essays and observat.* vol. 3. pag. 96, ad 100.
 aa) *Nouveaux Mémoir. de l'Acad. Royale des scienc. et bell. letr. de Berlin an. 1770.* p. 60. b) *Historiam* vide in *Sagg. di medicin. pratic.* P. 2. p. 93. c) *Essays d'Edimb.* vol. 3. d) *Journ. de Médéc.* T. XL. p. 213. e) *Journ. de Médéc.* Septemb. 1774. p. 222.

§. CCLXXVIII.

Ad choream S. Titi, siue Scelotyrben SAVVAGESII quod attinet, hanc, si SYDENHAMIO fidem habemus, curat iterata sanguinis missio, et crebra interposita alui ductio a). Deinde in auxilium vocanda sunt antispastica; et membris affectis cucurbitulae siccae admovendae, ac demum adhibenda quae roborandi vi pollent, vti cortex peruvianus, ferrum, et balneum frigidum. MEADIVS quidem nunquam sibi arduum, ac difficile fuisse scribit choream S. Viti penitus euellere crebris in frigidam corporis immersionibus, et medicamentis ex chalybe paratis b). Puerum chorea S. Viti laborantem per anthelminthica a GAVBIO liberatum c) legimus. Puellas decenni hoc morbo correptae electricitatem efficacissimo exitu applicuit MAX. IAC. DE MAN d), Electricitatem quoque adhibebat ALLIETVS Gallus, sed praeterea diluentia, aperientia, antifebrilia, roborantia, aëris mutationem, bona alimenta, et praeter ceteris corporis exercitationem e). Aliquam etiam utilitatem percipit ex cortice peruiano, exercitio, et congrua victus ratione mulier vtero gerens, quae in choream S. Viti inciderat f). Cl. BISSERTVS vtilissimum praedicat electuarium, dummodo diu assu-

Chorea S. Viti.

Biffeti electuarium.

palum, syrupi simplicis ex saccharo q. s. vt f. electuarium. Decrescente morbo laudat vsum tincturae corticis peruiani, et balnea ex aqua marina, cuius vtilitatem saepe se esse expertum narrat, dum a balneis aquae fluuiatilis detrimentum potius vidit. In contumaciori malo etiam vesicans posteriori, et demum ossi sacro impositum prouersisse narrat; licet etiam frictionem repetitam colli, et totius spinæ spiritus vini ope administratam. Contra sanguinis missiones, et catharsin nocuisse affirmat, secus ac

Affae foetidae laudes.

SYDENHAMIVS observauit g). Quinque historis P. S. WALTERS ostendere nititur vim antispasticam affae foetidae liberaliori manu adhibitae non modo in chorea S. Viti, verum etiam in aliis morbis convulsivis grauissimis, et complicatis cum paralyfi, epilepsia, et mania. Soluit ipse drachmas tres affae foetidae in vnciis sex aquae fontis, et saporis gratia addit vnciam syrupi violarum. Ex hac miscela cochlear vnum, vel duo singulis mediis horis ad aliquot dies sumendum praecipit, sensimque minuendam praebitionis frequentiam, statim ac morbus mitescere videtur h). MAHONIVS antispastica pariter, et corticem peruianum experimentis comprobauit, vt praestantissima ad citrandam huiusmodi affectionem, saepe contumacem i). Nuper confirmatam, et numeris omnibus absolutam choream S. Viti in puella duodecim annorum, quae ante aliquot annos eodem morbo diu laborauerat, solo florum zinci usu tuto, cito, et jucunde curavi.

Observatio de floribus zinci.

a) Oper. Process. integr. p. mih. 686. b) De imp. sol. et lun. p. 17. c) Comm. Lips. vol. 3. p. 456. d) Comm. Lips. vol. XVIII. p. 601. e) ORTESCHI Giorn. med. T. 2. p. 127. f) Giorn. med. T. 3. p. 67. g) Medical Essays and observ. citat. p. 165. ad 170. h) Journal de Médecin. An. 1781. i) Journ. de Méd. lun. 1782. p. 553. T. LVII.

§. CCLXXIX.

Supra (§. CCLXXVIII.) notatum est, electricitas ^{Monitum de electricitate.} tem conuulsiuae affectioni, quam choream S. ^{Viii} vocant, remedio fuisse. Sed scire libet, hanc ipsam, et praecipue electricum, ut loquuntur, ictum quandoque conuulsiuorum motuum causam esse. Hos ex ista causa genitos, et continenter incrementos, mescho ad drachmam semis quarta quauis hora primum, deinde bis in die tantum boli forma dato sedauit Cl. OWENIVS a). *Spasmus* item *physi-* ^{Cura spasmu physiodes.} *fodes*, siue crampus, quamquam ut plurimum cito euanescere soleat, et vix medici opem possit, tamen interdum adeo molestus est, et praesertim mulieribus vtero gerentibus, ut aliquod auxilium adhibendum sit. Plerumque sola partis conuulsae leni fricatione, aut illitu spiritus baccarum juniperi, theriacalis, aut aquae reginae Hungariae fugatur. luvat etiam a frigore arcere, et panno laneo calido contegere. Si haec non sufficiant, dispicere oportet, num plethora in suspicionem veniat? Si haec utique sit, sanguinis missione cito curatur. Interdum vero a lymphâ acri, et tenaci musculos quosdam, eorumque involucra infestante exeat, ut non raro vidimus. Tunc balnea, fomenta, et decocta lignorum, quae attenuant, et respirationem sudoremque cient, morbum paulatim depellunt.

a) *Med. observat. and Inquiries by a Society* vol. 3. p. 183.

§. CCLXXX.

Tandem de peculiaribus epilepsiae ipsius cura ^{Cura epilepsiae immit-} tionibus aliquid dicere oportet. Si ejus accessio ^{nensis.} se suis indiciis instare prodatur, ut quandoque fieri solet, eam praeuertendam jubent Auctores opio cum antispasticis copulato, exempli causa laudani nepenthis Quercetani grano, et pari camphorae pondere

dere in bolum conferua aliqua, vel extracto idoneo compactis. Quod si ab aliqua remotiore parte ad caput morbus adscensusus praenoscat, injecta ligatura forti, frictionibusque dolorificis eum inhiberi decet. Loco etiam peculiari, a quo inchoare morbus, et progredi videtur, cucurbitula scarificata, hirudines, aut ferrum candens imponi potest non sine probabili interioris causssae destructione. Quaedam mulier annos circiter triginta et octo nata jam a duodecim annis laborabat epilepsia, semel in mense redeunte. Sed tandem accessiones ita increverunt, ut quater, aut quinquies qualibet die retererentur, singulaeque horam, aut sesquihoram durarent. Tentata fuerant omnia euacuationum genera, itemque plurima antiepileptica, et cephalica, aliaque non pauca, sed frustra. Paroxysmi nunquam non exordiebantur a crure circa inferiorem partem musculorum, quos geminos vocant, et statim capite occupato mulier prolabebatur. Circa os tunc spuma cernebatur; labia, collum, atque artus miris conuellebantur contorsionibus. Mulier dum a THOMA SHORTO inuisebatur, paroxysmus correpta, et in terram prostrata, ipse in crus affectum inquit, nec quidquam in eo tumoris, aut ruboris, aut duritiei, aut laxitatis reperit, quo a sinistro differret. Attamen causssam eo in loco, unde morbus semper inchoabat, suspicatus, illico scalpello ad duos digitos transuersos eodem adacto offendit in corpusculum quoddam durum, quod a musculis leniter sejunctum Volsella demum extraxit. Erat autem quid durum, ac cartilagineum, fere ganglium pisi majoris magnitudinem aequans, et nervo cuidam, quem rescindere debuit, ut exire posset, desuper innixum. Extemplo ad se rediit mulier, et exclamavit, se optimè habere. Citissime vires mentis, et corporis acquisiuit, nec ab eo tempore

tempore vnquam epilepsiam a) passa est. Chroni- *Observatio*
cam, et habitualement pariter epilepsiam sympathicam, *alia.*
quae a pollice pedis initium sumebat, curauit
HENRIC. NICOL. HERBERTVS *ligatura supra genu,*
neruulique in pedis pollice destructione facta b).

a) *Essais, et observ. de Médec. de la Societ. d'Edimbourg*
T. IV. p. 523: *edit. de Paris in 8.* b) *Comment. Lips.*
vol. 4. p. 233.

§. CCLXXXI.

Cum vero jam epilepsia hominem inuasit, quam *In epilepsiae*
primum omni ope nitendum est, vt ab ea mini- *paroxysmo.*
mum, quoad fieri potest, incommodi, nihilque
damni ex violenta corporis iactatione capiat aeger.
Itaque is in lecto, et loco potius lucido, et capite
elevato componatur. In os vi diductum corii fru-
stum, vel linteum duplicatum, vel pannus indatur;
ne lingua dentibus abscindatur. Optimum quo-
que est membra conuulsa leniter extendere, oleo
inungere, ac perfricare, blande collum, guttur, ca-
put, aliasque partes manu calida lenire, hypochon-
driis, ventrique vesicam aqua calida semiplenam,
aut fomenta emollientia admoouere, quibus non so-
lum spasmi citius sedantur, verum etiam respira-
tio ipsa facilius redditur. HIPPOCRATES, referen-
te SWIETENIO, vinum, cui semina hyoscyami in-
fusa essent, oleo adjiciebat, eoque linimento, vt
stuporem inducente, membra conuulsa inungi cu-
rabat. Quod si paroxysmus diutius trahatur, aeger-
que alto fere sopore obrutus videatur, vt apople-
xiat metus immineat, ad validiora licet auxilia con-
fugere, ligaturas videlicet dolorificas artuum, cucur-
bitulas ficas, odoraamenta ex oleo succini, spiritu
cornu cerui, salis ammoniaci, tincturam castorei,
aut assae foetidae naribus admouendam, enemata,
atque alia ad excitandum idonea. Sed omnibus
fere praestat sanguinis missio in primis ex jugulari
vena,

vena, aut arteria temporali, dummodo neque a inanitate, neque a virium defectu morbus pendeat. Sub longiori enim muscularium partium contractione, etsi clonica, et alterna, fieri non potest, quin sanguis copiosius ad cerebrum propellatur, ejus vero reditus ad cor plurimum retardetur, sic, et a vasis, sinubusque meningum turgentibus cerebrum undique opprimatur. Quo in casu nemo non videt, quantaе utilitatis sit futura vasorum depletionis et cerebri per phlebotomiam exoneratio. Plurimum utilissime ea usus sum in protractis paroxysmis, praesertim ubi plethora, tam vera, quam spuria, et aliqua sanguinis consueta euacuatio cohibita, aut podagrae, arthriticaeque materiae metastasis, aut graue, et subitum animi pathema originem morbo dederat.

§. CCLXXXII.

*Extra paroxysmum pro
causarum
ratione.*

*Remedia
chirurgica.*

Extra paroxysmum causa indaganda est, quae morbum fecit, et pro ejus ratione omnis curatio instituenda, non secus, ac supra in vniuersum de morbis conuulsivis (§§. CCLXXI. CCLXXII.) curandis praecepimus. Primum chirurgica praesidia nobis se sistunt. Ex his sanguinis missio opportunum videtur, ubi plethora, ubi bonus habitus, ubi aetas florida, ubi menstrua, haemorrhoides, aut haemorrhagiae narium suppressae occurrunt. Repeti quoque potest ad prophylaxin circa aequinoctia, interdum etiam circa solstitia in magis plethoricis. Si haemorrhoidibus obnoxii fuerint aegri, hirudines etiam ano applicari conuenit, ut iterum natura et consuetas euacuationes reuocetur. Id etiam hypochondriacis, atque hystericis utilissimum est, in quibus saepenumero epilepsia ex viscerum infimi ventris congestionibus oriri consuevit. Si morbus et menstruorum cessatione superuenerit, et periodice quasi quouis mense recurrit, eorum vices supplet parua

parua sanguinis missio singulis mensibus paullo ante consuetum catameniorum tempus celebrata, donec accessiones desistant, et vires ferant. Vidi hac methodo vltra annum continuata sublatam epilepsiam ex hac causa ortam *). Non nulli cauteria paullo infra occiput, aut suturae coronali inusta proponunt; et reapse interdum egregiam opem ab his praestitam esse testantur obseruationes a). In pueris maxime fonticulus ceruici posteriori inustus, quando pleniores, succosioresque sunt, aut serosa colluies in iis praeualet, aut crusta lactea repressa est, plurimum emolumenti quidem saepe attulit. Tutiora tamen in quibusdam videntur vesicantia, neque minus vtilia, si diu vlcera aperta seruentur, Quinquennem puerum jam a biennio in epilepsiam, quoties dormire inciperet, incidere solitum, atque hinc hebetem factum, et cruribus resolutum, vt his non posset amplius insistere, FRANCISCVS SERRAVS post innumera incassum adhibita solo vesicanti circa posterius suturae sagittalis extremum imposito integre ab epilepsia, et crurum resolutione liberauit b). MEADIVS vero occiput cantharidibus exulcerabat, sinebatque, auulsa epidermide, diu serosum humorem effluere, optimo semper, vt affirmat, effectu c). Sed multo ante eos vesicantium efficacitatem in huiusmodi morbo capiti derasso impositorum expertus est LVDOVICVS SEPTALIVS, cuius verba hic iuuat exscribere: *In confirmata epilepsia per proprium cerebri affectum si quis, derassis capillis, vesicantibus per vniuersum caput utatur, atque ad peripheriam humores virulentos trahat, diutius ulcusculis eutim capitis infestantibus relictis, vt per longum tempus serosi illi humores per ulcuscula emanent, optime curationem instituet. Contumacissimos enim capitis morbos huiusmodi ratione curatos vidimus d).*

*) Simili methodo etiam in epilepsia idiopathica vultur CL. ROSETTVS, medicinae Professor Caesenaë, et Clinicus non indoctus, amicusque noster singularis. Is per epistolam me certiore fecit, plurimos epilepticos a se curatos fuisse hac omnino ratione. Primum rhabarbarum, vel manna, vel cassia aegrum leniter purgabat. Deinde biduo ante plenilunium uncias quinque sanguinis detrahi ex saluarella jubebat; idque singulis mensibus iterabat, excepto Aprili et Octobri, in quibus venaessectionis loco hirudines ano admovere satius ducebat ultimo lunae decrescentis radio. Reliquis mensibus, ut dixi, e saluarella sanguinem mittebat, hoc tamen ordine, ut primum a sinistra manu initium faceret, deinde ad dexteram procederet, et sic alternatim, donec exacti essent duodecim menses. Hoc tempore, toto scilicet anno, quovis mane ex jure tenui propinabat drachmam pulveris testiculorum equi, vespere vero hora somni tempora, occiput, cervicem, et naris oleo saponis inungi præcipiebat. Victum imperabat ex jusculis, ovis, et carnibus elixis, potum vero solam aquam ex jujubis decoctam, et chalybe ignito alteratam. Animadvertit, hanc methodum convenire dumtaxat epilepsiae a copia, aut fervore sanguinis genitae, et juvenibus, plethoricisque hominibus. Sic ROSETTVS in sua epistola. De hac curandi epilepsiam ratione, si bene memini, mentio fit etiam ab aliis arcanorum scriptoribus atque empirica medicamenta undique colligentibus.

a) HEISTER. *Instit. chirurg.* P. 2. p. 38., et ante eum CAR. PISO *De morb. cap. sect. 2.* P. 2. cap. VII. b) MORGAGN. *Epist. anat. med.* X. n. 8. c) *De Imp. sol. et lat. cap. 2. p. 8.* d) *Anim. et caution. medic.* VI. n. 55.

§. CCLXXXIII.

*Remedia
pharmaceutica.*

Pharmacia quoque multa medicamenta suppeditat ad epilepsiam profligandam. In his euacuantium omne genus passim extollitur, sed prae ceteris emetica, et cathartica. In ea specie, quam purgantium viarum saburra sympathice gignit, profectum ea, quae alium per epicrasin ducunt, non infimum locum tenent. Hac prope purgationis ratione Grammaticum curavit GALENVS, quemadmodum animadvertit opportune FELICIVS a). In purgantium

in vero medicamentorum usu illud fere inualuit, ea ante nouilunia, plenilunia, et quadraturas uti dari videantur. In epilepsia sympathica a primarum viarum cacochylia, quam omnino in pueri frequentiore agnouit BAGLIVIVS b), curatio in ipse moliebatur sale vitrioli ad scrupulum, vel schmam in jure carnis dato, quo vomitus exciur, excutiturque quidquid interdum cathartici obediuerit. Alii id tentant radice ipecacuan-
*In Sympa-
thica.*
 tartaro emetico magna aquae copia diluto, oxyle scillitico, syrupo nicotianae, aliisque emefin-
Emerica.
 monentibus: nec in sympathica hac epilepsia tummodo id faciunt, verum etiam complures idiopathica audendum volunt. Ac quanquam in iis desint feliciū curationum, quas hac via tinuerunt, exempla, non desinam tamen in memoriam reuocare ea, quae alias de cauto, et fere describendo emeticorum in morbis capitis idiopathicis usu protulimus. Aliis magis placent cathar-
Cathartica.
 tica. Horum ope sperant, impactum cerebro, nervaeque noxium humorem dimoueri, attenuari, aliorum allici, et demum excerni posse. Neque ab helodoro ipso, a colocynthide, ab elaterio, aliisque sticticis temperant. Narrantur per haec mirae etiam epilepsiae habitae curationes. Vendita olim Bononiae arcanum muliercula, quo multi aeti dicebantur. Erat autem, ut putabatur, tinctura colocynthidis ope spiritus vini elicita, cujus unus cyathus singulis diebus per aliquot hebdomadas dari consueuerat. Noui virum nobilem, qui,
Observatio.
 arcanum illud aliquo cum leuamine assumsisset, epilepticus tamen ad senium usque permansit. Ceterum non negauerim cathartici quandoque radices causam epilepsiae euelli posse, sed maturam, et lentem sapientis medici deliberationem expone-
 eorum usus; non enim cuius temperamento,

aetati, sexui, habitui corporis, et causae oportere esse queunt *).

a) *Dissert. del presag. med.* p. 198. b) *Appendix Asthmae.*

*) De emeticis, et cathartics in epilepsiae curae caute adhibendis audiendus omnino est LUDOVICUS PTALIVS Mediolanensis, Medicus scientiae laude, et dendi usu cum summis viris comparandus. Is, etiam quin emeticis non aduersus, (*L. VI. animadu. et causae medic.* §. 54.) haec habet: Cum plerisque videam, ut TAEUS, et AVICENNA duce, in praecauenda epilepsia diffimis vii medicamentis purgantibus tum per vomitum tum per secessum, ego longa experientia doctus profiteor, nunquam morbum hunc in quoquam per proprium cunctis etiam productum, validioribus vomitoriis curatum sed ex iis omnes ad deteriore statum deductos. Valde autem per secessum educentia aliquando profuisse observo modo non ita frequenter in usum ducta fuerint; a frequentiori enim eorum usu, exhaustis spiritibus animalibus, et plexiae saepe concitantur.

§. CCLXXXIV.

Opii vis.

Opii praestantiam aduersus affectus convulsus et tetani ipsum supra (§§. CCLXXI. CCLXXII.) memorauimus. Cur non idem erit expectandum in epilepsia ab opio? MORGAGNIUS certe eius facultatem in hac curanda cognouit, et exemplis confirmavit a). Narrat primum, quod ex terrore epilepticum factum, cui nec salinis missio, nec remedia seroso humori expellenda idonea quidquam profuerant, opii grano vno die diuisim dato pristinae integritati fuisse restitutum. Nec puero tantum, et ex hac sola causa epileptico, sed etiam seni sexaginta et octo annorum praefuit. Is laborabat epilepsia ex hypochondriacorum consensu, ac vitio, et simul in hydrothoracem vergere videbatur. Data eidem sunt eccopica aperientia, ac diuretica remedia, a quibus nullum cepit leuamen; imo ab iis, quae vrinas cient, gra-

Observationes.

is accessus reddebantur, fortasse quod aliquantum stimulant. Conualuit tandem dimidio opii grano cotidie ad longum tempus vorato. Nec alienum detur, in hysterica epilepsia, et quacunque alia empathica, aut cum nimia sensibilitate generis nervosi conjuncta, aut a doloribus originem habente aliquid boni ex opio sperare.

a) *Epist. anat. med. IX. n. 6. et n. 7.*

§. CCLXXXV.

Nullo in morbo plura remedia tamquam speci-*De specificis.*
a praedicantur, quam in epilepsia. Ex his celebriora liceat recensere. Viscum quercinum, jam celebratum, egregia roborandi vi praestare scribit SWIETENIUS a), atque hinc magnum nomen curanda epilepsia a generis nervosi debilitate infecta sibi comparasse. Sed multo ante a BOYTO ejus antepileptica vis cognita fuit, cum historiam referat de nobilissima foemina epilepsia pene hereditaria diu afflicta, quae tandem post multa remedia frustra tentata solo pulvere visci quercini veri drachmam vnam in aqua ceraforum nigrorum quatuordecim diebus circa plenilunium aliquamdiu sumpta perfecte conualuit a*). LOESEKE duos ab epilepsia, cujus causam detegere non potuerat, cures reddidit, data quovis trihorio pulveris visci quercini semidrachma, et simul hausto desuper decocto, quod parabat ex uncias quatuor visci quercini subtili pulvere redacti, et florum paeoniae et pululo vno in uncias sexaginta aquae feruentis mixtis, et aliquamdiu maceratis, addendo demum hori colato duas uncias syrupi paeoniae ad gratum saporem b). Radix quoque valerianae majoris sylvestris, postquam FABIVS COLUMNNA c) ejus *De rad. valerianae.* res antepilepticas non modo in aliis quibusdam in paucis, sed in semetipso expertus est, vti specificum

officium epilepsiae celebratur a quamplurimis. *col-
LUMNAE* fidem auxit *MARCHANDIVS* *), qui non
instituti experimentis miram ejus radice efficaciam
tem comprobavit d). Ex hujus autem auctoris
servationibus patet, radicem hanc modo aluum
rare, et lumbricos deicere, modo sudores em-
ciere. Quo factum est, ut *IANVS PLANCVS* *Al-*
minensis (in notis ad *Phytobasani* *FABII* *col-*
LUMNAE) ei facultatem solum anthelminthicam
buerit, et sibi ipse persuaserit, solam epilepsiam
vermibus inductam per eam curari. Ut verum
plerisque hodie inter efficaciora antepileptica
tatur. Ex nuperis scriptoribus, qui in ejus
des efferuntur, silentio praeterire nequeo magnae
celebritatis, ac doctrinae viros, *TISSOTIVM* e), *ANTONIVM*
SCOPOLIUM f). Ut vero radix inter
gras suas vires habeat, effodi debet mense Martio
antequam caulem edat, et siccata in pulverem
nuissimum redigi, cujus quotidie drachma, vel
quidrachma, vel binae drachmae etiam adhi-
tur g).

a) §. 1084. a*) *De viril. nat. philosoph.*
sect. 5. cap. 7. b) *Comm. Lips. vol. V. p. 126.*
phytobasano.

*) Ante *MARCHANDIVM* auctoritate *FABII COL-
LUMNAE* *PANAROLIVS* hoc remedio feliciter usus est
Vid. ejus *observ. 33. cent. I.*

d) *Mém. de l'Acad. Royal. 1706. p. 430. ed. An-*
e) *Traité de l'Epileps. art. 25. p. 300.* f) *Flor. C.*
T. I. p. 33. g) *Phytobas. p. 120.*

§. CCLXXXVI.

De cinna-
bari.

Cinnabarim epilepsiae magnetem appellavit
RIVERIO, medicus ille trium Augustorum com-
matissimus *IO. CRATO*. Natiuam in primis
babat *FRID. HOFFMANNVS* in epilepsia, alii
capitis affectibus, quos serum, vel sanguis effusa
parat

reret. Videbatur enim ei mira resoluendi virtutis praedita; nec injuria, cum ex hydrargyro, et sulphure intimè concretis coalescat. Hydrargyrus *Argentum vinum.* imvero, etsi interdum epilepsiam male administratus arcessisse fertur, inter antepileptica tamen re locum obtinuit; nam pluries expectationem implevit. DOVARIVS mercurium dulcem cum cinabari antimonii commixtum proponere consuevit, et quidem largiore dosi a). Mihimet ipsi episticticum per mercurium dulcem sanatum videre contigit, cui a cane rabido demorso ad auertendam drophobiam istud remedii ad triginta amplius dies dederam. TROGHERIVS b) pilulas mercuriales catharticas reliquis praeparationibus antefert *), earum semidrachma alternis diebus per sex menses, deinde per alios sex quovis quarto, vel quinto dumtaxat praebita, et desuper hausto decocto dicis valerianae sylvestris epilepticam feliciter pernavit. Nec dubium est, quin mercurialia remedia, si venereae praesertim luis suspicio adsit, multo magis profutura sint. Ptyalismum in epilepsia idiopathica, et contumaciore ope mercurii intrinsecus habiti, aut extrinsecus per inunctiones administrati excitandum suadent BENEDICTVS SYLVAEUS c), WILLISIVS d), ETTMULLERVS e), ROLINCIUS f), HOUSSERTVS g), alique expertissimi aptores.

a) *Essais de mtd. d'Edimb. T. 2. p. 510.* b) *DALME Sagg. di medic. pratic. P. 2. p. 92., et Novell. Letter. Firenze del 1762. p. 183.* vbi observatio tota inserta est.

*) *Formula pilularum erat haec:*

Rec. Hydrargyri unciam unam. Solu. et extring. cum terebinth. 3vi. deinde add. Agarici, et extract. Rhabarbari, singulorum drachmas duas, Aloës succotrinæ drachmas tres. f. pil.

c) *Consult. 47.* d) *De morb. convulsiv. cap. 3.* e) *er. T. 2. art. VIII. p. 884.* f) *Medic. consultar. pag. 3.* g) *Mémoire sur l'Épilepsie.*

§. CCLXXXVII.

*Electuarium
Fulleri.*

Magnam quoque celebritatem adeptam est
Electuarium peruuiianum epilepticum a FULLERO
Pharmacopoea extemporanda descriptum. Haec
hoc pulueris corticis peruuiiani drachmas sex, et
dicis serpentariae virginianae drachmas duas. Haec
in electuarii mollis formam rediguntur syrupo
rum paeoniae composito. Antepilepticum praestantissimum, et certissimum pharmacum appellatur
ab anonymo; qui cum FULLERO ejus compositionem, utendique modum communicauit. *post debitas euacuationes*, inquit arcani communi-
tor, *adultis de hoc electuario drachma una, aliter*
nor dosi, mane, et vespere per tres, vel quatuor ab-
ses exhibeatur, et postea per triduum, vel quatuor
ante nouilunium, et plenilunium repetatur, morbi
epilepticos, et hystericos penitus eradicat, atque etiam
saltationes conuulsivas istas, dictas choreas S. V.
Tanto autem in pretio hic Mediolani habetur ejus-
modi electuarium, ut indiscriminatim in omni-
conuulsivis morbis praescribi soleat et potissimum
in puerorum epilepticiis affectibus, in quibus
dum ad annos aliquot adhibitum vidi; et si in-
tum, si quid boni inde consecutum est, mihi videtur,
remedione, an aetatis mutationi id tribui
beat. Multis omnino inutile fuisse deprehendi
quibusdam etiam non innoxium. Si quid tam-
vniquam bene cessit, id profecto fuit in epilep-
periodicis, et in temperamentis frigidis, et hu-
dis, habituque laxo, et debili. Quod sane con-
peruuiiani virtuti maxime acceptum referri co-
nit. Ad exemplum Fulleriani electuarii aliud
a Cl. MEADIO a) commendatum video, quod
stat ex pulueris corticis peruuiiani uncia, et pul-
dicis valerianae sylvestris duabus drachmis, syrupo
cortic. aurantiorum in electuarii modum una, et
subacta

*Electuarium
Meadii.*

actis. *Hujus*, inquit vir expertissimus, post de-
as euacuationes *deuoret arger botam* pondere dra-
cae unius mane; et vespere, tribus mensibus conti-
ne; deinde repetat triduo, vel quatrinduo ante nouam;
namque lunam.

) *Monit. et Praecept. med. cap. 2. sect. III. p. 37. ed.*
d. 1751.

§. CCLXXXVIII.

Ad epilepsiam idiopathicam mitigandam, imo
am quandoque curandam uti solet *LANGEVSA)*
tura, quae sit ex assae foetidae scrupulo in spi-
as cornu cerui vncia solutae; de qua dandas
recipit guttas triginta in aqua hirudinum cum
flores ante acceffionem. Monet tamen, pletho-
is non adhibendam esse, nisi prius venae sectio.
sanguis copia minuta fuerit. *MAYERNIUS CE-*
errimus in Aula Regis Magnae Britanniae Archia-
rum Comes inter complura, quae ad epilepsiam
ponit, remedium nobilissimum vocat puluerem se-
um hyoscyami ultra quadraginta dies usurpatum.
ipiendum vero ejus usum docet a granis sex, vel
a, et gradatim augendum ad scrupulum usque,
grana viginti quatuor ex cochleari succi sem-
ului recenter expressi *b)*. At suspectum esse de-
remedium ob narcosin, quam inducit. *Atta-*
a a nuperis scriptoribus extractum hyoscyami,
d ex succo hujus plantae ad ignem condensato
atur, ad conuulsivas affectiones, atque ad epi-
psiam ipsam, in primis si animi pathematibus
malis debeant originem, ut innocuum parego-
m remedium proponitur, et prolatis experimen-
tebatur. Initio datur extracti hujus granum
m ter in die, et sensim augetur ejus dosis ad
pulum, et drachmam usque dimidiam. Sed
GREDDINGIUS extractum istud dedit decem ac-
gris

Mixtura
Langei.

Semina hy-
oscyami.

Extractum
hyoscyami,
ex stramo-
nii.

gris melancholico-maniacis, undecim maniacis quatuordecim epilepticis, et quinque epilepticis maniacis, et postea concludit: *Hyoscyamum non potest esse in melancholicis, et epilepticis morbis ita, ut quibusdam videtur, salutiferum c*). Extractum quoddam stramonii eodem modo paratum, et grano dimisso inter initia bis in die, deinde paulatim aucta ad grana quindecim, aut viginti partitis vicibus intra nycthemerum datum epilepticis prodelle intendunt d). Confirmatur ejus antiepileptica virtus a Cl. ODHELIO e); nam in Nosocomio Hohenheim quatuordecim epilepticis praebitum est opium extractum, quorum octo perfecte convalescerunt, quinque magnum levamen perceperunt, unus tantum in eo, quo erat, statu remansit.

a) *Miscell. veritat. Fasc. I. p. 59.* b) *Prax. Medicin. I. I. cap. 3. p. 26.* c) *Advers. medic. pract. I. WIGII P. I. p. 71. ed. Lips. ann. 1779.* d) *IOANNES SPALOWSKY Dissert. inaug. med. de cicut. flamm. et p. 12.* e) *Comment. medic., et philosof. d'Edimb. Vol. I. P. I. p. 23.*

§. CCLXXXIX.

Antiepilepticum a cupro.

E cupro etiam quaedam parantur, quibus defuerunt sui laudatores. Aeris solutio opii ammoniaci facta, atque in aqua rite decocta liquorem caeruleum, qui constituit *samosum antiepilepticum puerorum*. Guttulae pauculae BOERHAAVIUS a), in hydromelle datae jejuno motu, alui subductione, nausea inducta, morbo pigros, tenellos stomachos; hos excitant, aquositas educunt, vermes occidunt. His effectibus

Specificum catochymias, et epilepsiae species sanantur. Weissmanni.

simile huic est specificum WEISSMANNI, quod ex vitriolo cyprino in aqua pluviali soluto, et spiritu salis ammoniaci perfecte saturato;

num post aliquam quietem affundatur spiritus vini rectificatissimus, vt elegantes crysalli sapphirinae praecipitentur. Hae quippe specificum modo dictum aduersus epilepsiam mira praeditum virtute constituunt^{b)}. Huc spectat *sulphur venereum*, cuius ^{*Sulphur venereum.*} parandi modum qui cupit, consulat IOSEPHI BENEDICTI PASQUALATI Tergestini Dissertationem Vindobonae anno 1776. editam, in ejus praecipue commendationem. Sed idem Cl. GREDINGIUS, quem supra laudavi, septem observationes adducit a se institutas, vt sulphuris venerei vires expenderet; ex quibus haec colligit: *Hae autem septem historiae satis, superque demonstrant, hoc cupri sulphur tam parua, quam auctiori dosi nec in curanda, nec in subleuanda epilepsia habituali quidquam valuisse c)*.

a) *Elem. chem. T. 2. Proc. CLXXXIX. p. 263.* b) *Comm. Lipsf. Vol. 7. P. I. p. 137.* c) *Aduersf. med. pract. modo citat. P. 3. p. 530.*

§. CCXC.

Nec carent sua laude moschus, tam solus, quam ^{*Moschus.*} cinnabari nuptus, liquor anodynus mineralis ^{*Liquor Hoffm., Pe-*} HOFFMANNI, spiritus vitrioli antepilepticus ^{*Hoffm., Pe-*} PEZOLDTI, ^{*oldsi, Dip-*} liquor cornu cerui succinatus, oleum animale ^{*pellii.*} DIPPELII, stercus album pauonis, flores zinci ^{*Flores zinci.*} *), radix dictamni albi ^{*Rad. dictamni albi, et alia.*} **), paeoniae, ruta, melissa, folia ^{*Rad. dictamni albi, et alia.*} et cortices aurantiorum, pulueres epileptici MAR- CHIONIS, et de gutteta ^{*Riverii*} RIVERII ***), Hannoueranus, spiritus sanguinis humani, aqua antepileptica LANGII, et sexcenta alia. Non nulli cum BARBETTA saponis hispanici drachmam semis decoquunt in tribus vnciis lactis vaccini, et mane, et vespere exhibent per triginta dies, hacque ratione epilepsiam pluries curatam a se narrant. Lac ter ^{*Lac cum sapon.*} te saponi hispanico, aut veneto nuptam, praesertim asininum, sed liberaliori manu, et longiori tem-

pore exhibitum laudatur a multis, et saepenumero in epilepsiae curatione propositum in suis consiliis medicis video a Cl. IACOBO BARTHOLOMAEO BECCARIO, medicinae apud Bononienses olim Professore, cui nec deerat summa in medendo scientia, et diutinus usus; quae duo cautissimum, prudentissimumque medicum effecerant, pace, et venia eorum, quibus ejus consultationes non modo non ardent, sed etiam despiciuntur, et damnantur. Fortasse non placet longa, et diligens caussarum, et naturae morbi disquisitio, atque indagatio, quam ubique sagacissime instituit, et simplicissima morbi methodus, quam operosiori, et magis compertae semper anteponit. Sed in his duobus maximam medici praestantiam, ac laudem vere consistere, fatebitur quisquis et medicinae facultatem penitus rimatus sit, et corporis humani teneram constitutionem, quae blande tractari desiderat, recte cognoverit. Qui enim consulitur, non modo sibi, sed medico etiam consulenti satisfacere, et lucem aliquam afferre debet; quod praestare nequit in vberiore de morbi natura, et caussis sermone. Debet praeterea ea proponere, quae aegro opportuniora ipse putat, et novit, et magis naturae amica usu compererit. Hanc viam insisterunt consummatissimi inter nostrates, ac sapientissimi medici, REDII, DELPAPII, LANCISII, MALPIGHII, ALBERTINII, COCCHII, VALLISNERII, et plerique Hippocraticae scholae, id est, naturae ipsius sectatores, qui de medicina practica, multoque magis de aegrotis optime meriti sunt. Ab his ne latum quidem vnguem discedere experientia edoctus, et recta ratione usus voluit vir clarissimus, quem Italia suspexit, et magni fecit.

*) Flores zinci olim non adhibebantur a Medicis, nisi morbis exteriorum partium, et speciatim oculorum inflammationibus, aut ruboribus, a lymphâ acri, et mordaci inductis. Sed, postquam GAVBIUS cognovit, hos fuisse arcum famolissimi empirici LVDEMANI, quo ipse utebatur sub nomine *lunae fixatae*, vsui etiam interno tam ab eodem doctissimo viro, quam ab aliis adhiberi coeperunt in omnibus morbis spasmodicis, et convulsivis, et praesertim in epilepsia. GAVBIUS dosin florum zinci in pueris definit granum vnum bis in die, in adultis vero granum pariter vnum, sed quavis altera hora repetendum. VAN DOEVEREN autem alia ratione eos praescribendos existimat. Duabus sacchari drachmis admiscet florum zinci duodecim grana, et totam miscelam ditidit in duodecim partes aequales, quarum vnam sumendam jubet ter in die. PERCIVALIUS non timuit sic dosin eorum augere, ut quinque grana praeberentur ter in die. Huic remedio videtur inesse, ut existimat HARTVS, praeter vim absorbentem, qua praeditum quidem est, peculiaris quaedam, et specifica facultas, quam vocabimus antispasticam. Cl. DE LA ROCHE (*Observations sur l'usage interieur des fleurs de zinc inserées dans le T. 52. du Journal de médec. de Paris*) experientia septem, vel octo annorum edoctus testatur, ejusmodi remedium nullo modo veneficum, quale a quibusdam perhibetur, repertum fuisse. Ac non modo ipse, sed ejus quoque locii, atque amici indiscriminatim eo vsi sunt in quavis convulsiva, et spastica affectione, atque in quavis aetate, et semper salubria inde effecta retulerunt, saltem ad aliquod tempus durantia in omnibus iis casibus, in quibus non subesset vitium quoddam organicum, quod eos incurabiles redderet. Sed his quoque levamen attulisse visum est. Opihatur igitur vir eruditissimus, flores zinci agere in *principium*, ut ipse vocat, *vitale*, minuendo *irritabilitatem systematis nervi*, sed ratione admodum diversa ab ea, qua narcotica agunt. Non tamen inficiatur, quod interdum subsequi vomitionem aliquam, quoties largiore dosi ingesti fuerint: quod quidem in eis vim quandam irritandi, resoluendi, attenuandique ostenderet, a qua fortasse tota ejus virtus antispasmodica proficiscitur. Verum vomituritio illa non uniuersim locum obtinet, nec progredi solet, nec semper quantitatis, quae assumpta est, rationi responder, quoad ipse potuit cognoscere. Subiicit etiam, parua dosi datos, videlicet unius, vel duorum gra-

norum pondere insolitam quamdam alacritatem, hilaritatemque excitare. Prodesse eos affirmat morbis convulsivis puerorum, et speciatim *pavoribus in somno*, ubi ablunt vitia organica cerebri, obstructioneque abdominalium viscerum; itemque tussi convulsivae, nec non hysterich convulsionibus mulierum. Animadvertit demum, *saepè* granum dimidium; aut integrum esse dosin nimis exiguum; ideoque paullatim augendam esse. Ipse progressus est ad grana usque viginti, et triginta, et ultra. In adultis incipit dare duo, aut tria grana singulis tribus horis, et brevi adscendit ad grana sex pro qualibet praebitione, si nullum effectum observauerit, et nullum inde nocumentum consequi viderit, neque stomachus nauseaverit. Forma pilulari remedium stomacho minus molestum est, sed *saepè* et lentius agit. In pueris exorditur a quarta, vel tertiæ grani parte, et pedetentim ad maiorem dosin procedit. Negat plumbi particeps esse, ac proinde colicas saturnina inferre posse. Quo vero clarius florum zinci vires appareant, decem observationes profert, quibus eas confirmat, ac comprobat. Sed multo plures observationes, quae eorum antispasticam facultatem ostendunt, videri possunt in *Comment. med. e filosofic. d'una Compagnia di Medici & Edimburg. T. I. P. I. sez. I. art. n. XI P. 2. sez. 2. artic. 2, P. 4. sez. 2. artic. 3., Tom. 2. P. 3. sez. 3. etc., et TISSOT Malass. de' nervi T. 2. P. 2. pag. 338.*

**) Dictamni albi, siue fraxinellae offic. vires antepitpiticae a Medicis Vidobonensibus novis experimentis pridem illustratae fuerunt. Radix ejus praecipue hac laude excellere dicitur. Exhiberi autem solet vel in *pulveri*, et loquuntur, vel in *essentia*, vel in *electuario*, vel vini medicati forma. Pulvis hujus radice datur ter in die a gran. V. ad grana XX. per sex saltem hebdomadas. *Essentia* sic paratur:

Rec. Rad. dictamni alb. recens. et minutim concis. unc. duas; Spirit. vini purissim. unc. quatuordecim. M. et statim in digestionem, donec fiat essentia bene saturata. Tempore digestionis agitur subinde vas. Post purgans exhibitum datur essentia a guttis viginti ad quatuordecima ter in die ad mensem unum, vel duos, vel tres.

Electuarium.

Rec. Pulv. rad. dictamni alb. unc. dimid., conserv. menthae unc. duas; syr. menth. q. s. ut f. Elect. Sumat aeger omni trihorio parvum cochlear.

Vinum

Vinum medicatum.

Rec. Pulv. rad dictamn. albi unc. unam. Limat. mart. non rubiginos. drachm. tres. Vini generos. Austriac. lib. unam. M digere per horas viginti quatuor. Dein cola. Detur omni bihorio cochlear unum. Hoc vinum conuenit in chlorosi, et retentione menstruorum, et ubi spasms aegri laborant, vel debiles sunt ex nimia seminis, aut aliorum humorum depreditione.

*** Pulueres eiusmodi purgandi essent a rebus inutilibus, uti ebore raso, vngula alcis, spodio, margaritis, cranio humano, hyacinthis, cornu cerui crudo, foliis auri, aliisque nulla virtute antepileptica praeditis.

§. CCXCI.

Verum in tanta medicamentorum vbertate, et copia, in tanta eorumdem celebritate, et commendatione nemo sibi persuadeat, epilepsiam semper illis esse cessuram, neque quisquam facile putet, cuicunque epilepsiae, etsi sanabili, eandem curationis rationem, aut vnum, idemque remedii genus singulis conuenire, aut satisfacere posse. Id nobis etiam inculcare videtur diserte, atque apposite, ut solet, Cl. MORGAGNIUS a), si a cerebri, in-
Quandoque insanabilis epilepsia.
 quiens, duritie, si ab apostemate, si ab sui generis abscessu, si a vasorum distensione, si ab aqua aut multa, aut pauca, aut flaua, aut limpida, si ab aliis praeterea causis epilepsiam fieri, aut, si harum aliquas pro effectibus habere mauis, at foueri saltem, seruari, augeri posse non negas; vides profecto, quam difficilis sit aliquando ipsius curatio, atque adeo, ut vires artis excedat. Vides simul, cum has non excedit, quam varia curatio esse debeat tunc quoque, cum epilepsiae causa intra cranium est, non modo cum extra ipsum.

a) Epist. anatom. med. IX. n. 26.

§. CCXCII.

Quamobrem nostrates Medici sapientiores plus in remediis, quae totum corpus immutant, quam

Plus in medicamentis totum cor-

pus efficien-
tibus, quam
in specificis
confidendum. in arcanis, specificisque confidunt. Sic enim sperant efficere, ut illa quaecunque sit in encephalo diathesis, siue dispositio, quae proëgumenae causae loco haberi potest, paulatim deleatur, aut saltem causae procatacticae, quae aut a copia, aut a dyscrasia humorum plerumque profluunt, ita emendentur, coërceantur, ut proëgumenae occasionem, unde excitetur, exhibere nequeant. Hinc plethoram subinde minuere, ubi ea incidat, student; cacoehymiam, quando haec haec notis se prodit, euacuantibus tollere; acritates luentibus, temperantibus, inuoluentibus corrigere; omnia vno verbo ad libellam, aequilibriumque redigere. Quare sanguinis missionem statim temporibus imperant; catharsin subinde non omitunt; urinas, sudoresque opportune cient; et praeter ceteris fero lactis, succis herbarum cichorei, fumariae, melissae, aut earum dilutis, decoctis radicum chinae, et sarsaparillae, et quandoque guaiaci, &c. Et asinino, aquis medicatis, diu, et lege artis potandis, balneis aquae dulcis, juribus viperinis, renarum, et cancorum fluuiatilium pro re nata utuntur. Sed summam spem collocant, quod ab antiquissimis etiam medicis factum est, in regimine diaetetico rite instituto. Hoc enim blanda humoribus conditio impertiri potest, qua deinde nec cerebrum, nec nervi villo modo vellicari, aut graviter affici queant. Coeli igitur mutationem, peregrinationes, corporis exercitationem, somni, et vigiliae temperamentum, animi quietem, et tranquillitatem, ciborumque, qui coctu faciles, naturaeque blandi sint, delectum quam maxime sudent. Vinum penitus intercidendum esse iudicant, quo vno praesidio multi ab epilepsia liberati narrantur. Vitandam ingluviem, repletionemque omnem volunt, proscribendaque cuncta alimenta dura, difficilia,

cilia, salita, aut acria, aut vndecunque sanguinis motum concitantia. Potus *caffè* generatim, vt nervis inimicus, vituperandus videtur. Ex saturatissimo ejus decocto lethalem epilepsiam natam vidit SALOMON THEOPHILVS MEZA a). Aquae potatio; diaeta alba, et lactea; aërisque puritas sola interdum salutem attulerunt. In pueris vero, atque adolescentibus non parum emolumenti ab aetatis mutatione expectandum est. Atque haec de epilepsia satis *).

a) *Collectan. Societ. med. Hauniens.* vol. I. pag. 154.

*) Satis quidem mihi pro mei instituti ratione: aliis fortasse non item. His vero faciet satis absolutissimum, perfectissimumque de epilepsia opusculum, quod inscribitur: *Traité de l'épilepsie par Mr. TISSOT Doct. med. etc.* in 8. A Paris 1772. Hunc tractatum prae omnibus, quos noul hactenus editos, perlegant tirones, assiduaque manu versent, nam quidquid ad morbi historiam, causas, signa, et curationem spectare potest, in eo supra expectationem abunde expositum invenient.

C A P V T IX. DE VERTIGINE.

§. CCXCHII.

Vertigo, graecis *Δίωσις* *), nobis ea est affectio, * *Dinos.*
in qua homo subito in gyrum agi, vel res ex- *Quid?*
tra ipsum positaē repente, etsi vere quiescant, circumduci, aut saltem moveri videntur, vel vtrumque simul apparet, sensibus, et motibus aliquantulum turbatis, et corpore ipso veluti nutante. Hac descriptione credimus continuo perspicui, quid hoc nomine intelligendum sit, nihil solliciti, ad motusne imminutos, an ad auctos referri debeat, quod a Nosologis disceptatur *). In ea autem non modo complexi sumus subitam corporum circumstantium apparentem rotationem, aut trepidum motum; ve-

rum addidimus etiam ipsius hominis fallacem sensum cum ejus aliqua nutatione, et quasi prolabendi metu; quia, quando hoc morbo corripimur, clavis etiam oculis, aut visu orbiati circumagi, et vacillare nobis videmur. *Sensus quoque aliquantum turbatos* adjecimus, quod, ut recte animadvertit SAVVAGESIUS in hocce morbo, non solum visus, aut auditus, sed tactus etiam, interioresque sensus laborant.

*) Nonnulli adnumerant vertiginem morbis motus imminutorum. LUDWIGIUS speciatim eam ad soporis affectus relegat; neque ab illo dissentit PLATNERUS. Vterque enim hanc affectionem definiuit *subitaneam sensuum perturbationem, et obnubilationem, quae potissimum in organo visus, et auditus percipitur.* At hujusmodi definitione non satis clare vertiginis idea explicatur, nec, quid cum soporosis affectibus commune vertigo habeat, ut ad eos spectare dicenda sit, continno appareat. SAVVAGESIO verò rectius visum est, vertiginem ad classem *vesaniarum*, et speciatim ad ordinem *hallucinationum* referre. Vertigo enim ipsi est *hallucinatio, qua objecta licet quiescentia e loco moveri, vel in gyrum versari nobis videntur.* Et si *hallucinatio* ad mentem spectat, non video, cur inter hallucinationes vertigo collocanda sit, cum vertigine correpti probe noscant, advertantque, rotationem illam non esse veram, sed apparentem tantummodo; neque hinc falso judicant, errantque, ut inter errores mentis locum mereatur. At, inquit, non errant quidem in iudicio, sed in imaginatione, siue maius in sensatione. Quicunque demum error iste sit, talis tamen est, ut eum mentis illico advertat, ac reprobet. nec proinde ad *vesanias*, *hallucinationesque* referre queas. Adde, titubationem corporis, cadendi metum, obscuracionem visus, tinnitum aurium, atque alia, quae in vertigine saepe occurrunt, non esse errores phantasiae, mentisque hallucinationes, sed vera, et genuina incommoda, ut postea clarius patebit. Vtuncque demum res se habeat, nos de disponendis in classes morbis non valde laboramus. Illud unum nobis visum est, de vertigine verba facere post epilepsiam, quod quidam veluti ejus leuissimus gradus videtur, affinitatemque cum ea aliquam prae se fert.

§. CCXCIV.

Tres peculiares vertiginis differentiae constitui communiter solent. Prima est vertigo simplex; *Tres differentiae primariae.* n videlicet exteriora, aut corpus nostrum, aut aque simul, vt dictum est, circumagi, ac nutare ntaxat videntur. Altera est, quando praeter parentem objectorum rotationem, aut motum, curatur etiam visio, aut deficit, aut saltem ni- *Vertigo simplex.* ea cernuntur, quae trepidare, aut in gyrum agi entur, aut demum oculi, postquam varii colores te eos obseruati sunt, caligine quasi offunduntur. Inc peculiari nomine *scotodiniam*, aut *scotomiam*, *Scotomia, siue vertigo tenebrosa.* e *vertiginem tenebrosam* *) vocant. Tertia de- que est, quando vertigo adeo inualuerit, vt aeger uia quaeque apprehendere cogatur, ne corruat, citur propterea *vertigo caduca*, atque epilepsiae de proxima habetur. Imo haec a quibusdam o leuissima epilepsia, sumitur, non secus ac leuif- ius epilepticus insultus pro vertigine. Ex his col- ere licet, in vertigine non semper oculos affici, c, vbi et ipsi afficiuntur, solos laborare, sed ce- rum, aliasque partes, et speciatim musculos cor- ri sustinendo dicatos; neque proinde corporis tationem, quae interdum tanta est, vt humi ho- nem prosterнат, semper ab offuscatione visus, ac le oborto cadendi metu deriuandam esse, quem- nodum quis putare posset. Accedit postremo, ed reliqui etiam sensus persaepe in hoc morbi nere aliquid compatiuntur; nam cum ipsa cor- ris, aut rerum externarum rotatione plerumque rium tinnitus, aut obtusus quidam sonus, et ta- is hebetudo conjunguntur.

*) *Scotodinia*, *scotodinos*, *scotomia* synonyma sunt. *Exo-* *tenebrae*, *divi*, *vortex aquarum*, originem vocabuli ex- ant, atque significatum. *Σκότωμα*, *caligo*, *obscuritas*; *scotomia*.

§. CCXCV.

Causa proxima.

Multa de causa proxima vertiginis excogitata hanc usque diem, et prolata fuerunt a pathologis sed manet adhuc, meo quidem iudicio, in antiqua obscuritate, in qua ejus natura latebat^{*)}. Neque satis hasce tenebras dissipauit GAVBIVS, quoniam ipse illustrare tentans sic scripsit: *Quum visus et intuitus rerum, quae circumaguntur, aut aliter riter ante oculos mouentur, et capitis, corporis uniuersi in gyrum agitatio, et meticulosus prospectus insuetis vertiginem inferat; credendum est causas quoque internas haud dispari ratione agere.* Sed adhuc explicandum superest, in quo isthaec ratio consistat. Quomodo enim nescimus quidnam nervis, medullaeque cerebri accidat sensationibus, perceptionibusque proprie dictis; ignotum quoque credimus id, quod cerebrum, tina, neruique aliorum sensuum patiantur a exterioribus modo memoratis, quae vertiginem non assuetis inferre solent. Ad summum pro conjectura dici potest, in vertigine modo crystallinam fortasse aliqua ignota adhuc calidam liquam reddi, inclinari, aut inaequaliter contrahi, modo bulbum oculi a musculis inaequaliter spastice contractis aliquam figurae, et positionem subire, modo retinam, neruum optici, cerebrum ipsum, neruosque auditui, tactui, et quae inferuientes ita affici, ut in spasticis, convulsisque morbis afficiuntur. Enimvero si ista vertiginis phaenomena perpendantur, et eas excitantes intus spectentur, nihil produm offendes, quod nervosam, convulsivam affectionem non exhibeat.

^{*)} Quae enim a veteribus pathologis de causa vertiginis proxima tradita sunt, tam a veri similitudine distat, ut hodie, vti commentitia, fidem non inueniant.

ius flatuosos, aut humores a calore in vapores resolutos, ataxiam spirituum, aut distortas spirituum animalium, aut spirituum animalium motum in oculo saltatorium, anta physiologiae, atque anatomes luce causam vertiginis proximam esse sibi persuadeat? Quis spiritus animae in cerebro, aut oculi camera in gyrum actos hodie concipere possit, dum, si vere hi existunt, suis fistulis contineri, et aliorum liquorum legibus pex eas motu, rationi consonum omnino est? Quis IVNCKERI hyphesin adprobet, in qua nervi a meningibus derivantur, motusque, et sensus a membranarum, et nervorum tensione deductur, ut deinde ab hac ipsa tensione, spasmodica, aliqua vertiginis explicatio deriuetur? c minori difficultate implicatur hypothesis, etli subtili, SAVVAGESII, quae sanguinis motum retrogradum in aëre, in auribus, et tactus organo comminiscitur. Nemo idem negauerit, sanguinem e venis in arteriolas, atque hinc in majores ramos regredi posse, quibusdam intercurrentibus causis. Verum quis unquam demonstrabit, ut vere causam vertiginis proximam esse? Id omne hypothesis tantummodo nititur, nec aliam fidem meretur, immo reliquae quaecunque confictae opiniones. Qui ergo dixerit, coronam ciliarem contrahi, atque hinc lentem crystallinam obliquam reddi, aut musculos oculi inaequaliter tendi, ut rotationem, subuersionemque objectorum explicet; profecto is non aliam vertiginis causam inveniet, quam illarum partium spasmum, et convulsionem. quis pro certo affirmare queat, coronam ciliarem irritabilitate, atque adeo contractionis motu pollere? et si liceat, sua contractione crystallinam lentem obliquam facere, atque visionis axem pervertere posse?

e) *Instit. Patholog. Medicinal.* §. 721.

§. CCXCVI.

Quaecunque vero illas partes (§. CCXCV.) commovent, agitant, irritant, infirmant, siue pro-
Causae remotae.
 ne in eas, siue per consensum agant, causarum vertiginis remotarum loco habendae utique erunt. ac igitur omnia reducuntur, quae causarum remotarum nomine, ubi de nervorum distensione, et dolore (cap. VIII.), atque adeo de epilepsia egimus, memo-

memorata fuerunt. Inter haec peculiarem mentionem exigunt aetas senilis, tempus hyemale, strinae constitutiones, capitis percussiones, fracturae, aut depressiones, vehemens sub sole dente calefactio; exercitia immodica, sessio in teriore currus velociter acti parte, obuersa scilicet facie, ingluuies, cibi flatulenti, ira, balneum, alio immodica excretio, euacuationis alicujus confusio suppressio, inedia praesertim in biliosis, halitus a visceribus viuae, carbonum, fedinarum, musti, aut fermentantis, odores suaueolentes in malis, liquoribus, pedum refrigeratio, vini, et vinorum, nicotianae, opii, lolii, aliarumque rerum narcoticarum insolitus, aut nimius usus. Quorum non nulla, ut facile patet, in cerebrum ipsius proxime agunt, alia in alias partes; sic tamen, cerebrum ipsum in consensum trahatur, aut caput versus humores uberius propellantur. Inter primas, quarum consensione caput afficitur, prima est vertigo, in quo saepissime residet vertiginis causa. Nam jejuno, aut acrioribus, prauisque cibis referto, atque irritato, aut nimium cibis obnoxio, vertigo saepe molestat, quae tamen illico ab abstinento cibo vel modico, aut expulsis, quae in eo sunt, fordibus, acribusque humoribus, aut a cibi sarcina liberato stomacho euanescit. Hinc manifestum est, cur hypochondriaci vertigini sint obnoxii. In his enim primae viae crassibus, prauisque succis plerumque scatent; venter, atque intestina a flatibus distenduntur, sanguis lente in visceribus abdominis, et praesertim vena portarum progreditur; hinc spasmi, et qualis sanguinis distributio; hinc ad caput confusior humorum vis, aut nervorum parvis vagi consensione facilis in cerebrum irritationis propagatio.

*Vertigini
hypochondriaci saepe
obnoxii.*

§. CCXCVII.

Quare praeter illas differentias, quas supra *Differentiae* CCXGIV.) a vertiginis majore vel minore gradu *secundariae*. *romsimus*, non negligenda est alia, quae ab oris sede procedit, quaeque communis est cum risque ceteris morbis, videlicet in *idiopathicam*, *sympathicam*. Rursus a quibusdam distinguitur *Differentiae* *vertiginem cerebri*, in *vertiginem visus*, in *verti- a sedibus*. *em tactus*; et sic deinceps. Pro caussarum vero *Differentiae* *ietate*, ut reliqui, in primis capitis, morbi, sibi *a caussis*. *ia nomina vindicat*, ducta videlicet a sanguine, tro, a vulnere, ab ictu, a venenis, ab ebrietate, stomacho, ab hypochondriis, ab utero, a nimia ruorum sensibilitate, a vasorum vacuitate, et sic tro; quorum nihil attinet singillatim meminisse. *terdum etiam cum aliis morbis complicatur*, aut rum symptoma est. Hinc *complicata*, aut *sym-* *omatica* etiam nominatur.

§. CCXCVIII.

Morbus ex iis, quae de eo retulimus, satis patet, facillimeque cognoscitur; neque ejus caussae *Diagnosis et* ere possunt, si ad toties memorata earum signa *prognosis*. *imus aduertatur*. Omissis ergo signis diagnostici, ad prognostica me conuertam. Vertigo pro aduum ratione plus, vel minus grauitatis continet. *Tenebricosa*, et *caduca* periculosior est, quam *plex*, itemque *idiopathica*, quam *sympathica*; *nus vero omnium*, quae *hypochondriaca*, aut *serica* dicitur. Periculum autem in grauiore, *que manifesta causa inuadente ex eo immit*; quod iuuenes ea correpti in epilepsiam; aetate profecti, et senes in apoplexiam facile incidunt. Vertigini capitis dolor superueniens interm eam soluit. Malum vero indicat vertigo, si *lori capitis ipsa successerit*. Hinc scriptum est: *iebricosae vertigines, si cum doloribus adfuerint,* *malum*

malum in insaniam erumpit, nec facile profigatur senes praecipue affligit a). Male etiam audiuntur vertigines complicatae cum aliis morbis, aut symptomatice, ut ex Hippocraticis oraculis eruitur. tenebrosa vertigine laborans, et lucem auersans, somno, ac ardore multo detentus, desperatus b). Per vi in longis morbis aurium tumores, si subinde sanguis e naribus profluat, et tenebrosa vertigo excitatur exitio sunt c). Febres vertiginosae, et cum tunc intestini morbo, et sine hoc, perniciem intendunt. Quando vero inter initia morborum vertigo incipit, saepe aut narium haemorrhagiam, aut vultus praemonstrat. Hinc in coacis habetur: Tenebrosas vertigines circa initia (morborum) sanguinis e naribus fluxio soluit e). Et in praenotionibus Si quis in febre non lethali dixerit, caput dolere, tenebrosam quiddam ante oculos observari, si etiam oris ventriculi morsus accesserit, biliosa vomitio ad-

a) Praedict. l. 2. num. 155. b) Hipp. eph. 15. VIII. c) Coac. n. 105. d) Ib. n. 106. e) N. 144. f) N. 144.

§. CCXCIX.

Curatio. Curatio porro pro caussarum diuersitate petenda est ex capite superiore de nervorum distentione, rigore, et speciatim ex iis, quae epilepsiae curandae opportuna praedicauimus. Quasi specificum adferri solet stercus pavonis, et radix valerianae syriacae. Inter cathartica excellere dicuntur pilulae succino Cratonis, et massichinae. In vertiginis motu rhedae, aut naui laudantur a GORTERIO paregorica, et acida gratiora, ut theriaca, num rhenanum cum succo mali citrei, aut menthae et paxillo syrapi diacodii. Alii vinum cum aqua marina commixtum proponunt ad auertendam vertiginem, quae nauigantibus, atque motui naui assue-

ietis molesta esse confuevit. Quod ad victus
ionem attinet, haec caussis morbificis emendan-
accommodata sit oportet.

) *Differ. de vertig. §. XXXIV.*

C A P V T X.

OPHTHALMIA, ALIISQVE OCULO- RVM VITIIS.

§. CCC.

Multis, et magnis morbis patent oculi, quo-
rum non pauci in chirurgia pertractantur.
omissis iis, quibus sola manus medetur, de oph-
thalmia, nonnullisque aliis eorum vitiis, quae sae-
us medica ope egent; aut medicis clinicis se obji-
unt, ut consilium suum aperiant, breuiter dice-
us. Ophthalmiae nomen latiore habet signifi-
tum; et quamuis aliquibus aequae valeat ac ocu-
tum morbus *), vetus tamen consuetudo obti-
nit, vt plerique hanc vocem adhibeant ad inflam-
mationem tunicarum oculi, in primis exteriorum,
notandam. *Ophthalmitin* hanc nuperi quidam
care malunt.

*Nominis
significatio.*

*Ophthalmi-
tis.*

*) *ὀφθαλμὶς* latine vertitur oculos. *ὀφθαλμία* igitur
nat oculorum morbus. *Lippitudinem* vocat C. CELSVS.
mc SAVVAGESIVS diuidit in complures species, alias
m rubore quidem, et dolore, sed sine inflammatione,
as cum inflammatione conjunctas. Nos veterum signi-
ficatiōi, quam huic voci tribuerunt, adhaerentes, quando
ophthalmiam dicimus, non alium morbum intelligimus,
iam oculorum inflammationem. Nolumus enim pro ar-
rō vetusta nomina immutare.

§. CCCI.

Ophthalmia, quam dixi, in tres veluti gradus,
ae species, si communiores ab auctoribus distin-
etiones

*Ophthal-
miae tres
veluti gra-
dus.*

Etiones sequi libet, diuiditur. Primus gradus

* *Taraxo*. citur *Taraxis*, quasi turbatio a *ταράσσω* *), tur-

Est autem, cum in tunica adnata, siue coniuncta
leuis ruber, siue inflammatio uicula se ostendit.

ea oculus humidior fit, calet leuiter, rubetque,
non nihil dolere incipit. Idque contingit a causa
plerumque euidentibus, solis ardore, igne, fun-

Primus gra- vento, puluere, vini potu, similibusque. *du* *Taraxis*.

leuis vero est ista inflammatio, ut *GALENVS Tar-*
xia potius inflammationis initium, quam veram in-
flammationem reputauerit. Hinc non nulli *ant-*

veterum, quam recentiorum, inter quos *NICOLAS*
PISO a), et *IVNCKERVS b)*, hanc *ophthalmia* *p-*

Secundus *riam* nominarunt. Alterum gradum facit *ophth-*
ophthalmia. *mia* proprie dicta, in qua nimirum inflammatio

nifestior cernitur, oculi magis rubent, magis calet,
magisque dolent, et non modo humescunt, sed ubi

riores lacrymas fundunt; et praeterea caussae, quae
originem morbo dederunt, plerumque grauiora

vehementioresque sunt. Tertius denique *ant-*
dicitur, cum non solum *adnata*, verum etiam *ant-*
rotica tanta inflammatione intumescunt, ut *ant-*
corneam lucidam attollantur, hiatumque quasi *ant-*

Tertius relinquant. Praeterea in hac inflammationis *ant-*
chemosis. *lorum* specie plerumque palpebrae inuertuntur, *ant-*

ceditque immanis capitis dolor, ac nocturna vigilia

* *Charme*. Dicitur *chemosis* a *Χαίμα* *), id est hiatum. *ant-*

non desino, *IVNCKERVM* hunc grauiorem *ophth-*
miae gradum a seroso humore oriri posse credidisse
atque ideo ad spuriam *ophthalmiam* retulisse.

a) *De morb. cognosc. et curand. l. I. cap. 26. n. 40*
Conspect. med. theor. pract. Tab. XXIV.

§. CCCII.

Alii aliter Alii hosce *ophthalmiae* gradus, siue differentias
quam diui- (§. CCCI.) diuersa ratione exprimunt; primum *ant-*
dunt. pellentes

pellant ophthalmiam *leuem*; alterum ophthalmiam *trauem*; *grauissimam* deinde tertium. Neque desunt, qui chemosis nomine eam oculorum inflammationem speciatim intelligant, quae ad interiores usque oculi membranas, contentosque humores protenditur, omniumque grauissima est. Qui vero non isto, sed priore modo eam accipiunt, coguntur aliam imponere denominationem inflammationi, quae occupat interiores oculi partes, choroïdem videlicet, vuae, retinam, capsulam humoris crystallini, aut vitrei. Quapropter hanc *PIAT-^{Oculorum} NERVUS a)* speciatim oculorum *phlegmonem* vocat. *phlegmone.* Stipatur autem grauissimis symptomatibus, dolore nempe, et calore capitis, oculorumque intolerabili, febre vehementi, vigiliis, interdum delirio, lucis intolerantia, imo omnimoda auersatione, pupilla restricta, et lacrymis vberioribus. Ingens haec totius fere bulbi inflammatio, praesertim cum a repentina causa originem ducit, tanto plerumque impetu oculos inuadit, ut eos quasi e sede sua depellere videatur. Id mali, quia bulbus oculi protuberat, et quasi procidit, *περὶ τὸν ὀφθαλμὸν **) Graeci, c. *Proposita* *CEL*so teste, appellant b). Quando in hocce grauissimo oculi infortunio retina quoque afficitur, id ostendi putat *PITCARNIVS* a muscis, puluisculis, aliisque incertis simulacris, maculisque ob oculos obuersantibus c). Sed haec ipsa simulacra ab humoris aquei etiam vitiiis, alterationibusque contingere posse, contra *PITCARNIVM* contendit *POR- TERFIELDVS*.

a) *Instit. Chirurg. §. 281.* b) *L. VI. cap. 6. n. 8.* c) *Elem. medic. physio. mathemat. cap. XIII. §§. 2. 3. 4.*

§. CCCIII.

Atque haec de *ophthalmia vera*, et *sanguinea*, *Vera, sed* quam *humidam* etiam non nulli dicunt a *lacrymatio- sanguinea.*

Lippitudo nis vbertate, dicta sunt. Nunc transeo ad eam, quam
ficca, siue lippitudinem, siue *ophthalmiam notham*, et *fictam*
opthalmia vulgo nominant. *Notham* eam vocant primum
notha. eo, quod palpebras potius, earumque angulos occupat,
 quam oculi bulbum, deinde quod a sero, aut lymphâ acri
 gignitur; *ficcam* porro, quod minor lacrymatio eam comitatur.
 Hujus autem duplex genus occurrit, alterum cum pruritu, alterum sine
 pruritu. Quae cum pruritu est, vel exiguam humoris falsi,
 atque acris fluxionem comitem habet, et dicitur *psorophthalmia*;
 vel in ea abest omnis humoris fluxus, sed palpebrae tantummodo rubent,
 tument, et dolore quodam leui, et grauitatis sensu
 afficiuntur; et tunc *xerophthalmia*, siue *lippitudo*
xerophthal- *ficca* est. Illud vero genus, quod nullus pruritus
mis. comitatur, et fere sola palpebrarum durities efficit,
Scleroph- *sclerophthalmia*, siue *dura lippitudo* vulgo nominatur.
thalmia. Omnes hae ophthalmiae nothae a lymphâ, quae oculos,
 palpebrasque humectare, et lubricare deberet, in acrem,
 salsamque conuersa, aut viscidâ et tenaciori reddita,
 procedunt; atque adeo *lymphaticae*, aut *serosae* jure dicuntur.
 Vt vero ophthalmiae verae, et sanguineae cursus est brevis, et acutus,
 sic contra spuriarum longior, et diuturnior: quo sane discrimine
 praeter alia signa, quae memorauimus, inter se maxime differunt.

§. CCCIV.

Caussae. Ex his igitur intelligitur, quâenam sit harum affectionum
 causa proxima; inflammatio videlicet tam *vera*, quam *spuria*, oculos ipsos quocunque
Communes. modo laceffens. Remotae vero caussae vel communes reliquarum inflammationum, quas jam
 in peculiari tractatu de inflammatione alibi (*Vol. I.*) recensuimus;
 vel sunt propriae, vt praua sanguinis constitutio, febris materia ad oculos delata, acritas

tas variolosa, scorbutica, strumosa, venerea, scabiola, vulnera, ictus, ~~calor~~is aestus, calor, ventus, fumus, acriora in oculos illapsa et quaedam anni tempestates, quemadmodum jam HIPPOCRATES notauit, si hiems, inquit, sicca, et aquilonia fuerit, verò vero pluuiofum, et australe; necesse est astate febres acutas fieri, et ophthalmias, et dysenterias, mulieribus praesertim, et viris natura humidioribus a). Si vero hiems austrina, et pluuiosa fuerit, usque autem siccum, et aquilonium, ophthalmiae siccae sunt b).

a) Aph. XI. sect. III. b) Aph. XII. sect. III.

§. CCCV.

Pro varia vero inflammationis natura, varioque *Differentiae secundariae.*

ejus gradu, et pro diuersa causarum ratione multiplices oriuntur ophthalmiae differentiae, partim jam memoratae, partim per se facile manifestae, in primis causas consideranti, atque ab his adjunctum deducendi, vti magnae, paruae, acutae, lentae, primariae, secundariae, symptomatice, syphiliticae, scorbuticae, scrophularis, et sic porro. Neque ar-

Diagnosis.

duum obscurumque est, differentias supra expositas distinguere, si ad signa jam allata, aut ad anamnesin quis animum aduertat. Magni tamen refert inquirere, an a causa externa, atque euidenti solum morbus proficiscatur, num vero vitium aliquod in sanguine antecesserit; quae commodè ex aegri, atque affidentium ore erui possunt. Deinde utrum inflammatio exteriores solum partes oculi, an interiores etiam occupet vexetque. Si primum, do-

lor plerumque, et pulsatio, tumorque ad proxima quaeque loca, ad tempora, ad frontem propagantur.

Signa exterioris inflammationis.

si alterum, omnia haec acerbius, et profundius excruciant; imo interdum pruritus quidam in naribus, et palato excitatur, quem crebra subsequuntur sternutamenta, praeter ea omnia, quae in cuiusque

Signa interioris.

speciei, aut gradus descriptione memorata a nobis fuerunt. Et quia haec morbi sua quoque tempora, ut reliqui morbi, percurrenda habent, idcirco ea probe cognoscere oportet; quo in primis pertinet lacrymarum consideratio. Vbi enim ruber oculus incipit, et humor tenuis, et copiosus effluit, communiter morbi principium habetur; augmentum, ubi omnia ingrauescunt; status, quando humor, qui exstillat, temperatior, et crassior euadit, sic ut palpebrae facile eo agglutinentur; declinatio demum, cum omnia symptomata se se remittunt, et euanescent.

Signa stadiorum morbi.

§. CCCVI.

Prognosis. Ophthalmia, inquit SENNERTVS a), quae propius ad *Taraxin* accedit, facilius curatur, quam quae ad *chemosin*. Etenim *chemosis*, itemque *ophthalmia interior*, quam a PLATNERO phlegmonem appellari (§. CCCII.) diximus, non solum difficilis curata est, verum etiam suppurationem, gangraenam, aut suffusionem, siue *cataracta*, *staphylomate*, aut *amariosi*, siue *gutta serena* inducta, visus abolitionem minatur. Periculosissima est, quae capitis vulnibus, contusionibusque superuenit, utpote quae cerebri, meningumque inflammationem indicat, mortemque portendit. Generatim saeuior, periculosiorque est ea, quae ex interiorum capitis partium vitio, consensioneque fit, quam illa, quae ab affecto primum oculo est. Pessimum praeterea signum exhibet dolor in ophthalmia diu persistens, et nullis auscultans remediis; causam enim habere videtur non resolvablem, aut rodentem, aut ad suppurationem properantem, a qua vel disrumpi, vel exedi, vel ulcerari vasa, ac tunicae oculorum possunt, in primis cornea lucida, vel congestiones, indurationesque intus fieri, sic ut humores effundantur, erumpant, effluentque, vel suffusio, vel hypopyon,

pyon, vel alia ejusmodi mala, imo coecitas ipsa enascantur. Interdum ophthalmia saepius recurrit, praesertim circa insignes temporum mutationes. Saepo etiam inflammatio ab vno oculo ad alium migrat, quod maxime aduertendum est, vt praecaveri, quoad licet, possit. Exstant quoque in historia medica observationes, quibus ostendi credunt non nulli, ophthalmias quandoque contagione in alios diffundi, quod pariter prope adnotandum est, vt in causam detegendam, arcendamque incumbamus. Magnum quoque negotium facessunt chronicae ophthalmiae, praesertim serophularis, scorbutica, et venerea. Omnes enim difficillime discutiuntur. Venerea prae ceteris, si a gonorrhoea virulenta imprudenter repressa ortum ducat, nisi protinus efficacissima curatio adhibeatur, rapidissime increscit, oculique bulbum destruit, et citissime obcoecat. Venerea pariter, quae lui superuenit, etsi non ita celeri passu ad coecitatem perducit, discriminis tamen plena est, pertinax, et non minus formidabilis. Notha, oedematosa, et singulae ejus species minus quidem periculi habent, sed plus taedii, et diuturnitatis. *Ophthalmia laborantem*, scripsit HIPPOCRATES b), *ab alui profluuiio corripi, bonum*. In *Coacis* vero haec pronunciantur: *Lippitudine affectio suborta febris, solutionem affert: sin minus, coecitatis, aut mortis, aut etiam utriusque metus est* c). Quibus cum lippitudine capitis dolor accedit, et longo tempore perseuerat, coecitatis metus impendet d).

a) *Med. Pract. T. I. oper. T. 2. l. I. Part. 3. sect. 2. cap. XII. p. 270.* b) *Aphor. 17. sect. VI., et Coac. N. 224.* c) *N. 222.* d) *N. 223.*

§. CCCVII.

Indicationes in quauis ophthalmia sunt eadem, *Curatio ophthalmiae.* quae in reliquis inflammationibus, videlicet nimium

sanguinis ad oculos impetum auertendi, stagnantes humores resoluepdi, acrimoniam eorum demulcendi, atque emendandi. Nec aliter adimplendae sunt, quam illis ipsissimis auxiliis, quae ad inflammationis curationem generatim proposita alibi fuerunt; habita tantum caussarum, a quibus morbus proficiscitur, et loci, quem occupat, prudenti ratione. Sunt tamen quaedam cuicunque fere ophthalmiae necessaria, et veluti propria. Primum oportet aegrotantem in obscuro loco conquiescere, atque ab omni luce, oculorumque usu abstinere. Neque opportunum est oculos lippientes deuincire; in primis si humor acrior, vel crassior exstillat, edque infestat; periculum enim est, ne humor, qui effluere deberet, retentus palpebras, et corneam lucidam exulceret, aut palpebrae ipsae inter se, aut cum oculo ipso conglutinentur, aut cicatrice cohaerescant: quod vitium ἀγκυλοβλέφαρον *) vocant, sola chirurgia porro emendandum *). Interdum tamen e re videri potest, praesertim post adhibitam aliquam chirurgiam, oculum deligari: at tum etiam sano oculo fieri necessarium est, ne sani motu, aut sensu oculus laborans concitetur, et detrimentum capiat. Ab aëre quoque arcendus oculus inflammatus est, vitandaeque omnes caussae, aut medicamenta, quae lacrymas mouent.

*) De ejusmodi curatione consulatur **PLATNER**, *Instit. chirurg. ration.* §. 331., et reliqui chirurgiae scriptores.

§. CCCVIII.

*Taraxis
quemodo curen-
da.*

Leuissima ophthalmia, siue Taraxis saepe sola quiete, et lucis vitatione, aut alieni corporis inter oculum, et palpebras illapsi extractione curatur. Interdum tamen, si plethora adsit, aut humorum cacochymia, sanguinis missionem, et catharsin, aliaque peculiari sanguinis vitio aduersa postulat. Non nunquam statim ab initio prodest, si causa ejus sit

fit laxata vasorum compages, aut sanguinis rari-
 tas, ac feruor, oculum aqua frigida, vel oui al-
 burnine cum aqua rosarum albarum subactō, vel
 aqua cum tantillo aceti remixta extrinsecus opo-
 linteoli, subclausis palpebris, fouere. Contra *Frigidum*
 si sanguinis copia, ac densitas, si vasorum irri-
 tatio, et tensio in causa fuerint, aut jam morbus
 aliquamdiu processerit, a frigidis, et reprimentibus
 diligentissime cauendum est. His enim *taraxis* fa-
 cile in phlegmonen conuertitur, quod factum vi-
 dit ab empirico temere aquam frigidam adhibente
 PLATNERVS a). Tunc praestat aqua tepenti, la-
 cte muliebri, decocto seminum psyllii, hordei, si-
 milibusque vti, quibus irritatio, dolor, spasmus de-
 mulceatur, et sedetur. Cognosces autem frigida, *Vilisitas.*
 et reprimentia locum habere posse, si oculorum ru-
 bor dolore, et calore prope careat; nam in laxitate
 vasorum, et raritate sanguinis vterque plerumque
 abest. Vbi vero demulcentia, sedantia, mollientia *Aucubus.*
 dolor, atque irritatio exposcit, vtilissimum est ne-
 ctu pulpam pomorum dulcium sub cineribus cocto-
 rum, et lacte subactam ad mollissimi cataplasmatris
 modum oculis clausis super imponere. Si vitium
 a causa interiore enatum sit, PLATNERVS b) visita-
 tissimum collyrium ex tutia praeparata, et tantillo *Collyrium*
 vitrioli calcinati, inter se tritis, et comminutis, ad- *Plasneri.*
 dita deinde aqua foeniculi, vel rosarum, commen-
 dat. Sed omnia, quae oculum irritare, aut pungere *Salina, et*
 apta sunt, praestat in oculorum ejusmodi morbo *styptica co-*
 praetermittere, in primis salita, aut styptica: nam *pariunt.*
 praeter irritationem, qua malum fere exasperant,
 illud etiam efficere possunt, vt oculi humores opa-
 centur. Nuperrimis enim experimentis, praeser-
 tim MICHAELIS TROIAE percelebris viri, et FER-
 DINANDI REGIS Siciliae Chirurgi ordinarii (quae
 magna ejus laus) compertum est, per remedia, prae-

Adstringentia.

fertim salina, aut acida extrinsecus oculo adhibita lentem crystallinam, aut ejus tunicam pelluciditatem amittere, et opacari, sicque artificiosam induci suffusionem. Non ergo salinis, aut metallicis rebus, etsi vñtatissimis, facile, et temere vti licet. Si malum tempestatum inclementiae, aut represso sudori, aut catarrho originem debeat, sudor matutinis horis leniter proliciendus est. Illud maxime aduertere oportet, ne adstringentia, vti alumen, saccharum saturni, ejus extractum, tutia, atque aliud id genus, nimis facile ad vñsum reuocentur, et si quando, cautissime quidem, et incipiente ad humum morbo, aut jam ad finem inclinato id fiat. Eandem quippe cautionem desiderant, quam de frigidis admouendis praecepimus. Atque haec fere in aliis quoque ophthalmiis obseruari conuenit.

a) *Inst. chirurg. ration.* §. 286, b) *Ibid.* §. 291.

§. CCCIX.

In ophthalmia, chemosi, et phlegmone quid praestet?

In ophthalmia vero proprie dicta, itemque chemosi (§. CCCI.), et multo magis in phlegmone (§. CCCII.) sanguinis missio (juxta illud Hippocraticum; *ophthalmiam venae sectio soluit a*) pernecessaria est. Itaque protinus expedit, sanguinem ex venis brachii, pedis, jugularibus, quin imò ex temporali arteria, etiam iterato pro morbi, atque aegri viribus, mittere; cucurbitulas tergo, collo, et pone aures defigere, hirudines temporibus, atque ossi petroso admoüere, aluum medicamentis anaphlogisticis sat valide subducere, pedes in calidius crebro demittere. Quod si ejusmodi auxiliis proficiatur, et vascula in adnata ampliora, ac turgidiora appareant, haec acu recurua subter trajeleuentur, et scalpello idoneo discindantur, vt sanguinis tantum, quantum haberi potest, effundant, adhibito interea oculo ex aqua tepida fotu, aut bal-

Incisio vasorum adnata.

neo

o, vt humor facilius effluat. Adnatam ipsam, *Scarificatio-*
 ando ita intumescit, vt oculum compressione *nes.*
 asi suffocet, qua interiorem inferioris palpebrae
 nem vestit, altis, et crebris incisionibus perturi-
 re non alienum est, vt sanguine profluente vni-
 rsa detumescat. Sic et oculi suffocatio auertitur,
 timor euitatur, ne per sectionem adnatae, quae
 ulum tegit, staphylomata scleroticae erumpant.
 io, si sic non detumescat, et efficaciore auxilio *Excisio ad-*
 us sit, eam, qua late fieri potest, excindendam *natas.*
 dent chirurgorum praestantissimi; quod in oph-
 almia gonorrhoeica, et venerea grauiore (§§.
 XC. CCCVI.) potissimum locum habet. Inter *Hirudines,*
 um multum profuisse perhibent duas hirudines
 fernae orbitae parti prope angulum externum
 plicitas, cautione adhibita, vt sanguis, postquam
 rudines deciderint, effluere per aliquot horas si-
 tur b).

a) *Epid. l. VII.* b) *Comment. Lips. Vol. 2. p. 400.*

§. CCCX.

In pertinaciori malo, plenoque corporis habitu, *Vesicantia,*
 t cacochymio post vniuersales euacuationes ad *et cauteria.*
 ntharides, et cauteria properandum est. Illae
 ruici posteriori, aut pone aures, aut intra scapu-
 applicantur, vt vlcera excitent. Imo temporibus
 nulli, et syncipiti, si ibi pondus molestum per-
 citur, apponere eas non dubitant. Haec vero
 sa occiput inuri solent. Cauterii genus va- *Setaceum.*
 tus est setaceum, quod collo postico indu-
 tur. Hoc magnam humorum vim educit, amo-
 remque suppurationem excitat, atque adeo vt
 lestius, sic efficacius ad reuellendum videtur.
 Insudria eo frequentissime vtuntur, nec leuiori
 ntenti sunt; nam tantum sub cute cellulosae
 embranae plerumque comprehendunt, quantum

quatuor digitis transuersis, et amplius respondeat. Vix oculorum vllus morbus, aut capitis aliquis pertinacior est, in quo ad hoc chirurgicum praedictum non confugiant. Quod dum promiscue, sine multa consideratione aggrediuntur, fieri non potest, quin interdum praeter necessitatem, interdum frustra adhibeatur, nec semper nocuum

*De setaceo
variae sensu-
sentiae.*

careat. Candidè mihi narrauit chirurgus oculus non sane imperitus, nec meticulosus, post complura facta pericula non admodum prospera, se hanc chirurgiam pene ex toto deseruisse. Contra alius non minus exercitatus, ac doctus testatus est, quid in oculorum morbis grauioribus, diuturnioribusque, aut recidiuis spei superest, id totum setacei administratione situm esse, experientia patres se comperisse. Ex quibus colligere licet, setaceum, vti alia magna remedia, nisi prudenter, considerate, et opportune deliberetur, neque certum, neque innocuum esse in huiusmodi morborum experimentum. Setacei mitior, tutiorque

*Perforatio
auriculae
infimae.*

est, quod in auriculae lobo inferitur. Quamuis lentius ab oculis auocare animus est, post tamen a perforato auriculae lobodiem induntur radices melacae, aut hellebori nigri fibrae, atque singulis diebus renouantur. Sic enim foramen ipsum patet, vt suppuret, et multum humoris eruat. Cauteria non modo propositis locis, verum et in brachiis vtiliter inuruntur, multumque ad ophthalmiam chronicam vincendam, aut ad ejus reuoc-

*In recidiuis
ophthalmiis
cauteria.*

nem praecauendam conferunt. Id in primis vni vsus est in recidiuis ophthalmiis, quae a corporis habitu, aut a peculiari acrimonia nascuntur, veluti variolosa, arthritica, herpetica, &c. saepe, similibusque fouentur. Prae ceteris etiam vni dest aluum lubricum reddere. Immo, hac valido medicamento subducta, sanguis aliorum vberius

Catharsis.

licit

r, facies detumescoit, et vascula rubra, quae iam distendebantur, se se contrahunt, ac deplentur. Hanc alui ductionem saepe felicissimo modo a) subsequitur.

VAN SWIETEN in Boerhaav. §. 396.

§. CCCXI.

culiari vero sanguinis dyscrasiae, si qua subest, *Refrigerantia*.
nmodatis remediis simul occurrendum est. Ni-

feruor, et phlogistica diathesis oppugnatur lactis, decoctis plantarum attemperantium, et larum, hordei, auenae addito nitro, oxymelle, et antiphlogisticis jam pluries memoratis; etiam conuenire possunt, cum malum a vario-acritate dimanat. Scorbutica labes corrigitur *Antiscorbutica*.
vegetabili, specificis antiscorbuticis, sero iti-

lactis, et lacte ipso, in primis caprillo, atque no, quod postremum cuicunque tenuiori, sub-rique acrimoniae obtundendae, atque emen-ae, si diu, et magna copia vsurpetur, mirifi-let. Mercurius, guaiacum, et sarsaparilla vi-*Antivenerea*.
venereum infringunt, atque expellunt. Sed in

ophthalmia vehementissima, quam gonorrhoea tre compressa, aut virus syphiliticum ad oculum elatum genuit (§. CCCIX.), inunctiones mercales illico, et audacter administratae omnem, amque curationem absoluunt. Decocta autem *Depurantia decocta*.
orum, quae *depurantia*, et *sudorifera* dicuntur,

liis quoque humorum vitiis, vbi attenuatione, elutione opus est, egregiam operam praestant. *Antiscrophulosa*.
ilia conueniunt quoque, vbi strumofum virus bum efficiat; sed tum speciatim laudantur ae-

ps mineralis, aut antimoniatum, stibium crudum, actum cicutae, millepedes, radix scrophulariae, tialia, lenia cathartica, atque alia id genus. Nec *Balnea, et aquae medicatae*.
utilitate vacant ad prophylaxin pro caussarum varie-

varietate balnea totius corporis, et medicata aquarum largior potus, vtpote vniuerso corpore lide immutando opportuna. Decedente vero lo firmandi oculi sunt collyriis non nihil rotundis; in quibus excellit aqua frigida, aut chalybe alterata, aut aqua aliqua ophthalmica, aliquid spiritus vini, aut vini ipsius adiectum tamen, vt potius extrinsecus oculo clauso adhibeantur, quam in oculum instillentur; nam posset malum reuocare imprudens ejus irritatio.

§. CCCXII.

Curatio lippitudinum.

Nec alia fere ratione lippitudines reliquas habent. Si quod tamen discrimen est, id est, nonori inflammatione, quacum junguntur, ostendit. Sed ea oppugnata, et discussa cum reliquum curationis partim internis remediis, partim liari humorum dyscrasiae aduersis, partim externis absoluitur. In psorophthalmia pruritus, ardorque demulcent mucilagines ex seminibus althaeae, psyllii, cotonei mali, aqua specierum, solutio gummi arabici, si his palpebrae eluantur. In sclerophthalmia post eorum quae inflammationi tollendae apta sunt, vtilis est, aquis emollientibus calide oculos fouere, linire. Si resoluendum etiam, discutiendum sit, tunc aquis florum sambuci, foeniculi, et flosculi, chelidonii majoris aliquid camphorae, et ci addi oportet, vt his oculi identidem humectentur. Interdum doloris atrocitas aliquid opiorum medici extorquet. *Sies album* RHASIS opium recipit, solet aliis medicamentis comperiturque cum aquis modo memoratis collyrio. Saepissime in hisce spuris ophthalmiis palpebrarum margines, et glandulae speciatim afficiuntur, imo leuiter ulcerantur, puse

Vlcusculis palpebrarum collyrium praestans.

quo fit, vt adnata oculi etiam non nihil com-
ur. Quando id mali incidit, rubent palpe-
tument, dolent, et pruriunt; et post somnum
ie quodam concreſcunt, et glemis ſiccis cir-
cinguntur. Pertinax iſta affectio eſt, nec vn-
diſcutitur, niſi vlcuſcula marginum palpebra-
valide detergantur, atque exſiccantur, et glan-
dularia laborantibus robur, et firmitudo reſti-
t. Quo in caſu, nam inſpectione malum ſa-
etegitur, jubeo; vt per duos, vel tres dies ſae-
cocto hordei tepido oculi, et palpebrae diſi-
ſſime abluantur, foueanturque, quo omnis acer-
or, puriſque reliquiae facilius exeant, atque ir-
o et calor, quantum fieri poteſt, contempere.

Deinde vitriolum cyprium in multa aqua ſo-
i ſic admoueri oculis ſubclauſis debet, vt pal-
rum margines quidem irrorentur, non vero
bulbus, niſi leuiſſime, attingatur *). Prout
minuitur humoris glutinoſi fluxus, et rubor
ſcit, ſenſibiliorque euadit oculus ad remedii
rationem, ſenſim etiam minuenda vitrioli do-
ariusque iteranda remedii adhibutio, donec
vlcuſcula conſanuerint. Sic enim detergun-
leuſcula, exſiccanturque, et laxae partes fir-
ur. Alii vino vtuntur, in quo aes inſuſum
, eoque ſubinde palpebras madefaciunt. Si
ue ſola vaſorum, et glandularum laxitas rema-
unc tutia, aut aluminis coagulum, quod vo-
remedio eſt. Hac vtique ratione pertinaciſſi-
lippitudines citiſſime ſublatas ſaepe vidimus.

ſi vlcuſcula vetuſtate ſordidiora, et profun-
euaserint, non deſunt, qui admouendum ſuſ-
manu vlcuſculis lapidem infernalem, vel la-
diuinum, vel aquam viridem Hartmanni,
e mel praecipiant. In cathaereticorum au-
et cauſticorum adhibitione cauere oportet, ne
oculus

*Laxitati
relictas
quid?*

*Vitruſculis
ſordidior.*

ensio, vnde soluta fibrillarum compage succus citius in easdem excurrere distendit, atque elongare fines, quo usque nisu suo potest.

) Non autem de omnibus vitiis, quae totis oculis accipit, agere nobis animus fuit, sed de praecipua, quae dicis vtpotimum curanda obueniunt. Nam si omnia sequi voluissim, extra fines mihi propositos vagandum foret. His tamen addam *hydrophthalmiam*, *exophthalmiam*, sive *hydropem oculi*; cuius duo genera nobis sunt, unum externum, alterum internum. Externum est, quando aqueus humor colligitur sub adnata, sic ut ea, operata intumescat, et aliquantulum rubeat. Internum vero, quando humor aqueus ita augetur, ut oculi bulbum maiorem, et plenorem efficiat. Facile utrumque vitium alicui patet. Curatur, ut hydropes alii particulares, in primis paracentesi. Vid. *Breve Trattato delle Malie degli occhi di DOMENICO BILLI Cerurgico d'Ancona 1749. Class. second. cap. 7. p. 83 84. 85.* Apud quem videri etiam possunt, quae de reliquis oculi morbis tam versalibus, quam particularibus egregie traduntur.

*) WOOLHOVSIVS in PAVLLO AEGINETA *pterygion* tendum *ungulam* putat, cum τῆ πτερυγία fere idem consistit, ac ungulae animalium.

ONYX, ET HYPOPYON.

§. CCCXIV.

Est alius oculi morbus, cui figura nomen *unguis* ^{* Onyx quid?} esse videtur, Graece dicitur ὄνυξ. Fit autem quando pus intra corneae lamellas coeuit, ut vnguiem, vel potius vnguium praesegmina repraesentet.

Si vero pus ultra corneam in humore aqueo figatur, id *hypopyon* vocatur. Solus AETIVS a), ^{Hypopyon quid?} ostendit eum pauci alii discrimen, quod inter *pterygion*, *onychem*, et *hypopyon* intercedit, recte adnotant.

Lib. VIII. c. 30.

Cura-

C u r a t i o.

§. CCCXV.

*Lenia ca-
thartica.*

Pterygion recens, et tenue, et magnitudinem solis quandoque curatur medicamentis, moderate discutiunt, et abstergunt, vt sunt saccharum candidum, mel, puluis ossium saepiae, tetracouorum aceto acerrimo maceratae, et postea catae, et in subtilissimum puluerem comminutae. haec mitiora non suffecerint, validiora cathartica non nulli proponunt: verum in oculum infundere, aut insufflare, aut alio modo vere medicamenta irritantia, et multo magis

Noxa.

*Pterygii
curatio va-
lidior.*

identia, et caustica periculo non vacat, quia oculum semper inflammant, et corneam pelliculam plerumque attingunt, atque contaminant. prudentius se gerere videntur, dum pterygion pida infernali leuiter, et caute tangunt, et statim oculum in aquam demergunt, vt quidquid cathartici adhaeserit, subito aqua diluatur, auferaturque, ne oculi aliis partibus noceat. Sed si hisce remediis malum nequaquam cesserit, neque attenuatum aut inueterauerit, et durius, et crassius, quam panniculus est, euaserit, nulla praestantior methodus suppetit, quam chirurgica sectio, quae peritior et periculo committenda est. Haec tamen non sine aliqua oculi noxa interdum fieri potest, ob nimiam cum cornea, atque adnata pterygii connexionem. Cicatrix quippe post sectionem relicta, si prope pupillae fuerit, visum impedit, aut minuit. Illud semper consequimur, vt ab epiphora, lacrymatione, et lippitudine, quam pterygion excitat, oculus liberetur. Cautam naturam si adeptum fuerit, aut medicamentis tangi debet, aut sola manus opera excindi. quoque onyx, atque hypopyon non aliam

tit curationem, quam eam, quae manu chirurgica perficitur, quaeque idcirco chirurgis relinquitur.

CORNEAE MACVLAE, ET PVSTVLAE.

§. CCCXVI.

Praeterea aliis morbis cornea obnoxia esse consuevit. In primis ejus perspicuitas tollitur, colorque mutatur triplici ratione; vel enim crassiore, densioreque humore inter corneae lamellas congesto, aut vasculis ejus infarctis pelluciditas vitatur, unde caligine obducta objecta cernuntur, quod malum *nubecula* dicitur; vel ab vlcusculis, aut vulnere, *Nubecula.* ictuue cicatricula relinquitur, quae crassior, albidiorque reliqua cornea apparet, atque haec *albugo*, *Albugo, siue leucoma.* siue *leucoma* vocatur; vel demum post ictum, aut quidpiam simile sanguis effunditur, concrescitque in ipsa cornea, aut sub eadem, atque adeo ejus colorem obfuscat. Id *sugillatio*, siue *ecchymosis* nominatur. *Ecchymosis.* Pustulae etiam exiguae in oculis ab acri vt plurimum humore excitantur, quibus graece *phlyctenae* nomen est. Hae interdum in vluscula *Phlyctenae.* variae magnitudinis, et varii coloris, generisque degenerant; imo cancriferae quandoque euadunt. Neque ab ejusmodi pustulis, vesiculis, vlusculisue cornea ipsa immunis est, nam et adnatae, et corneae aequae accedunt. Singula haec vitia vel solo intuitu cognoscuntur.

C u r a t i o.

§. CCCXVII.

Nubeculae facilior curatio est, quam *albuginis* (§. *Irritantia videntur.* CCCXVI). Haec enim, si crassior, aut antiquior fuerit, vix attingenda; aut certe in ejus curatione cauere oportet ab irritantibus, atque exedentibus remediis, cujusmodi plerumque ea sunt, quae pas-

sim ab Auctoribus proponi solent. Malum quippe exasperant, deteriusque reddunt, inflammatione per irritationem inducta, aut cornea, qua sana et exulcerata. Interdum halitus commansi foeniculi in oculum inspiratus, aut adeps viperæ nubes penicillo illitus non modo innocue, verum etiam vtiliter adhiberi visus est. Crocus etiam, et camphora collyriis adduntur non sine emolumento; nam blande discutiunt, et resoluunt, speciatim aquæ foeniculi, florum sambuci, herbæ euphrasie excepta. Si a cicatrice recenti, nec admodum crassa nubes sit, illam digerere, et tenuare fertur mel, in qua multæ formicæ decoctæ fuerint. Cicatrices a variolis relictæ, præsertim in pueris, plerumque temporis lapsu penitus evanescent, aut valde diminuantur, sola naturæ ope, dummodo a vulgari pulveribus, aut collyriis, quæ ad eas absumendas adhiberi solent, prudentissime caueamus. Pusillæ etiam, siue phlyctænæ non raro per se diffugiunt, disrupta nimirum vesicula, effusoque, quæ continebant, liquore. Imo acu idonea etiam pariendi sunt, ut acer humor, et rodens cito emittatur. Si vero diu persistent, et trahantur, medicamenta tam intrinsecus, quam extrinsecus expulsi-
*Quæ inno-
cua?*
*Mel cum
formicis de-
coctum.*
*Cicatrices
a variolis
relictæ.*
*Quid phly-
ctænæ?*
Resolventia.
*Varicosa
vasa exstir-
pantur.*
*Vlcera cor-
neæ quibus
curentur.*
 demulcent, simulque resoluunt, aut reuellunt. Re-
 vellendi laude præstant eccoprotica, vesicantia, et
 cauteria. Quod si vas aliquod sanguineum turgi-
 dius, et latius ad eas feratur, videaturque alimen-
 tum malo porrigere, hoc chirurgi manu transuer-
 sim discindi debet, ac ne iterum coalitum turgens
 et irritam faciat incisionem, sic concidendam ut
 ut aliqua ejus portio destruat. Vlcera vero, quæ
 ab eis disruptis relinquuntur, interdum ita incau-
 tur, ac profunda fiunt, ut perforata cornea humor
 aqueus effluat, aut vena prorumpat, ac protuberet,
 aut

aut etiam lens crystallina sua e sede dimoveatur, antequam procidat. Curari itaque quam citissime debent, primum iis, quae leniunt, et blande abstergunt; deinde iis, quae nutriunt, exsiccant, et cicatricem inducunt. In magno pretio inter cetera habetur vnguentum WOOLHOVSI, quod componitur ex flore aeris rite loto, et laeuissimo, et butyro recentissimo non salito, vel tenuiori axungia itidem recentissima. Eo autem vlcuscula inungi subinde non alienum est. *Sugillationi* denique ea medentur, quae sanguinem effusum, concretumque resolvere, ac digerere creduntur. Inter haec primus locus vulgo dari consuevit sanguini e penne columbi tenerioris expresso. Sed fortasse praestantius remedium suppeditant fofus, aut vapor ex aquis ophthalmicis, crocus, camphora, aqua reginae hungariae, aut vulneraria collyriis temperatioribus prudenti manu adiecta. Aquae vero huius scopi magis idoneae videntur, quae ex herbis euphrasia, ruta, chaerifolio, hyssopo, floribus cyani, sambuci, tiliae, similibusque eliciuntur. Sed uti-
lius est *sugillationes* eiusmodi praecauere; quod praestabitur icto, contuso, sauciatoue oculo statim rigidam aquam adhibendo, eamque crebro per aliquod tempus, vbi incaluerit, renouando.

S V F F V S I O.

§. CCCXVIII.

Ab externis jam ad interiorum oculi partium vi-
sionem, siue, vt Graeci loquuntur, *hypochysin*, aut
hypochyma, vulgo *cataractam*. In hac autem lens
crystallina, aut ejus velamenta opacantur, vt radiis
lucis impernata sint. Hinc visus primum caligat,
deinde penitus aboletur. Duplex igitur suffusio. *Ejus duplex*
est genus, alterum ex vitio lentis, alterum ex *genus.*

Causae.

vitio velamentorum. Prius nasci ex eo videtur, quod liquor, qui lentem alluit, ac nutrit, vtriusque deficiat. Necesse tunc est, ut ea arescat, contrahatur, et opaca fiat. Id praesertim illis accidit, qui in aliquod minutum opus intentis oculis incumbunt, aut assidua lectione, et scriptione dies, noctesque transigunt. Dum enim musculi recti oculorum assidue tenduntur, quod maxime fit, cum quae coram sunt, et propiora intueri volumus, lenti adprimitur tunica arachnodes, siue capsularis, siue humor ille, qui ex ipsa tunica, ejusque vasculis ad lentem nutriendam impenditur, secerni, et suppeditari prohibetur. Id etiam incidit, quotiescunque iidem musculi ex quacunque alia causa intensius, diutiusque, uti ex inflammatione, aut spasmus, contrahantur praeter naturam; aut vascula capsulam lentis crystallinae, aut lentem ipsam adhaerentia inflammantur, aut obstruuntur. Nutritio autem succo deficiente, prout dictum est, lens crystallina exarescat, necesse est. Deficere etiam potest ejus secretio eorumdem vasorum vitio, additione, infarctu, quemadmodum senibus accidit, verisimile est; ex quo intelligitur, cur hi suffusioni adeo frequenter subjiciantur. Fieri etiam interdum potest, ut succus ipse, qui alere lentem debet, crassior, densior, tenaciorque factus pelluciditatem lenti adimat, aut talis euadat mora, stagnatione, absorptione impedita, heterogeneique alicujus principii mixtione.

§. CCCXIX.

*Alterum
genus suffu-
sionis.
Causae.*

Alterum suffusionis genus oritur, quando velamentum lentis, siue vulgo *capsula*, vitium aliquod cepit. Id evenit multimodis, sed in primis, si tunica ista ictu, aut vulnere dilaceratur, si inflammatio in choroide, et processibus ciliaribus orta ad lentis involucrum protenditur, eidemque labem inferat;

erat; si malus corporis habitus est, vel serosa, atque impura colluies, vel mucus, qui e naribus emungi solet, ad interiores oculi partes fertur, vascula tunicae huiusce obstruit, viasque alias intercludit; si itinera, per quae humor lenti dicatus penetrare debet, ictu vexata laxantur; si mercurio aliquis temere, et sine regimine abusus est, aut corus venere, otio, ignavia, somno infirmauit, vel apitis morbis, ac prae ceteris vehementiore, diuinoque dolore laborauit. Omnibus hisce modis proprium lentis velamentum e pellucido in opacum verti potest. Praeterea non ex hujus velamenti initio oritur suffusio, sed ex opacitate etiam membranae vitrei humoris, qua lentem in se recipit. Si enim commune hoc velamentum, quia radios transnittere ad retinam debet, opacum ex quacunque causa fiat, necessario consequitur, ut lens crystallina suo munere fungi nequeat, oculumque attente inspicienti opaca apparere debeat. Haec sunt duo

Hactenus de vera suffusione.

§. CCCXX.

His tamen addi debent quaedam aliae suffusionis quasi spuriae species, quas clinici pluries obserarunt. Ad has spectat *cystica*, siue *purulenta*, aut *istea* vocata. Interdum enim ex inflammatione velamenti lentis crystallinae pus enascitur, colligiturque intra ipsum, et lentem, sicque format suffusionem modo memoratam. Non nunquam lens crystallina ipsa colliquescit, et in similem humorem conuertitur, turbidum, albicantem, quo opacatur suffusionis iter. Interdum in illo corrupto humore lens exsucca, et opaca innatare visa est a). *Cataractam membranam* cum veteribus non nulli recentiores ponunt, in quibus WOOLHOVSIVS, FREYAGIVS, alique numerantur. Volunt enim, hu-

Aliae suffusionis species, quasi spuriae.

morem aqueum alienis, mucosisque substantiis imixtis alterari posse, atque hinc formari circa pupillam membranae quandam speciem *b*). In equo certe, obseruante LOWERO, mucus ex marginibus pupillae, seu vuae exsudans quandoque concreuit in membranam, quae pupillam obturat. Num in homine ejusmodi membrana dari possit, licet eximii auctores se eam inuenisse, aut acu depressisse testentur, nondum satis compertum *c*) esse, alii putant.

a) HEISTER. in *ephem. N. C. Cent. IV. obser. 178.*
VALSALV. epist. XVIII. §. XVII. PLATNER. Progr. an. 1736. d. XVII. *b*) BILLI l. c. *class. 2. cap. 6. p. 11.*
c) IQS. IRKA de *morb. ocul. intern. p. 69.*

D i a g n o s i s.

§. CCCXXI.

Signa suffusionis.

Incipientem suffusionem denotant cūlices, pilae, muscae, araneorum telae, et similia simulacra oculis obuersantia. Eadem augescēte oculi caligant, et quasi nubecula obtenebrantur; pupillae color mutatur, et vitro opacato fit similis. Perfectissimum, absolutaque suffusione visus magis magisque hebetatur, et penitus aboletur, colore pupillae aut omnino albo, aut lacteo, cinereo, glauco, aureo, plumbeo, cupreo, chalybeo, caeruleo, viridi, interdum etiam rubro. Alias suffusio lentissime ingritur, alias intra paucos dies; idque euenit, cum ictus oculum grauitē laesit, aut rupta, aut inflata fuerunt lentis crystallinae velamenta. Si sola opacatur, et contrahitur, arachnode tamen integra, et pellucida manente; homo inter quae e latere posita sunt, melius perspicit, quae e regione; meliusque in tenebris, quam terdiu, et magna in luce. Tunicam vero arachnoideam, siue proprium lentis velamentum, vitiat

esse ostendit prima morbi origo, nimirum inflammatio praegressa, aut fortis contusio, nullus lucis sensus reliquus vel in ipsis tenebris, licet in his pupilla dilatetur; ipsaque suffusio intus conspicitur albicans, et quasi rugosa.

P r o g n o s i s.

§. CCCXXII.

In suffusione quibus altero oculo conniunkte, alteritus pupilla dilatatur, punctione visus recuperandi, spes est: quibus vero non dilatatur, neminem visum recipere, jam suo tempore cognouit GALENVS a): non enim neruum opticum tantummodo male affectum esse, verum etiam iridem ipsam, ejus vasa, fibras, nervosque vitium cepisse, probabile admodum est. Si aeger lumen non cernat, quamuis, sano oculo clauso, laborantis pupilla dilatetur; nulla, vel modica sane spes superest, facta etiam punctione visum restitutum iri. Altero oculo suffusione affecto, facile alter in eundem morbum implicatur, praesertim in senibus. Primum suffusionis genus (§. CCCXVIII.) interdum apta victus ratione, accommodatisque medicamentis auerti potest, aut saltem, cum ad maturitatem peruenerit, manu tolli, id est acu deprimi, aut sectione corneae extrahi. Contra difficilius, et quandoque nullo modo curatur alterum genus (§. CCCXIX.), in quo praeter lentem crystallinam tunica arachnoides, aut vitrei humoris inuolucrum, qua lenti respondet, aliquo ex modis expositis vitium contraxerit. Et si quid sperari tunc licet, id non in medicamentis, sed in chirurgi artificiosa dexteritate, et manuali opere collocatum omnino est. *Purulenta, cystica, lactea*, itemque *membranea*, si vere aliquando occurrerit (§. CCCXX.), vix curationem admittit,

mittit, nisi *Dauieliana* extractio aliquid audeat. Depressionem feliciter adhiberi posse, spem facit: color ex albido caeruleus, vel parum flauescens: eam vero prope omnem adimit color auro, vel aeri, vel ferro polito similis. Oculus autem ipse considerationem meretur. Si enim nec durus, nec nimis flaccidus sit, nec prorsus sensu lucis careat, is ad depressionem, aut extractionem cataractae idoneus censetur; contra omnino alienus, qui durus, exiguus, concavus, aut nimis protuberans est. Vir sanabilem eam esse perhibent, quae ex graui, diuturnoque capitis morbo, et praesertim dolore atroci, vel ex ictu, vulnere, aut interna oculi phlegmone (§. CCCII.) ortum habuerit. Ineptus quoque curationi chirurgicae reputandus est ille, qui ante nascentem suffusionem jam hebeti oculorum acie laborabat. Huic enim plerumque amaurosis, siue gutta serena accedit; quae eo magis imminere cognoscitur, quo longius a naturali figura pupillae discedit, quo latior, diffusior, immobilior, inflexibiliorque ad quemque lucis appulsus apparere quamquam non omnis dilatatio pupillae, siue mydriasis a sola nerui optici resolutione repeti possit. Iridis enim paralysis a propriis nervis resolutis saepe profluit. Aetas quoque senilis, aut puerilis parum idonea est. Difficilem item curationem reddit malus corporis habitus, aut peculiare aliquod humorum vitium inueteratum.

a) *De sympt. caus. cap. 2.*

C u r a t i o.

§. CCCXXIII.

*Suffusionis
curatio me-
dica.*

Initio morbi cum oculi caligare inceperint, vitari omnis labor debet, in quo oculorum intentio requiritur, et causis, a quibus aut oritur, aut

vetur

tur morbus, medicamentis opportune occurrentem est. Itaque et sanguinis missio in plethoricis, purgatio in cacoehymicis pro re nata imperaverit, et quae sanguinem attenuant, purificant, latilemque aliquomodo reddunt, quaeque reconiores vias, minutissimosque canales aperiunt, destruuntque, non omittenda, si a copia humorum, prava eorum qualitate, crassitie, aut a viarum arctu, obstructioneque malum deriuare videatur. Sciatim serum lactis caprillum, decocta lignorum, a viperina, pulvis millepedum, aut succus opii albi ex his expressus, mercurius, et varia ex eo data remedia, et in primis panacea mercurialis nabarina, cinnabaris antimonii, atque alia huius generis commendantur. Nuperis temporibus huic po adhibita fuerunt extracta cicutae, aconiti, scitillae nigrae, belladonnae, aliaeque ex plantis venatis, et acribus, sed nondum de eorum bonis effectibus satis constat. Gummi ammoniacum et externe applicitum forma liquida video commendari, sed de hoc quoque certiora, et plura experimenta desiderantur. Neque inutilia quandoque habentur, quae aliorum humores auocant, noxios excernunt, aut copiam minuunt, uti ventositas, fonticuli, setacea. Huc spectant errhina, et eorum usum optimi interdum effectus consequuntur. Discussam fuisse suffusionem ope *turbith* mineralis per nares attracti, memoriae prodidit *BOYSS.* Extrinsecus attenuantia, et discutientia liberi etiam solent, inter quae vitrum antimonii, succus metallorum, fel animalium quorundam aquis thalamicis, foeniculi videlicet, chelidonii majoris euphrasiae, similiumque soluta celebrantur.

§. CCCXXIV.

Aucto jam morbo, aut a caussis arte non emendatis, quarum aliquas supra recensuimus (§§.

*Curatio
chirurgica.*

CCCXVIII. CCCXIX. CCCXX.), profecto, raro quam proficitur ista (§. CCCXXIII.) medendatione. Tunc videndum est, num chirurgica ratio institui possit, quod in primis cognoscetis et quae in prognosticis (§. CCCXXII.) indicantur. Curationis autem duplex ratio est, altera, ut

Depressio, et extractio, depressio, depressio, extractio. Depressio

ope acus ancipitis juxta canthum externum unam, vel alteram a cornea lineam immissa perueam, cujus ope lens crystallina cum suo velamento inciditur, et deorsum deprimitur, et deinde infima vitrei humoris parte reconditur, quatuor nouem dies imperata, et oculis ambobus fascia moliter obductis. Extractio vero peragitur incisione inferiore corneae parte, et deinde incisione operis curuae ad tres quartas circuli partes dilatata. Interea speculo oculi sub palpebra inferiori posito firmatur oculus, molliterque, absoluta incisione premitur; quo fit, ut continuo lens crystallina se foramini offerat, si matura fuerit; aut si immatura, ope cochlearis, aliusue apti instrumenti extrahitur. Lacinae denique tunicae arachnoidis, capsulae, et mucosi flocculi e disrupta eadem paulatim extrahuntur. Humorem aqueum effundi, cuique perspicuum est, sed facile is renouatur. De vtraque operatione videantur chirurgiae scriptores; penes quos fusius, et accuratius variae methodi, variaeque operandi cautelae describuntur; hinc totum negotium chirurgi citato, quando operationi locus est, cum ad chirurgiam omnino spectet, committi oportet.

§. CCCXXV.

Quid cataractae maturitas, et quibus natis cognoscatur. Maturitatem cataractae semel, iterumque memorauimus. Nunc quid ea sit, quibus signis prodatur, et quando ejus observatio omitti possit.

eat, paucis comprehendam. Matura suffusio, siue ataracta esse dicitur, quando visionis obscuritas non amplius increfcit, jamque summum suum gradum attigisse videtur. Tunc enim, vt fructus e suo pedunculo, sic ipsa e sua sede facile excuti potest. Ac reuera interdum factum est temporis lapsu, vt sua sede sponte exciderit, visionisque vsum restituerit. Vt vero maturane sit, an cruda, certius percipiat, oculus digito comprimendus, confricandusque est. Si cruda adhuc sit, non nihil diffluit, citiorque euadit, et protinus remota exteriori pressione ad pristinam figuram redit. Contra nulla ex ressiōe ei mutatio inducitur, si maturitatem adpta fuerit. Color quoque diligenter inspiciendus est. Is quo magis albicat, maturiorem cataractam significat; contra dilutior, aut ad nigrum vergens. Bonae notae color etiam censetur, si ex albo caeulescit, aut non nihil flauet, vt supra (§. CCCXXII.) nimaduersum est, ibique etiam, quinam colores eprobari debeant, non praetermissum. Haec autem de vera et legitima cataracta, quam suo loco (§. CCCXVIII.) descripsimus, vere dicuntur; de reliquis (§. CCCXX.) fortasse non item. Illud sane certum est, quod vltimo loco indicare promissimus, maturitatem istam ad suffusionis *depressionem* communiter requiri, non vero ad ejus, vt vocant, *extractionem*. Restat, vt modo aperiam, quando vna alteri praestet. Primo quidem suffusionis generi (§. CCCXVIII.), si non admodum inueterauerit, depressio magis idonea videtur, quam extractio. Facile enim instituitur, et quod magis interest, multo citius, minori que apparatu, nec minori euentus licitate. Non idcirco tamen hoc in casu rejicendam *extractionem* putauerim, si cuiquam magis placuerit, ea potissimum de causa, quod cataracta mel extracta non potest iterum adscendere, quemadmodum

Quando
vtra opera-
tio praef-
eratur.

admodum depressae interdum accidit. Non tamen extractio immunis est ab omni metu; nam facta in ea, si incaute nimis oculus comprimatur, cum aqueo humore etiam humor vitreus effluit, oculique sine vlla spe reliqua vacuus concidit. In altero vero genere (§. CCCXIX.), in quo lens, ejusque velamenta vitium ceperunt, depressioni extractionem anteponendam jure existimant DAVIELII sectatores. Nec dubitandum est, quin cysticae, aliisque suffusionum speciebus (§. CCCXX.), si quod auxilium iis superest, ab extractione sola expectari debeat.

§. CCCXXVI.

Præparatio medica ad operationem.

Ac quoniam medicus plerumque hujusmodi operationibus vel praeest, vel certe consilio aegros dirigit; eum ideo decet non ignorare, qua ratione praeparandi illi ad utramque operationem sint, quodnam diaeteticum regimen adhiberi conveniat, et quid metui post depressam, aut extractam suffusionem possit, quidque vitare, et cauere pro sua parte debeat. Praeparantur ergo sanguinis menses, in primis pletherici, catharsi, tenui victu, tione, et medicamentis attemperantibus, ut quam alienissimi ab inflammatione, qua oculus post operationem corripi potest, reddantur. Operatio vero dies serena, et cubiculum lucidum eligitur, videlicet chirurgus plena in luce suo munere fungatur possit. Peracta operatione superimponitur oculi linamentum, aut spleniolum albumine oui cum rosarum conquassato imbutum; et fascia etiam laxa, firmatur, qua sanus quoque oculus conservari potest, ne motibus suis alteri noceat. Quin si extractio adhibita est, oculus apte vinciri, et ligari debet, saltem pro primis quatuor diebus, si tussis, vomitio, aut sternutamentum incidat vitreus humor ex vulnere corneae prorumpat

lo oculi exitio. Repetitur etiam, si opus fuerit, est operationem ipsam sanguinis missio, et vesperi usdem diei mite paregoricum dari etiam consuevit, ut dolor, irritatioque somno auertatur. Quies *Regimen post operationem.* imma saltem octiduo imperanda est, curandumque, ut capite erecto semper se contineant, tenui victu, et medicamentis diluentibus, et refrigerantibus utentes; caueantque a luce, vomitu, tussi, stercore, masticatione, ac nimio calore. Alius ematibus, aut sero lactis, potuue mellito laxanda est; neque permittendum, ut a lecto egrediendi causa se efferant, sed monendi sedulo sunt, sine conatu in vas sibi apte subjectum deiciant. Post octo demum, aut nouem dies regiminis ratio quantum relaxanda est, oculusque paulatim lucidus, et languidiori assuefaciendus, dummodo post operationem nullum infortunium superuenerit. Post operationem autem interdum accidit, ut sanguis in anteriorem oculi cameram effundatur; ex quo deinde facile hypopyon nasci potest. Si illud forte eniat, praeter sanguinis missionem, superdanda oluentia sunt, et in primis fomenta non nihil ematica, et leniter vinosa. Frequentius vero ophthalmia superuenit, praesertim extractioni, quando npe lens crystallina aegre foramen pupillae transiit, aut cochleari educta vim vacae, et coronae acri intulit. Tunc enim inflammatio ne tota chorioides facile tentatur, non penitus desitura, nisi sit quindecim, aut viginti dies. Curanda autem, ut aliae graues ophthalmiae interiores.

GLAUCOMA.

§. CCCXXVII.

Proximum suffusioni *glaucoma* est. Id vitii conuenit, ubi lens crystallina cum suo velamento multo mole augetur, sicque intumescit, ut vicinae reliquae

reliquae oculi partes vexentur, molesteque premuntur. Hisce se notis prodit malum: *oculus dum digito renitens attollitur, et magis, quam naturalis consuevit, prominet. In eo gravitatis quidam, doloris sensus est a)*. Intus quod visum impedit, et insipienti se ostendit, colorem prae se fert marinae aquae, siue glaucum. unde ejus nomen. Cum morbus adoleuerit, pupillae dilatationem, siue mydriasi etiam inducit; ex vitrei vero, et retinae compressione, quam lens multum adaucta efficit, omnia

Alia glaucomatis generis.

delet videndi facultatem. De alio etiam vitio re memorant scriptores, cui pariter *glaucomatis* nomen tribuunt. Id non crystallinae lentis, sed vitrei humoris proprium est. Adeo dicitur, cum vitreus humor mole augetur, praeter modum intumescit, et pelluciditate amissa glaucum indubio colorem, accurate insipienti satis perspicuum. Vtrique glaucomatis generi superuacua, imo non est quaevis manuum curatio, non secus, ac suffusioni cum mydriasi, siue pupillae, neruum et oculum spectantium, et retinae ipsius paralyticae junctae, quod supra monuimus. Humor vitreus longe frequentius colliquescit, et dissolvitur, et oculus non modo tum caligat, verum etiam caecus fit, et flaccidus, nihilque prementi renititur. Hinc *necesse est*, inquit PLATNER *corrupto vitreo humore, etiam lentem vitari c)*. Quod est alia suffusionis species omnino incurabilis.

Curatio nulla.

a) PLATN. *Instit. chirurg.* §. 1310. b) *Ib.* c)

AMAUROSIS, SIVE GVTTA SERENA

§. CCCXXVIII.

Causa.

Amaurosis est illa visus abolitio, quae vitio vi optici, aut retinae contingit. Haec, si cum alio alio oculi morbo copuletur, ac proinde oculi

similis insipienti appareat, excepta pupilla, dilatata tantummodo cernitur, gutta serena collatur. Causa hujus coecitatis proxima est omnia eadem, quae aliarum paralyis; remota vel ichores nervea filamenta imbuentes, ac latices, vel eorum obstructio, aut pressio, aut diffusio, vasorum sanguineorum plenitudo nimia, variae, aut venae centralis varicosa dilatatio, finium muscularium, et in primis muscoli attollentis, et abducentis, qui cum vagina nervi optici tammodo cohaerent, et super nervum ipsum quantum decurrunt a), conuulsio, aut spasmus, thalami nervorum opticorum corrupti, compressi, lacerati. Sectio cadauerum amaurosin, siue coecitatem inuenit natam a tumoribus nervos opticos comprimentibus, item a glandula pituitaria turgida; vide in nervo optico, aut in glandula pineali; a cerebri vulnere, abscessibus, corruptione, aut tumoribus aliis; a tumore cerebri aequo; ab effuso sanguine; a compressis thalamis opticis; a depresso cranio; a vulnere capitis, et cranii; a nervo optico extenuato, et rupto a*); a cerebri vitiis b), a variis ejusdem morbis; a corpore striato molli d); a sanguine supra membranam cerebri effuso e); ab osse in sinum foramen impactio f); a thalamis strigosissimis g); a morbo ad originem nervi optici h); a tumore eum comprimente i); ab hydrocephalo l), aliisque oribus causis. Itaque morbo originem, atque occasionem praebere possunt scabies retropulsa, ulcerum pestilens consolidata, metastases, casus, ictus, fluxus, inflammatio, diutinus rerum lucidarum, obscurarumque intuitus, inquinamenta primarum, cathartica validiora, atque hinc vasorum aetiam, consuetae euacuationes suppressae, hystericae et hypochondriacae affectiones.

a) ZINN.

p) ZINN. *Descript. anatom. oculi human. cap. 8. §. 1*
et cap. 9. §. 11. a) HALLER. Elem. physiol. T. 4. l.*
pag. VII. §. XIV. b) Id. ib. in not. c) ROEM
Fascic. 2. praef. observ. 3. d) PETIT lett. I. p. 7.
MANNE observ. p. 154. f) WANNER. observ. I.
MORGAG. de sed. et caus. morb. I. p. 74. h) MUR
II. p. 91. i) Id. p. 81. l) MORG. I. p. 181.

§. CCCXXIX.

*Diagnostica
 signa amauroseos.*

Ex his facilis amauroseos diagnosi habetur. Idcirco, arduumque cognitu potius est, utrumque visus opticus, an retina sola laboret? Quae difficultas parum disceptari solet. ETTMULLERVS difficultatem tolli opinatur, docens coecitatem, si latius accesserit, retinae vitio tribuendam esse, si vero repente, et momento quasi ingruerit, vitium illud esse, tunc a nervo optico male affectum esse, ut eam proficisci. Verum, si quis contraria ratione concluderet, non minori fortasse veri specie id faceret. Quis autem retinae vitium a nervi optici vitio facile secernat? Insuper addunt alii, si oculi fricetur, ac prematur digitis, atque hinc pupilla dilatari, et constringi cernatur, indicium esse, utrum opticos integros, atque intemeratos existere, si non iam vero retinam, aut aliquam partem eidem proximam. Contra nervum opticum vitiatum nulla pupillae dilatatio consequatur. Verum maduerant hi velim, iridis, siue pupillae motus saepe superstitem esse in vera amaurosi tam a nervo optico, quam a retinae vitio genita. Satis enim nervos ciliares illaefos esse, ut iridis, et pupillae motus non pereat. Rectius igitur concluditur, si vera amaurosi, si pupillae motus deficiat, si nervum opticum nervos ciliares, et iridis partem non resolutos esse; si contra superstes sit, hos intactos illaefosque esse. Ceterum siue retina, siue nervus opticus proxime laboret, difficillimae curationis indiget.

*Prognosis, et
 curatio.*

iorbus. Quae ad suffusionem, atque apoplexiam urandam proposita a nobis sunt, eadem omnino maurosi, si curabilis est, conveniunt. Interdum tyalissimus mercurio excitatus profuisse fertur. Interdum quoque aliquid emolumenti attulit superilii confricatio, atque spiritus melissae, aut succini, ut cornu certi, qua nervus supraorbitalis, ophthalmici ramus, egreditur, manu illitus, et pluries, iuque adhibitus. Convulsiva, aut spastica amaurosis facile curatur, et fere per se paulatim evalescit. Februm quoque symptoma, aut aliorum morborum, iis superatis, ipsa quoque cessat. Quanloque observatum est, foeminas vtero gerentes, atque inter initia amaurosi correptas, quarto, vel quinto mense, aut demum post partum visum recuperasse; depletis fortasse cerebri vasis, aliorumque sanguinis copia, aut motu conuersis. Superessent alia adhuc symptomata ad visionem imminutam, aut depravatam pertinentia, vti *amblyopia*, *hemeralopia*, *nyctalopia*, *myopia*, *presbytia*, *strabismus*, *nystagmus*, *diplopia*, atque alia, si qua sunt; de quibus tamen, cum in pathologia generali satis explicari soleant, vixque peculiarem curationis rationem obtineant, dicere superfedebimus; eoque pagis, quod pleraque a mala oculi conformatione emanant, perspicillisque solis quodammodo emendantur, a ut aliorum saepe morborum effecta sunt, quibus sublati et ipsa tolluntur *).

Cur alii
oculorum
morbi omi-
tantur.

*) Inter paullo antiquiores, qui de oculorum morbis scripsere, legi merentur MAITRE JEANIVS, SANCTYVEIVS, BOERHAAVIUS, ex recentissimis vero IANINIVS, sique satis noti.

CAP V T XI. DE GRAVEDINE, CORYZA, ET PHLEGMATORRHAGIA.

§. CCCXXX.

Non valde distant ejusmodi affectus, licet a ple-
risque nimium subtiliter, aut scrupulose ni-
mulum distinguantur. *Grauedinem* vocant eam
Gravedo. tarrhalem affectionem, in qua pituitaria membra
sic tumet, vt aëri in nares iter occludat, vocen-
tundat, grauitatis sensum pariat, dolore modo ob-
scuro, modo pungente, modo pulsante caput in-
versum; aut frontem tantummodo, et tempora
affligat, aurium sonitum, ac tinnitum saepe con-
iunctum habeat, nullo tamen inter initia, aut certe pau-
co, et tenui exstillante humore, qui demum circa
finem morbi crassior, tenaciorque factus emungitur.
Coryzam siccam, sed improprie, non nulli nomi-
nant, vt a *coryza* vera, quae humida est, *morphe*
explicabitur, malum discernant.

§. CCCXXXI.

Cum vero e naribus fertur tenuis pituita, sine
humor serosus, ac mucidus, modo crudus, et acri-
tudinis expers, modo acer, et falsus, excitatur
Coryza. crebra sternutamenta cum aliis paullo ante descen-
ptis (§. CCCXXX.) symptomatis, *coryzae* nome-
morbus assumit. Vulgo *distillatio* dicitur. Quod
si assiduum, ac perenne fiat limpidi phlegmatis
licidium, aut sinus potius frontales seroso humore
ita scateant, repleanturque, vt inclinato capite
lico magna vi, et sine vilo sensu prorumpat,
Phlegma- fluatque, *phlegmatorrhagia* *HECKERO*, aliique
torrhagia. nuncupatur. Saepe hisce morbis (§§. CCCXXXI.
CCCXXXI.) accedit febricula, meptisque insolitus
torpor,

corpori; non ex eo quidem, ut veteres putabant, quod e cerebro in nares humor distillet; sed quod utraque pars non absimili pituitosa congestione interficiatur.

§. CCCXXXII.

Proxima *gravedinis* causa videtur congestio sanguinis, et feri in vasis, cellulis; folliculisque membranae pituitariae, et partium adsitaram, non raro ad levis inflammationis naturam accedens. In *coryza* vascula secretoria magis, et folliculi mucosi afficiuntur, unde vberior ferosi humoris, et muci secretio, excretioque. Aucta pariter secretio, et excretio ferosi phlegmatis in sinibus frontalibus causam *phlegmatorrhagiae* constituere videtur, nec ea poni, et concipi potest, nisi sanguis, serumque copiosius ad pituitariae eas partes, quae sinus vestiunt, feratur, congeraturque. Remotae vero causae censentur pituitae, et feri copiosior vis, aucta ejus cohaesio, vel insolita acritudo, vasorum, membranarumque capitis, et potissimum pituitariae laxitas, aut repentina, et subita contractio. Hinc aer humidus, et frigidus, aut siccus, et feruidus, cacochymicus corporis habitus, nicotianae abusus, et expiratio insensibilis cohibita, uti occasionales causae, ut plurimum intercedunt. Quod attinet ad expirationem cohibitam, quae uniuersim incusari solet, hanc ab omni culpa absoluendam censet *GAULIUS* in sua *Statica*, coryzamque deriuandam multum a noxiis, frigoriferisque aeris particulis naribus, ac cutis meatibus receptis, quae bonam sanguinis, humorumque crasim peruertant. Alii frigori hosce affectus acceptos referunt, cum frigore torquent sanguinem, lympham, mucumque cogi, et rassa, et fibras corrugari. Sed neutra harum opinionum placuit *THOMAE SIMPSONIO* a). Etenim is a frigore quidem totum externum corporis am-

Causae bonum affectionum proximae.

Remotae.

bitum percelli, et constringi non inficiatur; sed illud inde consequi, ut ad pituitariam membranam interioresque huiusmodi partes, quasi per refluxum maiori, quam consuetudo ferat, vbertate, atque impetu humores compellantur, et coaceruentur, atque hinc congestio catarrhalis oriatur, de qua sermo est. Si quid vero iudicare licet, singulae eiusmodi opiniones plurimum mihi videntur habere probabilitatis. Quandoque enim aliquid ab annis frigoris in corpus nostrum immitti, quo ad catarrhales affectus via paratur, epidemicae in primis constitutiones ostendunt, in quibus interdum morbus vniuersim diffunditur, ut nemini etiam ab injuriis temporum diligentissime sibi cauenti, aut ex alia aegritudine jam decumbenti fere parcat; dum sub eisdem temporum, frigorisque similitudinibus nihil tale alias obseruetur. Ut plurimum tamen expirationem tam cutaneam, quam narium, et faucium suppressi; sanguinem, lympham, mucumque condensari; vasa, cellulas, glandulasque per frigus coarctari, nemo negauerit, qui physicae frigoris proprietates nouit. Neque a vero alio sanguinem, reliquosque humores, inuenta in habitu corporis maiori resistentia, vberius ex hydraulicis legibus interiores partes petere debere, in quibus pituitaria membrana profecto habenda est.

a) In Dissertationib.

§. CCCXXXIII.

Anni tempora, et aliarum constitutiones.

Sed quaedam anni tempora, et quaedam anni constitutiones hisce morbis procreandis magis consentaneae sunt, in primis tempus vernum, et hiemale aestas sicca, et aquilonia, et subsequens autumnus pluuiosus, et austrinus b), vel aquilonius, et aestus c); itemque subitae, et repentinae aëris ex calido in frigidum mutationes. *Rauedines, et grauior*

ñes in valde senibus non coquuntur d). Quibus dolores capitis, et frontis contingunt tum ex ingentibus ventis, tum ex frigore post. vehementem aestum, eos grauedines potissimum quidem omnino liberant e). In omnibus pulmonis morbis grauedines, et sternutationes tum praecire, tum subsequi, malum f). Haec ex Hippocraticis oraculis ad prognosin. Ceterum iujusmodi affectiones saepenumero mitem morbum faciunt, et sola naturae ope dissipantur. Interdum tamen grauius, et diutius infestant, et tum cerebro ipsi noxam afferunt cum apoplexiae, lethargi, aut etiam catarrhi suffocatiui metu. Nec minora mala timeri possunt, si coryza, aut phlegmatorrhagia frigore incautius suscepto, aut quacumque alia causa repente supprimantur. Nam retropulsa seculosa colluuius interius acutos, vehementesque capitis dolores ad radicem nasi se se protendentes, vertiginem, aurium susurrum, totius corporis lassitudinem, torporem, et febrem lentam arcessit ex SWIETENII g) testimonio. Si humor, qui in coryza exstillat, acrior sit, vlcera etiam narium pessima, ozaenas, cariemque paullatim gignit.

a) Hipp. aph. 20. 23. sect. 3. b) Aph. 13. sect. 3.
) Aph. 14. sect. 3. d) Aph. 40. sect. 2. e) Praedict.
 I. 148. f) Praen. 93. Coac. 399. g) §. 69. n. 6.
 n Boerhaav.

§. CCCXXXIV.

Curatio iis innititur indicationibus, quas in febre catarrhali a) posuimus. Generatim conuenientissima sunt, quae diluunt, lentorem soluunt, congestiones digerunt, acritudinem temperant, expirationis vias aperiunt, atque a capite, naribusque reuelant; vti venae sectio, cucurbitulae tam siccae, quam scarificatae, balnea pedum, eccoprotica ex nanna, pilulae de succino Cratonis, diluta foliorum theae, scordii, cardui benedicti, florum tiliae,

Quomodo
 curantur.

aut sambuci, decocta hordei, radices scorzonerae, chinae, graminis, ligni assafras, pulveres temperantes nitrosi, atque alia hujus generis. Naribus quoque inspirari potest vapor aquae calidae, ex herbis emollientibus decoctae, imo aqua ipsa tepida attrahi; et, si acrimonia humoris exigat, etiam lac aqua dilutum, vel aliquid mucilaginosi. Lenius quoque suffitus ex mastiche, succino, benzoë, bacis juniperi laudantur, in primis ad cubiculi aërem frigidum temperandum. In grauiori capitis afflu, aut contumaciore malo, epispastica ex cantharibus, quae vesicam excitent, collo, brachiisque, et pone aures, imo temporibus admoventur vtilissime. Si malus humor pituitariam exulcerauerit, decocta, vel diluta salviae, menthae, millefolii, saniculae, rosmarini injicienda sunt. Mel etiam subinde addatur, ut magis abstergant. Si haec non sufficiant, decocto guajaci, in primis si sordidum vlcus fuerit, mundari etiam oportet. Sed potissimum ad causam internam, luem veneream nimirum, scorbuto, cacochymiam, aut aliud mali genus coepitum respiciendum est. Vietus quoque ratio causis accommodatur. Aër nimium ficcus vapore aqueo; humidus, atque impurus resinosis, balsamicisque suffitibus, et luculento igne emendatur. Frictiones totius corporis, moderatumque exercitium, quia humorum circuitum, atque expirationem adjuuant, summopere conferunt.

*) Vol. I. De febr. §. CCCXLVIII.

C A P V T XII.

DE NARIVM HAEMORRHAGIA.

§. CCCXXXV.

De haemorrhagia in genere.

Si sanguis insigni aliqua copia praeter naturae institutum e vasis prorumpat, quaecunque sit corporis

corporeis pars, ex qua effluit, generico id *haemorrhagias* nomine designatur. Pro varia vero sede, unde manat, peculiarem denominationem distinctionis causa accipit. Effluere sanguinem e suis *Quos modis fiat.* vasis quintuplici ratione posse, veteres docuere: I. *anastomosi* nimirum, siue extremorum osculorum, quibus donari ultimos arteriolarum fines putabant, dilatatione; II. *diaeresi*, siue canaliculorum diuisione; III. *diapedesi*, siue exsudatione; IV. *rhexi*, siue rptione; V. *diabrosi*, siue erosione. Arteriolarum exhalantium, quae fortasse solae in finibus hiant, dilatatio fit vel impetu sanguinis irruentis, vel canaliculorum laxitate, vel orificiorum atonia. *Causae.* *Diaeresis* contingit a causis, quae incidunt, pun- gunt, aut quocunque simili modo continuum sol- vunt. *Diapedesi* efficiunt nimia ut plurimum san- guinis tenuitas, aut aquea ejus dissolutio, et fibra- rum laxata compages, et pororum inorganicorum, quibus vasa omnia, et membranae scatent, dilata- tio. *Ruptionem*, siue *rhexin* plethora tam vera, quam apparens, ictus, casus, nixus, auctus motus, obstructio, ligaturae, compressiones, spasmus, mem- branarum debilitas, et similia. *Diabrosin* acritates variae, a quibus tunicae vasorum tam interius, quam exterius erodi possunt, donec perforentur. Sed quinque hae haemorrhagiarum rationes ad tres red- igi commode posse videntur, ad *anastomosi*, *rhexin*, *diabrosin*; nam diaeresis cum rhexi, et diapedesi cum anastomosi fere conueniunt, aut certe vix di- stingui possunt; cum tam in punctione, quam in ruptura continuum solvatur, et in diapedesi aequae, ac in anastomosi sanguis sine continui solutione ex- sudet, et exstillet.

§. CCCXXXVI.

In quavis igitur haemorrhagia inuestigandum *Signa causa-* maxime est, qua ratione, et qua ex causa fiat. Id *rum.*

circo et quae eam antecesserunt, et quae comitantur, et ipsa sanguinis diathesis consideranda sunt diligentissime. Ictus, attritus, vulnus, immodicum exercitium, aliaeque causae extrinsecae per se facile patent. Ex aegri autem habitus, temperamento, victu, genere vitae, aliisque aut excedens sanguinis copia, aut raritas, aut tenuitas, aut acrimonia, aut atonia, et laxitas solidarum partium dignoscuntur. Retardatum vero alicubi sanguinis motum, aut impeditum circuitum, et simul alibi auctum impetum indicabunt vberior ad partem, unde dimanat, appulsus, tumor, distentio, rubor, vehemens vicinae regionis pulsatio. Aliquid etiam lucis affert attenta sanguinis effluentis consideratio. Floridus, rubicundus, magno impetu erumpens sui copiam, aut raritatem ostendet, et, si difficultor, ac tarde concreascit, etiam dissolutionem. Tenuis vero, aquosus, et aquae, in qua caro soluta fuerit, non absimilis serosae partis excessum, aequamque diathesin.

§. CCCXXXVII.

*Divisiones,
et differentiae.*

Diducitur haemorrhagia in eam, quae ab externa vi, et in eam, quae sponte, et a causis internis proficiscitur. De illa, quam etiam *violentam* dicunt, agitur a chirurgiae scriptoribus; de hac vero, siue *spontanea* medici potissimum tractant. Alia item *salutaris*, aut *critica* est, alia *non salutaris*, aut *symptomata*; alia demum *habitualis*, alia *accidentalis*. Salutaris illa dicitur, quae causam morbum efficientem, aut effecturam, aut morbum ipsum tollit; vti accidit, quando corpus a superfluo, et exuberante sanguine liberat, aut congestiones soluit, quod saepe adolescentibus, et iuuenibus praesertim feruidioribus obuenit. *Salutaris* quoque ea est, quam *criticam* dicunt, velut quae acutos morbos, phrenitidem, sphacelismum cerebri,

bri, apoplexiam, hepatitidem, pleuritidem, co-
aeam; grauedinem, nervorum distentionem,
rem ardentem; aliosque similes judicat. *Non*
aris est ea, quae neque morbum tollit, neque
causam, aut novum aliquem morbum infert.
nanc spectat etiam *symptomatica*, itemque illa;
nimium protrahitur, viresque exhaurit, et sic
n morbum post se relinquit. *Habitualis* cre-
reueritur, et praeter euidentem, peculiarem-
causam accedit. Contraria fit ratione *accidentalis*.

§. CCCXXXVIII.

aemorrhagiam eo majus periculum afferre, quo *Prognosis*
is insignioribus fit, non est qui non videat. Quo
n profusior est, et breviori tempore plus san-
is projicit, ut aliquot ejus librae cito effluent;
imbecillior aeger videtur, et maxime si simul
s, labia, ungues, et reliquum corpus palleant,
ema frigeant, arteriae subeant, deficientque,
aus occupet, et animus linquatur; eo pro-
imminet extremum vitae discrimen. Defe-
vero animi non semper terrere omnino debet;
interdum sanguis, quem reliqua auxilia cohi-
non potuerunt, intercepto aliquantulum, aut
cente cordis motu, cum minus, vel parum,
nihil a tergo vrgeatur, subsistit, concrefcit in
mbos, et vasa aperta occludit, nisi etiam pro-
vi contractili constringantur. Periculosior quo-
st ea, quae ab interna causa efficitur; aut cer-
m minus prudentiae, atque opis exigit ipsa,
i quae ab externa. In uniuersum facilius cura-
irno non raro per se ipsam, et sponte cessat
ex plethora oritur. Denique quaecunque
haemorrhagia, si pro ejus duratione, copia
iris effusi modum non excedat, ex se sola non
it magno detrimento esse. At si modum ex-
cit, animi deliquia, corporis languor, cachexia,
V 5 hydrops

hydrops timeri debent. Nec obstat proflare et pla quaedam sanguinis enormi copia excreti periculo quidem non exiguo, sed sine vitae jam. Pessimum demum signum jure habetur, si ab morrhagia pulsus occultentur, vacillent, escant; syncope crebro ingruat; extrema frigescant et membra conuellantur.

§. CCCXXXIX.

De haemorrhagia narium speciatim.

Quae hactenus de haemorrhagia generaliter applicata sunt, accommodentur etiam pectus sanguinis e naribus profluio, siue narium haemorrhagiae, quae ex disruptis, aut dilatatis, aut erosis, aut laxatis membranae pituitariae vasculis oriri contingit, easdemque remotas causas agnoscit, quae terae haemorrhagiae. Praeter communes differentias, de quibus jam (§. CCCXXXVII.) dictum, hujus propria est illa, quae a modo, quo effluat, sanguis, deriuatur. Etenim vel abunde, et magno fluxu erumpit, et tunc vera est narium haemorrhagia; vel guttatim, et parcius, lenteque effluit, tunc *stillsidium* dicitur. Quod ultimum in multis symptomaticum est, atque inutile naturae remedium; nihil enim paucum communiter esse periculatum a). Narium haemorrhagia senibus saepe superueniens saepe apoplexiam praedicat, hominibus valde imbecillis haemorrhagia acuta saepe vitam cum sanguine effundit, vel tabem relinquit, aut cataractam, glaucoma, guttam sentiat, et ex his oculorum caliginem, et coecitatem. Hecticis vero, quibus sanguis colliquescit, et vasa laxa sunt, haemorrhagia mortem, quam portendit.

a) Coac. n. 57. 337. 340. b) PLATNER. *Art.* §. 269.

C u r a t i o.

§. CCCXL.

Salutaris, et *critica* narium haemorrhagia, dumdo immodica non sit, quo casu salutaris esse ne-
ret, minime cohibenda est. Cohibita enim

*Curatio
duplex.*

eter alia mala interdum conuulsionem arcessit,
i sanguinis detractione sedandam a). Non sa-
aris curationem exposcit. Curatio autem duplex
alia haemorrhagiae praesentis, alia post eam jam
npressam. Tempore haemorrhagiae ea adhiben-

, quae sanguinem sistunt. Haemorrhagia jam
ibita, vel diutius protracta, causae eam efficien-
occurritur. Multa ad sanguinis fluxum sisten-

*Triplex re-
mediorum
genus.*

m proponi solent, quorum aliqua sanguinis co-
m minuunt, ejusque cursum a naribus auertunt,
qua pravam ejus qualitatem emendant, aliqua
num ora vasorum coarctant, et claudunt. Pri-

*Primum ge-
nus.*

generis remedia sunt sanguinis missio per inter-
lla opportune iterata, cucurbitulae tam siccae,
am scarificatae ceruici, scapulis, dorso, cruribus,
hypochondriis b) applicitae, artuum ligaturae
orificae, et sanguinis per venas regressum retar-
ites, terror repente incussus, aqua frigida inopi-
nti in faciem, aut dorsum inspersa, aut pudendis
nota, lipothymia, epithemata ex gypso, aceto,
albumine oui parata, et fronti frigide imposita.

Coac. 336. b) VAN SWIETEN §. 741. ibique al-
at GALENUM, qui cucurbitulam hypochondrio dextro
igebat, si sanguis e dextra nare fluebat; sinistro, si e
stra; sicque sanguinem illico sisti testatur.

§. CCCXLI.

Ad alterum genus spectant multa, et varia, prout
iat sanguinis vitium. Nam si sanguis nimium
estuet, ac turgeat, refrigerantia conueniunt ex
luca, nymphaea, portulaca, acetosa, atque om-
nia

*Genus alte-
rum.*

nia subacida, et temperantia, imo acetum, et da ipsa mineralia, item emulsa ex seminibus frigidum, et similia. Enemata actu frigida et exandam aluum, et ad sanguinis feruorem inhibendum subter dari suadet PLATNERVS a). Si aquea tenuitate sanguis peccet, et simul atonia, laxitas solidarum partium concurrat, adstringentia et roborantia, vti plantago, vrtica, consolidida, cortex peruuianus, cascarilla, bistorta, tormentilla, tonea mala, malicorium, balaustia, terrae corallia, et ferrum opportunissima sunt. Si acrimonia subsit aliqua, eidem opponi debent peculiariter aduersa creduntur, et ea, quae decedunt, atque inuoluunt, alibi jam multoties memorata. Prae ceteris autem opium, plethora abluenda commendatur, vtpote quod nimias quascunque euacuationes praeter sudorem compescit, nervorum sensibilitatem minuendo, et spasticos motus sedando. At licet vim cordis intendere non tamen dandum est aegro viribus fractis, cautissime, et quodammodo cicuratum, quod aethiope vegetabili, in diascordio Fracastorii, etque praeparationibus.

a) L. c.

§. CCCXLII.

Adstringentia externa.

Vasorum oscula claudunt, quod tertio loco sui, medicamenta extrinsecus applicanda, cuius di sunt alumen, vitriolum, sanguis draconis, ricus *pedis equini facie* quercui adnascens a), et alia. His turundae conspersae, aut in iis intinctae in nares induntur, vt aperta vasa primant, atque adstringant. Linamenta quoque vini spiritu meracissimo, et calido, vel balsamo stringenti Gherlii, vel ex tinctura catechu et ad id commendantur. Valentius agunt pulvis colokotaris adiuta, aut phlegmate vitrioli madefacta.

complures aquae vulnerariae romanae maxime sunt, tamquam certissimo euporisto, etsi amara admodum ejus virtus aequis iudicibus videatur.

Fuligo, si alia ad manus non sint, cum albume oui subacta, ac turundis, vel gossypio inductaissime in nares intruditur. Sed tot medicamentum non est. Solae turundae ex linteis carptis contortis sine alio additamento sufficiunt, si in eas ita indantur, ut valide vasculis apertis adpropinquarent. Adprimuntur vero multis rationibus, quas apud chirurgos videre est. Si altius peremitti debeant, ut ad ora venarum hiantia perant; filo alligantur, quod per nares, faucesque circumducatur, et quo exit sanguis, adplicat, et prout esse est, dirigit; quemadmodum tradunt chirurgiae magistri. Interdum sola narium per digiti compressionem continuata, si anteriori e loco sanguis manet, sanguinis fluxus sistitur.

) De hac fungi genere, ejusque usu vid. *Comment. ienf. vol. 1. p. 144.*, et *Observ. sur l'usage de l'Agaric* 1. GEORGE HEATE. London. 1758.

§. CCCXLIII.

anguine cohibito, si haemorrhagiae origo ab aliqua lae sit, aut ab aliqua causa manifesta pariat, accommodatis remediis utendum est, quibus mali reductus praecaveatur. His autem remedium regimen opportunius adjiciatur. Aeger in lorigidiusculo, et obscuro quiescat, leviter stratus, et capite erecto, et sublimi se continet, neque multum loquatur, neque quidquam leve sumat, aut solidi mandat. Liquida igitur alimenta, et refrigerantia sint, ne maxillarum motu uinis fluxus augeatur, aut renouetur. Exulent sanguinem augent, aut concitant, aut attenuant. Aqua frigida potui detur, vino interdicto, summus virium lapsus suadeat, tantillum vini, quod

Cura praehylastica.

quod tenue sit, rubellum, et subaustorum con-
dendum esse. Motus omnis siue animi, siue
poris diligentissime vitetur.

C A P V T XIII.

DE DOLORE AVRIVM, ET QVIBVSDA AVDITVS VITIIS.

§. CCCXLIV.

*Otalgia ve-
ra, et spu-
ria.*

Aures dolori, siue *otalgiae*, non solum
alia quaeuis pars, et quidem molestissima
noxiae sunt. Itaque de eo primum, deinde de
busdam auditus vitiis, videlicet abscessu, vicere,
ditu graui, surditate, et tinnitu sermo habendus.
Duplex *otalgiae* genus occurrit, alterum sine
inflammatione, alterum cum inflammatione con-
iunctum. Prius illud *otalgia spuria*, siue *notha*, potius
verum vulgo audit. Hanc alij *otiten* appellant.
Quies. Sedes vtriusque frequentior est membrana, quam
meatum auditorium intus succingit, ac crassa
secernit, effunditque. Non ideo tamen reuera
interioris auris particulae, vt tympanum, et
rinxus, dolore immunes sunt, licet reuer-
tarius eo afficianter.

§. CCCXLV.

*Causae, et
signa.*

Otalgiam *notham* procreant vel nerui irrita-
spasmi, vel humor acer, et serofus, aut rheu-
cus congestus, aut alia quaeuis causa fibras,
vos, vasa distrahens, comprimens, aut vel
Veram autem, siue *otiten* aliqua vnus, vel
um auris partium inflammatio. In illa febris
la est; in hac dolori febris adiungitur. Quo-
ter vtramque discrimen praecipuum constituit:
vtraque aures tinnunt, atque obsurdascunt.

et occasiones otalgiae multiplices sunt. In
his frequentissima reputatur dentium molarium
motio: rami enim nervi maxillaris inferioris, qui
ad quinti paris ramus est, et qui ad linguam
inet, cum minori nervo, qui ab aure descen-
dit et a septimo pari, huiusque portione dura de-
bitur, una coniunguntur a), et miscentur. Ex
sequitur, ut summa inter maxillam, et aurem
infitio, quocunque modo ea fiat, intercedere de-

Post hanc veniunt subitae, et vehementes
pestatum, atque aëris vicissitudines; catarrhi
orti; subitum frigus capiti, aut pedibus caler
s admissum; tinea, achores, scabies, retropul
metastases in febribus acutis; aliena in aurem
ola, ingressa, intrusa, innata; ac demum cuncta
quae ad dolorem, aut inflammationem inferen
valere, pluries alibi memoravimus.

PLATNER, H. C. 4-340.

§. CCCXLVI.

pecciatim, *otitis vera*, sine *otite* se prodit dolor
cutissimum, calore, ardore, *pulsatione* arteriarum
icta, febre vehementi, et puncturis crebris, sic
ars quodammodo cerebrari videatur. Nullus
en tumor, ruborque nullus extrinsecus conspi-
cit, nisi forte exteriora quoque eodem malo te-
litor. Pro loci vero diuersitate, quem inflam-
matio incessit, propria quaedam, ac peculiaris in-
fereruntur. Quando meatus auditorius so-
modo inflammatur, dolor magis externus est;
recrudescit, auditus potius obtunditur, quam
etitur; atque interior ejus facies, quae oculis
t, insigniter rubet, ac tumet. Membranam
o tympani, hujusque cauum inflammatione
ari noscimus, si doloris sensus interior, atque
ior videatur, ad fauces vsque porrigatur, ma-
gnum

*Otitis de-
scriptio.*

0.17 mm. Am
nucleus

gnum tinnitum socium habeat, nec tamen auditu penitus auferat. Atrociora omnia, si intima tertia auris cauea, labyrinthus, videlicet, laesum. Tunc enim auditus fere aboletur; dolor acerrimus, penitiorque est, ad caput, cerebrumque protenditur ac pene dementat; et non raro nervorum intentiones, vomitus, animi deliquia, ac delirium superueniunt.

§. CCCXLVII.

Prognosis. Otalgia vera, siue otites grauior est, et periculosior altera; eoque magis, quo penitiores morbi des affligit, et quo minus cerebro parcere videtur. Hinc non raro septimo die enecat, nisi arte citissime resoluatur; aut narium haemorrhagia operatur, aut pus ex aure erumpat. Resoluitur quandoque; crebrius in suppurationem definit, pure deinde mutante magnum dolori, et grauius leuamen accedit. Verum ab abscessu viuis interdum relinquitur, quod, nisi bene coeat, perpetuum sonitum, aut strepitum creat. Otalgia a humoribus aut affectibus catarrhalibus, interdum siccis, interdum alui fluxu finitur.

§. CCCXLVIII.

Inflammatio tollenda.

Resoluenda igitur statim ab initio inflammatio est venae sectione, scarificatione occipitis, auricularum, balneis pedum, leni alui ductione, emollicamentis antiphlogisticis, ac diluentibus. Eiusdem secus etiam fomentis, cataplasmatibus anodynorum solutio tentanda. Dolorem lenit aqua tepida muliebre, aut vaccinum, oleum amygdalarum amararum, vitellorum oui, seminum papaueris albi, hyoscyami recens expressum, si in aurem infundatur aut gossypium ex his madidum indatur. Si otitis

catarrho, ac serosa congestione fit, auocandus humor est cucurbitulis; cantharidibus collo, aut pro-
 essui mastoideo impositis; sialagogis, radice pyre-
 hri videlicet, pimpinellae albae, mastiche, pipere,
 foliis nicotianae ore detentis; catharticis, ac sudoriferis. Neque sanguinis missio praetermittenda
 est, quando doloris acerbitas praesentissimum auxi-
 um petit. At si neruorum affectiones, et spasmi,
 quod hystericeis, hypochondriacisque saepe euenit,
 dolorem exciuerint; opio, anodynis, atque anti-
 spasticis ei occurrendum est. Ignorari vero non
 lebet, quaecunque in aures demittuntur, cuncta
 prius leuiter calefieri oportere. Neque his, prae-
 tertim oleosis, abuti licet; nam ita interdum la-
 cantur aures interiorae, aut obstruuntur, vt aegre
 deinde in integrum restitui possint. Si quid demum
 alieni in aurem aut irrepsit, aut in ea concreuit,
 quod otalgiam efficiat; id dexterrime, et citissime
 educi debet. Vermes oleosis, dulcibus, aut, vt
 aliis placet, amaris occidi; pulices, atque alia in-
 secta aqua, melle, aut gossypio immisso extrahi pos-
 unt. CORN. CELSVS, lanae paullulum, inquit, in
 urem compellendum est, quo pulex, vel aliud animal,
 quod intus est, illud subeat, et cum eo extrahatur. Vbi
 vero suppurationis initium est, emollientia
 ataplasmata ex mica panis albi cum lacte, et foliis
 maluae decocta super dentur. Pus autem confe-
 tum auocetur pinguibus, aut frusto lardi, aut bu-
 yro, et jam exiens eluatur aqua hordei vel simpli-
 i, vel mellita, et si abstergendum magis sit, aliquid
 mellis ex rosa adicere opportunum est. At vbi
 vultus humor ex abscessu, aut vlcere diu profluit,
 inconsulto comprimi non debet. Saepe retentus
 unculos agit, aut in cerebrum magno vitae peri-
 culo conuertitur. Quare fatius est iis vti, quae
 humorum dyscrasiae prospiciunt, totumque corpus

*Otalgia ca-
 tarrhalis
 quomodo
 curanda.*

*Otalgiae
 neruosa
 cura.*

Aliena.

*Vermes,
 pulices, in-
 secta.*

Abscessus.

*Pus ni-
 mium.*

*Tubercula
meatus au-
ditorii.*

emendant; quo fere fit, ut vlcus sine noxa coale-
cat. Interdum folliculi sebacei, siue glandulae,
quibus cerumen aurium secernitur, alicubi obstrue-
tur, et tuberculum aliquod formant. Id si infla-
mationem subeat, grauis otalgia oboritur, cito
abscessum desitura. Huic raro venae sectio neci-
saria est. Sola emollientia, anodyna, et demul-
centia sufficere consueuerunt.

a) L. VI. cap. VII.

GRAVIS, DIFFICILISQVE AUDITVS

§. CCCXLIX.

Imminuitur audiendi facultas, siue grauior, diffi-
ciliorque auditus euadit (*dyscœcia*, vel *hyporophia*
SAUVAGESIUS vocat) multimodis, praecipue vel ex
auriculæ vitio, abscissione, mutilatione, depressio-
ne, vel ex meatus auditorii obstructione, com-
pressione, tumore, cerumine indurato, pure con-
creto, crustisque innatis; vel ex tympani membra-
nae, aliarumque partium relaxatione, aut ex
humoris copia illas alluente, ut in catarrhis
consuevit; vel etiam ex consensu primarum viarum,
ut in hypochondriacis. Auriculæ defectum sup-
plet corniculum acusticum. Obstructum meatus
auditorium referat ceruminis, aut puris concretæ,
aut crustae innatae dissolutio per saponacea, atque
oleosa injecta, tumorum exstirpatio, incisio, ob-
structio. Tympani membranae, contentisque par-
tibus robur, et firmitatem reddunt suffumigia fœni-
culi, et leuiter balsamica, aut essentia castorei, tinctura
succini, spiritus vini camphora non nihil imbuuntur,
quibus gossypium intinctum meatui auditorio in-
struitur, ibique relinquitur, ut aëris humiditas arce-
atur. Serosam, catarrhalemque illuuiem reuellunt
euacuantque errhina, sialagoga, diuretica, hydra-
goga.

Curatio.

ga, sudorifera, fonticuli, setacea, vesicantia occipiti, aut processui mastoideo apposita. Saburra, primis viis insidet, et grauem auditum efficit, scoproticis educitur; spasmus vero, si ab his morbus pendet, paregoricis, et antispasticis sedantur.

S V R D I T A S.

§. CCCL.

Si meatus auditorius membrana praeter naturam, *Causae,* in recens natis interdum accidit, aut alio organico vitio occludatur; aut tympani membrana rilesca, aut ossa facta sit, aut disrupta, aut exesa; aut ossicula tympani, aut labyrinthi, aliaeque interiores partes graui labe, carie, ulcere contaminatae, aut aliter destructae sint; aut tuba Eustachiana paluerit, quod tumore, scirrhu innato, aut cicatrice, ut post ulcera venerea faucium, fieri potest; ut nervi acustici paralyti resoluti fuerint, ut post apitis ictus, vel apoplexiam euenit; evidentissimum est, surditatem, siue *Cophosin* subsequi, siue *Cepho-* auditum deleri, et nullam ferme spem relinquitionis, excepto eo casu, in quo incisio meatum perire potest. Aqua praeterea repletur interdum tympani cauum propter tubam Eustachianam obstructam, aut aliter clausam, aut propter inhibitam, et deperditam vasorum absorbentium, siue lymaticorum facultatem; sic autem repletur, ut tympani membrana extrorsum vrgeatur, et stapes *Ceratio,* vestibulae ouali, membrana vero fenestrae rotundae extrorsum vehementer adprimatur; quam ob rem auditus paullatim aboleatur necesse est. Tunc si id auxilii est, id certe expectandum videtur vel gargarismatis, vel a sialagogis, vel ab ulcere processui mastoideo, cujus cellulae cum tympani cauo communicant, per ferrum ignitum, vel lapidem

infernalem, vt BELLOSTIVS suadet, inuito, diutissime manante.

AVDITVS. DEPRAVATVS.

§. CCCLI.

Supereſt demum auditus deprauatus, ad quem referri debet, auditus acutiſſimus, tinnitus, ſuſurrus, bombus, et ſibilus, ſoni nimirum præter naturam, qui ex nimia ſenſibilitate, vel ex tremoribus auditus et inordinatis in aurium caueis, offiſculis, membranis, aliisque partibus excitatis oriuntur. Hæc *Paracusis*, vno *paracusis*, ſive *auditus falſi* vocabulo vagariſſime complectitur. Tremores autem illi ex plethora, vel ex ſanguinis copia in vaſa capitis, et aurium impulſa, vel ex fibrarum muſcularium ad aures ſpectantium aucta irritabilitate, aut per ſtimulos quosdam excitata, vel ex aëris in cauitate tympani, aut aquae in labyrintho, ejuſque ductibus contentae agitatione gignuntur. Quis enim non videt, a validius pulſantibus aurium, aut arteriolarum inſolitum quaſi corporis percuſſum ſentiri, aut a tenſione nimia membranae tympani, muſculorumque, aut a nimia neruorum ſenſibilitate moleſtiorem, acutioremque auditum reddi; aut concuſſis offiſculis, aquae labyrinthi tinnitum, ſuſurrum, aut denique ab aëre intra tympanum clauſo, et expanſo, repenteque per tubam Eſtichianam exploſo bombum, vel ab eodem ſecundum ac diſſiciliter per eam erumpente ſibilum quomodo excitari? Interdum hanc varia auditus deprauationis ſymptomata ſeorſum, et ſolitaria incident, interdum neruorum diſtentionem, epilepſiam, maniam, deliriumue antecedunt; interdum in acutis ſuperueniunt; interdum alias aegrotantium vti hypochondriaſin, aut hyſteriam, ſubſequuntur.

Curatio. Singulis his curatio adhibenda eſt, quae cauſas

immodata videtur, quaeque ex superioribus erui-
cillime potest.

C A P V T XIV. DE ODONTALGIA.

§. CCCLII.

Dentium dolor vocatur graece *odontalgia*. Qua *Odontalgia.*
dentes in alveolis reconduntur, caui intus
nt, nervis, vasisque sanguineis instructi. Exterius
eriosio, ligamentis, ac gingivis firmantur. Si *Descriptio,*
icubi inflammatio fiat, aut serosa congestio, aut *et explicatio.*
per, irritansque humor aliquam ex illis partem
ellicet, aut caries dentem exedat, dolorem induci
eccessu est varium, variaque inde symptomata nasci.
lerumque gingivae tument, ac rubent, imo ma- *Symptoma-*
e ipsae similia patiuntur; febris quandoque acce-
it, pulsatio, vigilia perpetua, aurium, oculorum,
t capitis per consensionem dolores. Inflammatio
ue socia, siue pedissequa saepenumero in abscessum
esinit. Si interiora hoc occupentur, dentis ca-
es, vacillatio, corruptio, fistula timeri possunt.
i exteriora, parulis, epulis, ac gingivarum destructio.
aussiae remotae fere eadem sunt, quae otalgiae. *Causae re-*
ro caussarum vero ratione etiam curatio variari *motae.*
ebet, quemadmodum in curatione otalgiae prae-
eptum est.

§. CCCLIII.

Praeter ea, quae primo ad otalgiam (§. *Curatio.*
CCXLVIII.) proposita sunt, laudantur lenia dia-
horetica, in primis roob baccarum sambuci ad vn-
iam vnam pro dosi, et anodyna. Ore continen-
um est vel lac calens, vel aqua ex capitibus papa-
eris albi, vel seminibus hyoscyami decocta, et cum
auxillo aceti remixta, cautione adhibita, ne deglu-
tiatur.

tiatur. Extrinsecus etiam fofus, et cataplasma molliſſima, et dolorem ſedantia loco dolenti aduſenda ſunt. Intrinſecus praeterea aliquid opii dolor vrgeat, dari licet. In ea odontalgia, quae ſeroſa congeſtione, aut ab acri humore eſt, nulla aliena curatio videtur, quam otalgiae ex ſimili causa natae (§. CCCXLVIII.) idoneam poſuimus. Nulli anthelictis extremum, antitragum, aut auriculae lobulum inurendum iubent ferro ignito, aut moxa. Sed praetantior locus eſt pone aures, et ſubter eas, quoniam arteria, vena, et nervus ibi aure ibi exiſtunt, et maxillam inferiorem ingreditur, et ſecundum ejus longitudinem in os omnium dentium inferiorum radices diſtribuuntur. Hic itaque cauteria, aut veſicantia magis conueniunt, et ſerum acre reuocant, excernunt, et quodammodo nerueam ſenſibilitatem, atque ataxiam delent. Obſeruatum enim eſt, ſola validiori compreſſione pone maxillam inferiorem adhibita, interdum dolorem illico compeſci. Emplaſtra autem ex maſtiche, baſamo peruuiano, camphora, et alijs que compoſita, et temporibus, atque infra orbitam applicita celerrimum ſolament afferunt. Nervus quippe a quinto pari ad muſculos temporales pertinens ejusdem originis eſt cum neruis, qui ad dentium radices feruntur, et ſub orbita qui ſtatim egreditur neruus, ad dentes anteriores maxillae ſuperioris porrigitur.

§. CCCLIV.

Dentis caries.

Dolor a carie dentis opio indito, aut guttula caryophyllorum, vel ſpiritus vitrioli inſtillata, et goffypio excepta, atque impoſita egregie ſedant. Si huic auxilio non ceſſerit, ferramentum ignitum per cannulam in cauum dentis demitti oportet, quod et caries, et neruea interior membrana deſtruat. Cauum deinde plumbi fruſtulo rite conformato implendum.

lendum est, ne a cibo, potu, aut aëre malum iterum exacerbetur, et recrudescat. Quod si haec *Dentis euul-*
 uoque non profuerint, aut adhiberi nequiverint, *sio.*
 dens erit extrahendus, ut non solum dolor cum
 pso euellatur, verum etiam ut a contagione reli-
 qui, in quos facile proserpere solet, liberi seruen-
 tur. Sed vitanda est dentis euulsio, si inflammatio
 magna, aut tumor non exiguus dentem circumcin-
 gat. Euelli etiam dentem expedit, ubi fistula prope
 lentem est, aut ab ejus carie genita spectatur. Nisi
 eo euulso, ipsa coire, aut impleri nequit. At ca-
 ninorum extractio periculosior est ob profundiores
 radices, quibus adhaerent; nec minorem difficulta-
 tem exhibent postremi, ac medii molares ternis,
 vel quaternis radicibus praediti. Nam ab eorum,
 qui superiores sunt, extractione laedi oculi possunt;
 ab utrisque vero tum superioribus, tum inferioribus
 haemorrhagia, inflammatio, maxillae laceratio, et
 fractio non raro contingunt. Haemorrhagia in-
 terdum tanta est, ut consuetis stypticis medica-
 mentis comprimi nequeat. Spongia sicca dentis
 alueolo imposita, et manu valide pressa haemorrha-
 giam quinque jam dies durantem a medico cohibi-
 tam legimus a). Similem haemorrhagiam ex hac
 ipsa causa ortam, et jam ad viginti et ultra horas
 protractam sistere mihi quoque contigit pulvere
 fungi agarici igniarum alueolo auulsi dentis prius re-
 pleto, deinde ejusdem frustulis planis desuper gra-
 datim impositis, ut dentibus alterius maxillae et
 premi, et loco contineri possent.

a) *Comm. Lipsf. vol. 4. p. 91.*

§. CCCLV.

Cum odontalgiam dens aliquis erumpere nitens *Dentitioni*
 gignere cognoscatur, gingiua oleosis, pinguibus, *quomodo*
 mucilagineis primum mollienda, deinde, si necessi- *prospicien-*
dum.

tas vrgeat, incidenda scalpello est, vt exitus dentis comparetur. Abscessuum, fistularum, parulidum, epulidumque curatio chirurgis committatur. *Dentium reliquis visis.* vero dentes vacillent, gingivaeque depereant, et quasi absumantur, in causam inquirere oportet. Si tartarea crusta inter gingiuam, et dentem accreuerit, ejusque carnem procul secedere cogat, subaculis ea dissoluenda est, aut ferramento in scalpelli modum aptato auferenda. Si ligamenta, et gingivae laxatae in causa sint, vt dentes labent, et vacillant, adstringentibus, et roborantibus firmantur. Vbi vero erodens, acris, aut acida lymph a id praestat, antiscorbutica, antacida, imo et balsamica tam intrinsecus, quam extrinsecus in subsidium vocentur.

C A P V T XV.

DE TVMORE GLANDVLARVM PAROTIDVM, ET MAXILLARVM, VVLGO ORECCHIONI *).

§. CCCLVI.

Differentias. Parotidum tumores recte diuiduntur in tria genera. *Primum* genus est eorum, qui febris acutis, et praesertim malignis, aut pestilentibus superueniunt. De his jam alibi (*Vol. I. De Febr. §. CCCII.*) a nobis actum est. *Alterum* eos comprehendit, qui morbos chronicos, scrophulas, leuceneream, scorbutum, scirrhom, cancrumque diathesin subsequuntur. Hi ad alios morbos, quorum curatio alibi tradenda est, aut ad morbos tantummodo chirurgicos spectant; de quibus nequam nostrum est verba facere. *Tertium* vero genus est, quando parotides, et maxillares glandulae repente intumescunt, et dolent, nec diu, nec gravibus,

us, aut saltem non periculosis symptomatibus, esse curentur, stipantur, breuique, et perfecte auuantur. Pueros, atque adolescentes dumta-
hoc genere corripiti solitos non nulli tradunt. quamquam illos huic malo magis obnoxios fa-
mur, experientia tamen compertum est, nullam andoque aetatem, sexumque nullum immunem eo esse, in primis cum epidemicum est: nam interdum epidemici, aut stationarii more vagatur. in imo velut endemicum quibusdam in regionibus esse a) dicitur. Tumores huiusmodi, quia vix quam suppurationem subeunt, sed facili resolutione euanescent, *lymphatici*, et *serosi* a plerisque putantur; quamquam interdum inflammatoriam molem indubiis notis exhibeant. Peculiari nomine videntur apud medicos, a quibus saepe eorum descriptio, et curatio praetermittitur. Idcirco nonnulli eos redigunt ad anginas nothas, aquosas, aut bronchocelen b). In Etruria, et reliqua Italia ligo vocantur *orecchioni*, *gotoni*, et *gotazze*.

*) *Synonyma.*

ORECCHIONI *Etruscis*; GOTONI *Bononiensibus*, et *Flaviae populis*; GOTAZZE *Genuensibus*; ONEILLONS, et *Uiles Gallis*. Parotis spuria LIEVTAVDII, *Synops. vni-*
Prax. med. l. 2. sect. 2. p. 300. ed. Patav. 1777. Paro-
benigna, et simplex fortasse SAVVAGESII, Nosol. cl. I.
3. gen. XVII. Parotides seroso glutine tumentes THOM.
SHII, De Bon. scient. et art. Instit. atque Acad. T. V.
Inter Opuscul. p. 117. Narbonensium morbus familia-
rimus, cujus leuior gradus GALES, grauior COVRNVDOS
atur. LIEVTAVD. l. c.

Journal de Médec. T. VII. p. 379., vbi ROCHARDVS epidemicum huiusmodi morbum in *Belle-Isle-en-Mer* esse constat, atque egregie describit. b) LIEVTAVD l. c. REGIONI TOZZETTI *Prim. Raccolt. d'osserv. med. p. 176. GEL De cogn. et curand. etc. §. 192.*

§. CCCLVII.

Merbi bispo-
ria.

De his igitur nunc referam quidquid aut aliorum
observationes, aut meae me docuerunt. Plaque
hic morbus hieme, saepius vere se exserit, et
vlla alia corporis labes praecesserit. Pueris, et
venibus magis, quam adultis infensus est; inter
nec senibus parcat, quod jam supra animaduertimus
est. Subitas ut plurimum caloris in frigus muta
tiones, et niuolas, humidafque aeris constitutiones
subsequitur. Saepe post aliquam vehementer
corporis exercitationem, aut frigus susceptum
ritur; grauiusque afficit feruido, et biliofo tem
peramento homines. Parotides igitur intumescunt
primum leuiter, mox grauius, et durae fiunt, et
lore quodam tensiuo molestae. Colorem cutis
mutant, imo interdum leue integumentorum oede
ma exhibent; quo factum est, ut Cl. LOVISIVS
naretur, cellularem telam magis, quam glandulae
corpus affici a). Quandoque tamen nihil oedema
tosi integumenta prae se ferunt, sed tumor durus
et sensus acriter dolet, et rubore quodam quod
sipelatode suffunditur. Praeter parotides similes
more vna attolluntur glandulae maxillares, et
non nullis etiam illae, quae in collo sitae sunt; et
aliis tonsillae ipsae occupantur, ita ut non
manducatio, sed etiam deglutitio ipsa reddatur
facilis. Tumor autem magnitudine varius est;
do planior, modo eminentior, et quandoque
tus, ut totam faciem, effigiemque deformet.

a) *Encycloped. v. Oreillons.*

§. CCCLVIII.

Vbi mitior morbus est, febrem nec mouet, aegros lecto addicit. Tunc plerumque soluitur, turae ope intra paucos dies paullatim decreuit, finitur. Quies tamen in lecto, potus calidus,

niter diaphoreticus, fomenta humida, et mollientia, et lintea duplicata sicca, et calentia, aut demum inunctiones ex oleosis applicitae blande, et innoxie solutionem accelerant. Raro ultra septem dies protrahitur. Si vero grauius affligit, vel cum febre incipit, vel febris ad eum accedit, nunc parua, mi-

, et breuis, nunc magna, et vehemens, quas indum ad aliquot dies persistit, plerumque contra remittens, et vespere suas accessiones renouans. praecipue incidit, quando malum epidemice grassatur. Interdum vis epidemica tam late diffunditur, vt ne conualescentes quidem ex aliis morbis aetereat. In constitutione epidemica anni 1753., iam Bononiae vidit, atque accuratissime descripsit THOMAS LAGHIVS a), febris in grauiori malo non destitit, nisi post nonam, aut vndecimam, aut circiter quartam diem. Tunc sane sanguinem iterum, etiam iterato, oportet; quemadmodum saepe expertus sum, et ipsemet LAGHIVS testatur. plurimum tamen, vbi febris minus vrget, sanguinis missione omissa, sufficiunt blanda eccoprothidiluentia antiphlogistica, victus tenuis, et fomenta mollientia. Interdum nec fomenta ipsa bene videntur. Tutissima omnium, et toleratu facilia sunt cataplasmata ex pane, lacte, et malua contrita, aut ex simplici pulpa pomorum dulcium. Tandem vero sunt topica remedia, quae resoluentia proprie dicuntur; nam aut dolorem, et tumorem sperant, aut metastases non innocuas gignunt.

b) L. c.

§. CCCLIX.

Detumescitibus parotidibus, praesertim maturis, nempe primis iam diebus, saepe euenit, vt tumor, qui parotides, aliasque proximas glandulas premebat, mira sane metastasi, etiam sponte, ad scrotum feratur. Quo casu non modo scrotum tumet, dolet,

*Metastasis
ad testes.*

dolet, ac rubet; verum etiam alteruter testis, quodque vterque, phlegmone vera corripitur, tunc intensiore, vehementioreque reddita. Metastasi ejusmodi a parotidibus ad testiculos in camicis a) clare exposuit jam HIPPOCRATES, eandemque vere anni 1750. observauit IOANNES TARGHIVS TOZZETTIVS b), et post hunc anno 1753. Cl. LAGHVS. Nec me circa illud idem tempus Fauentiae medicinam facientem, vbi epidemice erat morbus, rarum hoc metastaseos genus fugit. Hoc ipsum phaenomenon viderunt in quibus non praetereundus est ROCHARDVS c), et mo Gallus, et nuperrime, anno videlicet 1754. Genuae, vbi morbus iste epidemice increbuerat, JOSEPH PRATOLONGUS, vir tum doctrinae laudatissimus, tum medendi vsu praestantissimus; quemadmodum ex ejus epistola sub finem mensis Maii anni ejusdem ad me data intellexi. Scroti igitur, testiculorumque tumore superueniente, et febre inde vehementiore facta, continuo iteranda est sanguinis missio, primum instituenda in iis, in quibus antea non fuerat; fofusque emollientes adhibendi, vt non modo dolor, et inflammatio leniatur, sed tumor paulatim, et blande subsideat. Solent enim tam parotidum, quam scroti ejusmodi tumores resolutione finiri, nunquam, quod sciam, suppuratione, quidem apta iis fiat medicina. Ex quo patet, bilem, et solubilem esse eorum materiem, LAAG vero observatio est, pueros impuberes, et huic metastasi non fuisse obnoxios d); mulieres vero, quamquam hae rarius in parotidum tumores inciderent, eo itidem detumefcente doloribusque, et pubis correptas esse, ac si iis metum imminerent; quae vtique aut intempestive curantur, aut eorum loco pruritus, et caloris sensus pudendum praeter consuetudinem inuadebat.

a) *I. epid. stat. 3.* b) *L. c.* c) *Journal de méd. VII. jam cit.* d) *L. c.*

*) In ephemeridibus medicis, quas nouissime, hoc ipso mirum anno 1785. italico sermone scriptas edidit Cl. OTONIVS, bis, vel ter ejusmodi malum memoratur, in eo metastasis ad testiculos in viris contingebat, in foeminis vero ad inguina.

§. CCCLX.

Notatu item dignum est, complures, tam viros, quam foeminas, progrediente morbo, imo etiam in inclinante, aut inclinato, non raro crebris vomitibus vexari, et aliquot dies male ex his habere; quod potissimum a LAGHIO obseruatum legimus a), et a nobis etiam nuper confirmatum est. Quibus vomitus hujusmodi superuenit, etsi lingua pulchra sit, neque os amarescat, neque appetitus deficiat, nihilque humoris deprauati, aut alieni, sed solus motus, aut cibus ventriculo resistans ejiciatur, omnes tamen ab anxietate, et inquiete, quam post motum, aut cibum patiuntur, plerumque liberantur, et conquiescunt; quae res suspicionem injicit, id spasticos potius ventriculi motus, quam ad cacochyliam vomitionem istam referendam esse. Reuerentia sola paregorica, et sedantia stomachica, externa, et interna, et blandissimi clysteres paullatim eam dirigunt; rarissime eccoproticis opus est. Vomitus autem iis superuenisse, quibus nulla ad testiculos metastasis contigit, narrat LAGHIUS b); atque hoc conjicit, a metastasi eum pendere. Quod etsi aliquando esse, non inficiet; adduci tamen non possum ad credendum, semper metastasin ad ventriculum causam ejus esse; quod interdum eum excessisse viderim, tumore parotidum non modo exante, sed etiam augmentum fumente. Alios, decedente parotidum tumore, dolor capitis inuadit, micraniae periodicae non ablimilis, isque certo euane-

*Vomitioes
inclinante
morbo.*

*Metastases
aliae.*

evanescit, succedente scroti, aut testium tumore. Quibus vero neutrum horum accidit, saepe uerso ad pectus prauo humore tussis oboritur. Quaecunque demum partem morbi vis febris illico increscit siti, vigiliis, anxietate, corporis assidua iactatione comitata d).

a) L. c. b) Ibid. c) Id. ib. d) Id. ib.

§. CCCLXI.

Praeter hasce metastasium species propria-
laris est ea, quam laudatus PRATO LONGI-
vit a). Is enim tumoribus parotidum in aliquo
Anasarca, superuenisse scribit *anasarcam* omnino similem,
aut leuco- quae non nunquam superuenit purpurae scarlatinae
phlegmatia. summa cum spirandi difficultate, et acuta febre.
An erupti- Hinc ipse suspicatur, parotidum istum tumorem
us morbus. febribus eruptivis, siue morbis exanthematicis febri-
libus adnumerari posse. Haec enim uero suspicio
magnam probabilitatis speciem habere videtur, si
animum aduertamus ad morbos antecedentes, aut
vna decurrentes, qui plerumque exanthematici, et
eruptiui *) sunt; itemque ad nauseas, ad vomitus
ad suspiria, ad anxietatem, ad languorem, ad
ad faciles lipothymias, ad vigilias, ad iactationes
aliaque id genus symptomata, quae huic morbo
quando vehementior, grauiorque est, adiunguntur
et eruptiuorum morborum communia sunt. Se-
cutioni robur, et pondus addit quorundam opi-
vulgiue communis persuasio, contagione non
proserpere, et communicari. In quam sententiam
pronus quodammodo fuit LAGHIUS ipse, vir
perspicacissimus, et simul cautissimus, qui
causas ejus indagat, non longe abest, ut
epidemicam illam constitutionem, cujus abso-
lutissimam historiam conscripsit, ex Africa, ubi
lens morbus grassatus erat, ventorum flatu ad
perlatum

latam fuisse. Vtut res se habeat, optandum
m maxime est, vt excellentium medicorum stu-
occasione data, in veram huiusce morbi natu-
incumbant, obseruationibusque iteratis decer-
it, vtrum ad eruptiuos, vt vocant, et contagio-
ipse pertineat, nec ne.

) *Epist. cit.* En ejus ipsissima verba: *L'unica mala-
che possa dirsi presentemente epidemica in questa città, è
la, che va sotto nome di Gortazze, e dai Fiorentini dicefi
ale degli Orecchioni. In qualcheduno plure le parotidi si
gonfiate enormemente le parti genitali con febbre consti-
bile, e in qualche altro ho veduto al gonfiore delle paro-
sopravvenire un' anasarca in tutto simile a quella, che
che volta sopravviene alla Scarlatina, con grandissima
coltà di respiro, e con febbre acuta — — Crede VS.
ma, che questa malattia possa annoverarsi tra le febbri
rive?*

) Anno 1753. Bononiae epidemicam parotidum con-
tionem antecesserunt Peticularis morbus, et Variolae,
us interdum tumor parotidum se se adungebat. Peti-
s, et Variolis desinentibus, tumores Parotidum soli
perunt populariter vagari. In ea constitutione, quam
o 1782. non modo in quibusdam pagis, verum etiam
Mediolani habuimus, morbilli primum sporadici, de-
epidemicis insurrexere. Eodem tempore hi paroti-
tumores Genuae, vt jam dictum est, et Taurini in-
erant. Nescio tamen, an ibidem morbi eruptiui con-
erint.

§. CCCLXII.

In epidemica horum tumorum constitutione, *Constitutio
epidemica
an. 1782.*
m dixi anno superiore 1782. nobis cum Genuen-
s, et Taurinensibus fuisse communem, meta-
is ad testiculos, quemadmodum alibi, conspecta
est; sed ejus loco frequentissime vomitus mo-
is cum sensu ponderis ad epigastrium pleros-
, tumoribus jam, et febre discussis, exercuit.
e obseruatio omnino comprobare videtur LA-
i sententiam, in his ex metastasi vomitum, vt
suis aegrotis Bononiae viderat, natum (§.
CCCLX.)

CCCLX.) fuisse. Distinguendum igitur puto vomitum, qui initio morbi, aut ejus augmento ^{interdum} ab eo, qui jam absoluto morbo superuenit. ^{Interdum} quidem a neruorum ataxia. atque irritatione. ^{Interdum} his in morbis exanthematicis esse consuevit, ^{Interdum} re, probabile videtur; hunc vero a metastasi. ^{Interdum} quippe posteriore affectos non paucos blanda, atque iterata catharsis restituit, illos contra magis magis ^{Interdum} que turbauit. Apud nos mense Martio post ^{Interdum} gniam niuium copiam, frigusque repentinum morbus caput extulit. Parotides, et maxillae glandulae enormiter tuebant, tendebantur, ^{Interdum} duritie manui renitentes. Non admodum ^{Interdum} nec vehementer dolebant. Color cutis vix mutabatur; et si quis rubor extrinsecus apparebat, ^{Interdum} leuissimus profecto erat. Sed febris continua, ^{Interdum} aequalis, plerumque vehemens cum iis complicatur, exceptis paucis quibusdam, qui leuius afflicti sunt. Grauius afflictis non deerant virium languor, et dejectio, nausea, vomituritio, crebra ^{Interdum} ^{Interdum} facilis in lipothymiam lapsus, in primis ^{Interdum} ^{Interdum} Inter initia non mittebantur blanda ^{Interdum} clysteres, potus diluentes, et diapnoici, et sanguinis missio: qui tamen nullo glutine pleuritico ^{Interdum} ^{Interdum} gebatur, in hisce morbis, vt ex aliorum quoque ^{Interdum} seruatis constat, deficere solito. Sua studia morbus perficit, vt plurimum, octo, vel nouem diebus soluique consuevit aut alui fluxu, aut sudore, aut vrinarum copia, aut narium haemorrhagiis, et adolescentibus in quarta, aut septima sanguis e naribus prorumpens plerumque ^{Interdum} ^{Interdum} crisin, qua illico sanabantur, apud Bononienses ^{Interdum} ^{Interdum} stitisse a) visus est. Neminem ex hoc morbo graui, vnquam periisse constat b). Nolim quis plus aequo sibi confidat, et temere asper-

jus benignitatem; cum fieri aliquando possit lethalis ad pulmones, aut cerebrum metastasis *).

a) LAGHIVS l. c. b) Id. ib.

*) Tempore eodem, quo Mediolani morbus iste increvit, Magentae etiam epidemicus existit. Rem non inutilem me facturum puto, si descriptionem, qualem ad me misit rogatus illius loci Medicus FRANCISCUS BERRETTA die sextae mensis Iunii ann. 1783., hic e vernaculo in latinum sermonem versam addidero. Certissimum est, ut ibi narratur, anno superiore sub veris initium non modo hic, verum etiam in quibusdam pagis adiacentibus epidemiam quandam constitutionem tumorum parotides occupantium dominatam esse. Morbum vulgus noster appellat LA GVALTERA; de quo ut plurimum vix, ac ne vix quidem consulitur Medicus. Dicam tamen quidquid et potui egomet ipse observare, et colligere maxima cura eos percontatus, qui illo correpti fuere. Symptomata igitur, quae praecedere, et comitari vidi, tumorem istum parotidum, fuisse prope semper dolores articulorum, atque insignis omnium membrorum assuetudo. Nullum unquam symptoma mihi occurrit, quod febrium exanthematicarum esset proprium. Excipio tamen nuperum duodecim annos natum, qui, antequam parotides ei umerent, tres ferme dies vexatus fuit crebro vomitu bilioso, anxietate, inquietudine, et simul febre non exigua, quae post etiam parotidum apparitionem aliquot dies aegrum tenuit. Haec vero modo tumores ejusmodi antecedeant, modo subsequerentur, modo cum eisdem omnino ingruerent, et conjungerentur. Perpetuo tamen inchoabat cum alterno frigoris carisque sensu. Interdum intumuerunt parotides, quin illarum aquam moras febrilis accederet. Tumores tunc diutius, et trutinacius persistere semper, ad mensem unum, vel sesquimensum, ultraque non nunquam producti. Quando febris irripuit, haec nunquam minus triduo, nunquam plus octiduo perduravit; nec semper tumores ex toto evanescerent, aliquamdiu trahebantur adhuc, ea penitus discussa. Quamvis tumore simul, et febre correpti fuerant, ut plurimum quiescentiam sunt faucium dolorem, difficilem deglutationem, et artriticos cruciatus in uniuerso corpore. Per paucos illos, qui eam opem pertulerunt, curavi sanguinis missione, quando hanc corporis robur, et febris magnitudo postulabant, salibus catharticis, et copioso potu distusi florum sambuci, cui adjectum est nitrum; eoque tutius diaphoretica promouenda, quod viderem

derem sudoribus largis usque plurimum febrem solui. Tum-
bus extrinsecus admovebam cataplasma emolliens ex lacte,
ribus sambuci, et farina seminum lini confectum; quae
portune continuato fere semper feliciter resolvebantur. Quae
si pertinacius obfisterent, tunc in usum vocabatur linimentum
resolvens, quod sperma ceti, et camphoram recipiebat, a
omnino, et facile cedebant. Nunquam enim suppuratum
aut alio modo eos finire vidi, neque ulla metastasi. etc.

§. CCCLXIII.

Historia I.

Specimen huiusce constitutionis (§. CCCLXIII)
aliquod dabunt binae historiae, altera grauiora,
altera mitiorem morbi speciem sistens. Adolescens
tres, et viginti annos natus, temperamento sangui-
neo-melancholico praeditus, frigori, ventis, aciri-
que nocturno singulis diebus se se incautius obijci-
re solitus in hunc morbum incidit. Prima die sine
febris manifesta parotides coeperunt tumescere, et
dolere. Secunda earum tumor auctus est, et simul
maxillares glandulae tumidae euaserunt cum exigua
febris, qua coactus fuit lectulum petere. Eadem
die salem catharticum amarum sumisit, quo satis
bene purgatus fuit. Die tertia cum febris incre-
visset cum pulsu valido, et magno, suspiriis crebris,
atque anxietate, et corporis totius iactatione, et
dolor cum aliquo rubore cutis conjungeretur, le-
sta ei est vena in brachio, et missae sanguinis vinctae
decem, qui nihil phlogistici ostendit. Hinc aliquan-
tum febris quidem remisit, non vero tumores, qui
contra incrementum ceperunt usque ad diem quarta-
tam. Interea cibum appetebat, somno fruebatur
et viribus etiam, dum in lecto erat, videbatur. Id
solum querebatur, quod subinde stomachi quidam
languore, et, si e lecto surgeret, facile hypochon-
dria corriperebatur. Die quinta iterum ei datum
fuit lenis catharticum, quod tamen alium non sub-
duxit. Horis pomeridianis febris, sine ullo frigore

ris, aut horroris indicio exacerbata est. Nox fuit implacida. Mane diei *sextae* valida febris exardebat, calorem ingentem in interioribus partibus accusabat, et praeterea suspiriis, nausea, inquiete, siti, dolore capitis pulsante vexabatur. Arteriae vehementer subfiliebant. Facies vniuersa tumebat. Idcirco decem sanguinis vnciae ex altero brachio detractae; in quo nihil vitiosi repertum est. Vesperti quidquid biberat, et comederat, bis vomuit, et post vomitum aliquantum leuatus est, et conualescere coepit. *Septima* die mane febris minor, caput liberum, facies, et parotides minus tumidae: sed crebri vomitus a potu, qui plerumque nihil excernebant, nisi quod biberat, cum pauca interdum bile flaua permixtum. Vespere iidem vomitus. Iteratis enematis oleosis factum est, vt alius laxata excrementa naturalia deijceret. Hinc vomitus paulatim sedati; sic, vt nocte *octauae* diei quies, et somnus tranquillior subsequeretur. Die *nona* omnia in melius versa sunt, aegro ferme apyretico. Die *undecima* tumores omnino euanuerunt. Potui datum est dilutum foliorum thee, aqua cum succo mali medici, serum lactis defaecatum; sed potu quocunque stomachus turbabatur, vomitu insequente. Extrinsecus adhibita fomenta emollientia fuere ad secundam vsque febris accessionem. Tunc ab omnibus topicis, quae parum feliciter cedere videbantur, abstinere satius existimatum est. Resolutio autem leni febris motu, vomitibus spontaneis, alui deiectione per clysteres obtentis, et vrinae copia potius, quam sudore perfecta est. Decem, aut *Historia II.* duodecim diebus post sexagenario cuidam, qui adolescenti huic assidue adstiterat, postquam quadam die praeter consuetudinem in aëre aperto diutius deambulasset, leuiter intumuit parotis sinistra, sed modico dolore. *Secunda* die dolor auctus, et ad

aurem protensus est; quo manducatio impediatur. Nocte insequente dolor molestior somnum fere omnem arcuit. Quare die *tertia*, etsi febris vacuasset, lectulo se continuit. Alium lenienti medicamento sibi solui, et sanguinem, qui admodum firmus, et densus deprehensus est, ex brachio mitti curauit. A sanguinis missione dolor valde immutatus est. Doloris locum linteolo applicito a frigore, et aëris attactu defendebat. Semel tantum quadam nocte, cum dolor molestior est, adiecit cataplasma ex pane, et lacte vna decoctis, quum solum dolor, sed tumor etiam subsedit. Intra sex, aut septem dies fere ex integro conualuit, aliqua solum difficultate mandendi superstitie ad aliquot dies. Ab vna parotide ad aliam non transit, ut fere solet, malum. Absuit vomitus, anxietas, languor, et febris; neque ad tantam magnitudinem tumor, quam in aliis vidimus, peruenit. Fortasse minor causa procatartica minorem quoque morbum fecit.

§. CCCLXIV.

Initio Septembris ann. 1783. iterum iste parotidum morbus reuixit, sed sporadicus; eosque contempnit, qui aëri humido, et frigido, in primis vespertino caput, et collum incaute exposuerunt; sed *Historia III.* plerumque mitis fuit. Iuuenis quidam temperamento sanguineo-pituitoso, habituque pinguior praeditus, cum vespere scriptioni diu operam inuasset fenestra e latere aperta, tempestate humida, et frigida, paullo post dolorem leuem in parotide sinistra percepit. Dolor nocte increuit. Applicuit sacculum cum farina tepente. Mane postero parotis valde prominebat, colore prope naturali, et admodum dura; nec dolor magnus erat. Tensionis tamen sensus quidam molestus ad vicinas partes, caputque protendebatur; nulla febris. Medi-

us consuluit, ut testam parotidem ab aëris injuriis et frigore seruaret, parum loqueretur, a manducatione abstinere, et dilutum florum sambuci facilius hauriret, et aliquot subinde cochlearia iumeret mixturae, quae nitrum, roob baccarum sambuci, et syrupum rubi idaei recipiebat, lectulique calore expirationem excoheret. Vesperi febricitabat, sed leuiter. Sudauit, et nocte tranquille dormiuit. *Altero* mane tumor videbatur latius diffusus. Pulsus frequens. Cetera eadem. Nox deinde tranquilla. *Tertia* die mane parotis non parum retumuerat. Hinc datum lene eccoproticum ex ale mirabili, et syrupo mannato, quo bis aluus laxata est. Vesperi melius. Mane diei *quartae* pulsus naturalis; vrinae saturationes; tensio, et tumor nullo minor. Die *quinta* tumor euauit ex toto. *Sexta* domo exire coepit. Nullus vomitus, nulla ad testes metastasis subsequuta est. Alios vero non nullos tunc temporis lymphatico hoc parotidum tumore laborantes, eo euanescente, vomitus ad aliquot dies afflixit. Sed breui omnes conualuerunt.

§. CCCLXV.

Ex his, quae haecenus dicta sunt, colligi satis ar- *Conclusio.*
bitror, quanam sit hujus morbi ratio, et quanam curandi methodus cuique ejus gradui opportunissima. Dum enim ejus descriptionem, variumque processum tradidimus, non praetermissa sunt peculiarissima remedia, quae pro ratione symptomatum, aut eorum vicissitudinum experientia prodesse demonstrauit. Tumorem glandularum lymphaticarum esse, nemo in dubium reuocare audebit; utrum vero sola crassior, densiorque lymphæ, aut ejus motus retardatus; an quidpiam alienum cum ea complicatum in causa sit; numque frigus susceptum, etque aëris humiditas siue vasa lymphatica, et glandulas

dulas ipsas minus testas corrugando, siue expirationem supprimendo, pro causa occasionali tantummodo, aut pro efficiendi haberi debeat, libera esto cuique pro suo arbitratu judicare. Res enia adhuc obscura, nec satis comperta multo plura postulat observationes, quam eae sunt, quas scriptores nobis in hanc usque diem reliquerunt.

C A P V T XVI.

DE GLOSSITE, SIVE LINGVAE INFLAMMATIONE.

§. CCCLXVI.

Inflammati, atque intumescere per se linguam, vt periculosum, acutum, et primum, id est ab angina, aliisue morbis se junctum, et intra breue tempus, nempe quinque, aut septem dies, suffocantem morbum efficiat, auctor est *VOGELIUS a*). *Glossiten* eam vocat, bisque a se visam, et curam narrat. Sed ante eum de linguae inflammatione, variisque ejus tumoribus meminerunt complures alii, nominatim *SENNERTVS b*), et *RIVERIUS c*), quorum posterior peculiare de ea caput conscripsit. Febris accedit cum frigore, quod protinus calor immodicus excipit: quod commune fere est cum aliis morbis acutis. Sed frigore febrili adhuc praesente, linguam subitus dolor, rubor, calor, ac tumor occupat, quorum singuli magis, magisque increscunt. Loquendi, et deglutendi difficultas moritur, imo paulatim tanta fit, vt vtraque facultas aboleatur. Saliua viscida, et glutinosa sponte profluit; facies rubet; caput dolet; vigiliae fere continuae hominem exercent. Lingua praetumida nequaquam moueri potest, imo ob molem auctam exseritur, hiante ore. Quum nec bibere, nec edere liceat,

peat, aegrum famēs, et fitis fatigat. Spiritus vero
 difficilior sensim redditus suffocationem tandem
 omminatur.

a) *De cognosc. et curand. etc.* §. 180. b) *Med. Pract.*
 c. 1. oper. T. 2. l. 1. P. 3. sect. V. cap. 2. p. 333.
) *Prax. med.* l. V. cap. 1. p. 86.

§. CCCLXVII.

Periculosissima sane est linguae inflammatio; ni *Prognosis, et*
 nim cito resoluatur, aut in abscessum cito ape- *curatio.*
 iendum desinat, eliso spiritu miserrime enecat.
 Ocissime igitur horrendo malo occurrendum est.
 Omnia generosiora artis auxilia; quae inflammatio-
 nes discutunt, in usum vocari oportet, et exem-
 plo sanguinem e vena, praesertim jugulari, aut ra-
 nina abunde mitti, idque pluries pro re nata ite-
 rari; cucurbitulas dorso scarificatas defigi; aluum
 satis valide duci, aut saltem enematibus quater in
 die adhibitis sollicitari; et collum cataplasmatibus
 idoneis circumcingi. Interea, si fieri possit, os
 saepe emolliente, et resolvente decocto, cui lac, et
 mel adjectum sit, colluendum est. De linguae in-
 flammatione primaria satis. De secundaria vero,
 quae aliis morbis superuenit, aut cum angina co-
 pulatur, alibi. Neque hic quidquam refert de aliis
 linguae morbis, uti aucta mole, oedemate, tumore,
 ulceribus, fissuris, cancris, dicere; cum hos omnes
 chirurgi maxime persequantur.

C A P V T XVII.

D E A N G I N A.

§. CCCLXVIII.

Quam Graeci *συνάγχην*, et *κυνάγχην* dixere, La- *Synanchen*
 tini vertunt *anginam*. Illi a laqueo, quo quis *et cynan-*
 Y 4 *chen.* suspen-

suspenditur, nomen deducunt, quasi praefocationem dicerent; hi ab angendo, quasi angorem. Om hac voce utebantur ad faucium fere, et guttum compressionem significandam, ideoque ad spiritum dumtaxat summam difficultatem, ut apud ARETAEVM a), et COELIVM AVRELIANVM b) videtur est; deinde eam ad deglutiendi simul impedimenta denotanda c) transtulerunt.

a) *De causis et signis morbi acuti*, l. I. cap. VII. b) *Acutus morbus*, l. 3. cap. I. c) CORNEL. CELS. l. 4. cap. IV.

§. CCCLXIX.

Acutus morbus est.

Peracutus sane morbus iste ab omnibus perhibetur. At non convenit inter auctores, utrum ab inflammatione semper dependeat. Palam enim COELIVS AVRELIANVS ab angina excludit febrim, dum de ea scribere a) aggreditur. ARETAEVS etiam modo inflammationi, modo aliis eam vitiis b) tribuit. Hinc priscorum auctoritate fretus, et subsequentium etiam scriptorum permotus suffragis non dubito plura, et varia anginae genera constitutere, cum natura, tum sede differentia; eoque confidentius id facio, quod magnus quoque BORRHAAVIUS, quem et consentientem, et quasi duces c) sequi gloriosum est, ab hac sententia non abhorruit. Itaque primum, quid angina nobis sit, aperiamus. Anginam dicimus eam faucium, laryngis, pharyngis, adnexarumque partium affectionem, quae respirandi, vel deglutiendi potentiam, vel utramque simul actionem insigniter laedit et impedimentum aliquod in faucibus ipsis locatum. Quo facile sejungitur a ceteris spirandi, aut deglutiendi difficultatibus, quae sedem ibi non habet, sed a pectoris, aut oesophagi vitiis proximam originem ducunt; cum in his nullus ad fauces singulationis, aut doloris sensus percipiatur.

a) L. c.

) L. c. b) L. c. c) *Aphor. de cogn. et curat. morb.*
83. et seqq.

§. CCCLXX.

Hinc ad differentias progredimur. Cum igitur *Differentias.*
causio ista (§. CCCLXIX.) ex diuersis illarum par-
m, et proximarum vitiis oriatur, inflammatione *Ex causis.*
nirum, infarctu catarrhali, oedemate, tumore,
cessu, scirrho, spasmo, paralyfi, vlcere phagedae-
o, aphthis, gangraena, alienisque corporibus in-
s, aut impactis; idcirco variae anginae consti-
possunt, inflammatoria scilicet, catarrhalis, oe-
natodes, apostematodes, maligna gangraenosa,
erosa, aphthosa, conuulsiva, paralytica, scirrho-
, fortuita, et sic porro. Sed loci etiam affecti *Differentiae*
ersitas differentias aliquas facit. Hinc diuiditur *ex loco.*
externam, et *internam*; illam ex nuperioribus
dam speciatim vocant *parasynanchen*, quando
elicit exteriores pharyngis partes occupat; si
o laryngis, *paracynanchen*. Internam vero, pro-
pharyngem, vel laryngem interiorem afficit, *syn-*
chen, vel *cynanchen* appellandam esse docent.
amquam scire licet, veteres hisce nominibus in
m prorsus vfos esse significationem: *cynanchen*
n, siue anginam caninam vocabant eam, in qua
ces, lingua, et facies intumescabant; contra
nchen, quae sine vilo exteriori malo strangula-
Hinc illa *manifesta*, haec *occulta*, et latens
d eos habebatur. Deinde *parasynanches* nomi-
leuiorem, siue *spuriam anginam* designare con-
uerant.

§. CCCLXXI.

His ad veterum, et recentiorum mentem prae-
nit, causas remotas, quae generatim anginae
ationem porrigunt, breuiter recensere par est.
es sunt in primis sudoris, expirationis insensi-
bilis,

*Causas re-
motas.*

bilis, et cuiuscumque excretionis consuetae compressio; aëris, et loci ex calido in frigidum subitae mutationes; corporis exercitatio vehemens; irritatio vento in faciem ex aduerso spirante; motus vocis contentio; vociferatio; declamatio; tumorum inflatio, praesertim in aëre gelido; tussis vehemens, aut creber vomitus; mercurii usus; vapor calcis e recens dealbatis parietibus emanans; acria venena, aut medicamenta ingesta, aut inspirata; metastasis in morbis acutis, malignis, aut anthematicis; peculiaris aëris constitutio; epidemicum; erysipelas, aut podagra, aut arthritis retro pulsa, aut sponte retrocedens; scorbutica, venerea, strumosa, cacochymica, hysterica, hypochondriaca mala; nervosae affectiones; quicumque tumor intrinsecus, aut extrinsecus faucibus adnatus, vti scrophulae, excrementariae, sarcomata, polypi, membranae, bronchocele, parotides, aliaeque tuberculorum genera; spinae, officula, aliaeque acuta, et non acuta corpuscula in fauces delapsa, infixata, haerentia, aut in laryngem ingressa, intrusa, detrusa, aut in pharynge, aut gulae principio resistentia, et mole sua iter obstruuntia, quacunque prementia, irritantia; epiglottidis induratio, exulceratio, consumptio; ossis hyoidis, aut vertebrae colli in junioribus luxatio. Ex his enim omne fere anginae genus nasci consuevit. Quae causarum vero, loci affecti, morbi graduum, et symptomatum varietate varia etiam anginae ratio itemque periculi, exitii; aut salutis significatio medendique methodus est; quod luculentius patecet ex peculiari singularum specierum descriptione, ad quam mox progredimur.

GINA INFLAMMATORIA, SIVE ANGINA VERA, ET LEGITIMA.

§. CCCLXXII.

Ea respirandi, aut deglutiendi difficultas cum *Definitio.*
ore, calore, et tumore conjuncta, quam efficit
xium, et proximarum partium inflammatio, an-
inflammatoria, aliis *angina vera*, et *legitima*
cupatur. In hac modo velum palatinum, colu-
la, tonsillae, muscoli ossis hyoidis, et maxillae,
linguae radix; modo pharynx, et superior oeso-
gi pars; modo larynx, atque asperae arteriae
ium inflammatur. Quandoque etiam plures
um partium simul, eodemque tempore laborant.

§. CCCLXXIII.

Quando velum pendulum, columella, tonsillae, *Angina*
linguae basis, musculi, glandulae, membranaeque *faucium.*
um partium inflammatione tentantur, et malum *Symptoma-*
confinia narium, et tubae Eustachianae extendi-*ra.*
non solum febris continua vehemens cum fa-
rubore se exserit, verum etiam si ore aperto, et
ressa lingua fauces inspiciantur, tumor, et rubor
guineus ubique, quo oculis peruenire licet, se-
dit, extrinsecus etiam sub maxillis conspicuus;
or ingens ibidem percipitur; difficillime, et ma-
cruciatu deglutitio fit; spiritus quoque aegre
nitur, et quodammodo impeditur; fauces vel
cunt, vel viscida, tenacique pituita opplentur,
ix diduci potest; qua maxilla inferior ossi tem-
am inseritur, saepe dolet, ac tumet, dolorque
urimum cum molesto tinnitu acutus ad aures
rnas producit. Postremum hoc symptoma
ue venerea infectis, BOERHAAVIO in primis
a), occurrit, et frequens est.

L. s. §. 805.

§. CCCLXXIV.

§. COCLXXIV.

*Angina
pharyngea.**Symptoma-
ta.*

Si pharynx, et oesophagi, siue gulae superior pars inflammatione corripitur, id mali in faucibus illico apparet; respiratio non impeditur; voratio vero vix est possibilis, doloremque acutum excitat non modo ob tumentes partes, ad quas appellant ingesta, atque ob earumdem actionem exercendam, verum etiam ob distractionem, quam pharynx patitur, dum in deglutitionis nisu sursum, et extrorsum per musculos linguae styloglossos, et genioglossos, et ossis hyoidis geniohyoideos, et mylohyoideos, atque laryngis hyothyroideos, et cricothyroideos eleuantur, et trahuntur larynx, et hyoides, linguaeque basis: quae actio dum excutitur, vis quoque aliqua pharyngi infertur. Hinc deuoranda ex dolore, ac tumore illarum partium repelluntur ad interna narium foramina, illincque foras redeunt, aut contra in glottidem deflecta, impulsae, aut illapsae tussim vehementem exsuscitant. Quare tunc et cibi, et potus abstinentia exacerbat fauces, et corpus; humores deprauat; et totam ipsam acuit, intenditque.

§. CCCLXXV.

*Angina la-
ryngea.*

At vbi laryngem ipsum ejusmodi malum preterdit, et praesertim glottidem, interioresque ad sedes ad tracheam vsque, vox fit acutissima, et dura; tussis accedit sicca, et fere suffocans; summus non ex deglutitione, quae libera tum solet, sed ex motu laryngis, qui in ipsa deglutitione eleuari debet, percipitur in deglutiendo; et etiam acerbior, cum loqui, aut vociferari aegro fuerit, musculis laryngis, et glottidis, inflammatione laborant, tum multifariam agentur; respiratio parua, rara, stertorosa, praefocatur; eamque nullis plerumque exterioribus,

spicuis mali indiciis, sed prominentibus, horriue oculis subsequitur, eliso spiritu, citissima s.

§. CCCLXXVI.

Verum si inflammatio asperam arteriam, siue *Angina trachealis cum suis symptomatibus.* tracheam potius, quam laryngem obsideat, tunc que nihil in faucibus vitii conspicitur, nec quid-
m exteriora versus prorumpit, quia tumor, dolor, calor, rubor interiore ejus cauo occultantur. tactu compressa tracheae fistula acerbius dolet, potissimum mali sedes detegitur; febris acuma exardescit; inspiratione intenditur doloris bitas; tussis permolesta plerumque, voxque ingosa, et rauca est; respiratio parua, frequens, imis, et nisu magno, ac sibilo perficitur. Hinc guinis intra pulmones cita, et lethalis congestio, et accumulatio; ejusdem a capite, et cerebro itus tardus, aut praepeditus; faciei tumor, liuor,orque; pulsuum mira imbecillitas, et vacillatio; ietas summa, suffocatio, et mors celerrima; non sen adeo propera, vt in laryngis, glottidis, atque glottidis inflammatione, quia glottidis hiatus per se angustior sit, citius etiam occluditur.

§. CCCLXXVII.

Quo autem plures partes (§. CCCLXXIII. ad *Angina composita.* CCCLXXVI.) inflammationem subeunt, eo gra-
ua, et lethaliora symptomata consequuntur; sic, *Symptomata.* vniuersa facies, labia, oculi tumeant, rubeant, qua ex ore protuberet, sensus omnes hebetent, atque aegrotans inter stertorem; delirium, uulsionem, animique deliquia miserrime, et rime suffocetur. Pro locorum vero diuer-
se peculiare nomen accipit angina, vt patet. *Sedes peculiare nomen impertit.*
c tonsillaris, pharyngea, oesophagea, laryngea, healis, et ex his composita profluunt.

§. CCCLXXVIII.

§. CCCLXXVIII.

Prognosis. Anginae inflammatoriae magis subjacentibus aetate florentes, sanguineo temperamento bituque pleniore praediti, victui lauto, et cibicienti, aut vinosis liquoribus maxime dediti, excitiores, laboribusque indurati, mares ideo frequentius, quam foeminae, et praesertim pilesuvos, aut rufos habentes, et potissimum ii, qui semel eadem laborauerint. Haec ipsa, nisi perisuffocet, quod quarto plerumque die, interdum etiam multo breviori spatio accidit, terminatur. ceterae inflammationes, resolutione, videlicet copiosum salivae viscidae excreatum, sudorem, et nam multam, et coctam, vel abscessu, vel gangaena, vel scirrhus a). Quae (§. CCCLXXIII.) defecta est, fauciumque superiora afficit, periculum quidem non leve intentat, at multo gravius, cum omnia illa mala post isthmum palati profundius locantur (§. CCCLXXIV.), et, nisi depresso valde lingua, diductoque admodum ore, quia interni sunt, oculis cerni possunt.

a) Vol. I. *Comment. de inflammat.* §. LXII.

§. CCCLXXIX.

Signa exitiosa.

Perniciem, exitiumque extremum expectant, ubi collum, siue cervix, faucesque nullum morem, aut ruborem ostendunt, dum interimimus doloris cruciatus, respiratio strangulata proxima, vox stridula, et acuta, stertor, et ardentissima, aliaque (§§. CCCLXXV. CCCLXXVII.) commemorata hominem intercas horas e medio tollere comminantur. Coacarum praenotionum eodem die, ad funertio has anginas enecare scribit, sic inquit *Anginae, quae neque in ceruice, neque in faucibus quam conspicuum edunt, suffocationem vehementem*

randi difficultatem inferunt, atque eodem die, aut
tio, occidunt a). Id ipsum alibi confirmat HIPPO-
ATES, eodem die, et secundo, et tertio, et quarto
dem strangulare, affirmans. En ejus ipsissima
ba: Anginae horrendissimae sunt, et citissime occi-
it, quae neque in faucibus quidquam conspicuum fa-
nt, neque in ceruice: verum plurimum dolorem ex-
ent, et erecta ceruice spirationem inducunt. Hae
n eodem die suffocant, secundo item, ac tertio, et
rto b).

) Lib. V. n. I. ex IACOTII recensione, et editione. b)
enoz. N. 132. LIND. edit. Lugd. Batav. 1665.; aut
enoz. N. 23. edit. MARINELLIAN. quae commodior est
asse, quia in omnium fere manibus, facileque apud
reperitur. N. B. Ceterum quando solos numeros bre-
tis causa indico, apponoque, ut plurimum *Lindeniana*
tione, quam citavi, me vi, scito.

§. CCCLXXX.

Tumores, et rubores sine bonis signis evanesce- *Metastases*
neque ad exteriora conuerti, neque pus facile, *males quan-*
sine dolore excerni, aut neque ista diebus judica- *do immino-*
iis contingere; item dolores citra evidentem *ant et qua-*
illam cessare, aut ad caput transferri, febre non *les?*
licata, nec mitescere, perniciosum plane est a).
niciosum quoque, si citra judicationem praecor-
rum dolor cum impotentia, et torpore obuemat;
n latenter enecat aegrum alioquin moderate ha-
tem b). Metuenda etiam est anginae ad pul-
nam conuersio, quod septem diebus occidit: si
o hos quis effugerit, suppuratus fit c), nisi pi-
osa sursum educantur d). Ceterum angina labo- *Sputa qua-*
tes, nisi celeriter cocta exspuant, perniciosi habent e). *lia lenent;*
ita autem neque viscida, neque crassa, neque exal- *et contra.*
ta, neque magna vi educta esse debent; alias ma-
denunciant f).

a) Coac.

a) Coac. N. 365. 370. 372. Praenos. N. 135.
 Coac. N. 374. c) HIPPOCRAT. aphor. X. sect. 7. d)
 Coac. N. 367. e) Coac. 377. f) Ibid.

§. CCCLXXXI.

*Prognostica
 hippocratica
 longo usu fir-
 mata.*

*Metastases
 etiam ad
 alias partes
 non tunc.*

*Excrementa
 e forti
 strangulatu
 prodeuntia,
 vires reso-
 lutas indi-
 cant.
 Doloris ces-
 satio ex
 gangraena.
 Angina
 symptomati-
 ca plerumque
 letalis.*

Ex Hippocraticis oraculis modo (§. CCCLXXX) ostensum est, metastases anginarum ad caput, ad pulmonem, ad hypochondria plerumque perniciosam afferre. Veritatem eorum confirmant observata medica omnium temporum, sed digna praecipue lectu etiam sunt, quae ad eorum confirmationem ex propria experientia adducit Cl. BOERHAUVE commentator SWIETENIUS a). Non solum vero perniciosae habendae sunt hae metastases, verum etiam omnes illae, quae ad alia loca fiunt, nisi fuerint per diadochen ad exteriora. Sic Coctarius auctor, in angina, inquit, qui abs re, (sive, ut ei vertunt, sine signis) prorepunt ad crura dolores et febre, mortiferi b). Et rursum: Ex anginosi mortifera omnia, quae dolorificum matum foras non abiciunt. Quin etiam ad crura procedunt diuturna mala, quae difficulter, et moleste in pus vertuntur c). Neque tamper ad intestina conuersio alui fluxum inferens est salutaria d). Multo magis desperata res dicitur, si a forti strangulatu in angina repente stercus exeat e). Exsolutionem enim virium significat. Quae etiam dolores sine causa sedati, mortem (quod supra §. CCCLXXX: animaduersum est) subesse stantur f). Gangraena quippe eos excipit, delet, facile intelligitur. Funesta quoque rumque est angina symptomatica, febribus thematicis, et malignis superueniens. Quae tamen non ita mala visa est, praecipue in mulieribus, si, ea exorta, delirium cessauerit. Major vero metum facit in morbillis, atque aliis thematicis morbis.

a) In aphor. BOERH. §. 809. n. 5. b) Cap. XV. n. 12.
 DVRET. edit., vel N. 373. LIND. edit. c) lb. n. 15.
 vel n. 376. ed. LIND. d) Coac. N. 373. e) Coac N.
 368., vel cap. XV. N. 7. DVRET. ed. f) Coac. cap. XV.
 N. 9. DVRET. editio.

§. CCCLXXXII.

Si ista (§. CCCLXXIX. ad CCCLXXXI.) vero de- *Signa falsa*
 fuerint, aut iis contraria euenerint, spes erit salutis *sis.*
 recuperandae. Hinc ait HIPPOCRATES: *Ab angina*
detento tumorem fieri in collo, bonum: foras enim
morbus vertitur a). Item bonum eadem de causa
 effeuerat, si tumor, et rubor in pectore prorumpat b).
 Tutius ubique in Coctis praesagis, et Praetotioni-
 bus pronuntiatur, tumorem, ruborem, et abscessum ad
 externas quam maxime partes vergere c), praesertim
 i ad interna minime reuertantur d). Saepe morbum
 euant sanguis e naribus, aut vtero, aut haemor-
 hoidibus prorumpens, aut biliosa diarrhoea, aut
 odor etiam, si signa coctionis in vrinis praecesser-
 int, et bonae criseos indicia non absint. Neque
 dolor artuum superueniens semper malus est, dum-
 modo per eum angina, ejusque graua symptomata
 mitigentur.

a) Aphor. 37. sect. VI. b) Aphor. 49. sect. VII.
 Coac. N. 365. Praenor. N. 136. d) Coac. N. 365.
 praenor. N. 134.

§. CCCLXXXIII.

Ex his (§. CCCLXXXII.) igitur, itemque ex iis, *Quibus fe-*
 uae alibi de resolutione cuiusvis inflammationis a, *gnis cogno-*
 posita fuere, cognoscetur, anginam resolutum iri *scantur va-*
 d suppurationem vero (§. CCCLXXVIII.) eam per *rii anginae*
 ci intelliges, si febris, quae vehemens, atque exa- *termini.*
 rbaris fuit, sine resolutionis, aut criseos vllius *Resolutio.*
 gnis paullatim se se remittit, et dolor ex acuto, *Suppuratio,*
 pulsante in obtusum, et grauatium mutatur, tu-
 orque, si manu, aut digitis, aut specillo explora-

ri potest, mollitudinem quamdam, qualem liquida materia exhibet, adipiscitur; et demum, si tumor non evanescente, rubor, atque inflammatio in *Gangraena.* et circa eum plurimum minuuntur. At ubi nec resolutio, neque diadoche, neque euacuatio critica, neque suppuratio fit, et contra vehementis inflammatio cum omnibus symptomatibus persistit, urgetque, profecto timor imminet gangraena. Hanc jam praesentem esse commonstrant pulsus debiles, inaequales, parvi; color faucium ex rubro in lividum, aut nigrum mutatus, aut summorum debidum, ac pallidum; tumor subsidens, dolor defatio, halitus foetens, teter faciei color, aut pallor, aut liuor, atque extremorum refrigeratio. Non tamen omnis gangraena anginis superueniens lethum certo affert. Interdum ea, quae ex erysipelate per febrim, et quasi per diadochen ad fauces propulso, materiaque maligna, et deletoria ibidem deposita oritur, quod saepe contingit, et palatum, tonsillas, vuulamque dumtaxat, partes nimirum manui, oculisque subjectas occupat, etque altius, neque diffusius nimis proserpit, operationem non omnem respuit. In scirrhosam conditionem demum definit angina, quando nec resoluta, nec suppurata, nec gangraena correpta tumorem relinquit doloris expertem, colore naturali finis praeditum, durum, pertinacem, diuturnum medicamentis obsistentem; quem nec febris, nec magna deglutiendi difficultas amplius commovet. Huic potissimum malo obnoxia est angina *larynx, pharyngea, et oesophagea*; quamquam et quae etiam, licet rarius, ab hac degenerant immunes non videantur.

Scirrhus.

a) *Comments. de inflamm. §. LXII. et seqq.*

Curatio

C u r a t i o.

§. CCCLXXXIV.

Cum ergo in angina inflammatoria, et praesertim ea, quae laryngem, aut tracheam tenet, aut aces tumore ita occludit, ut non solum deglutienti, verum etiam spiritus ducendi potestas tollatur, statim videlicet, aut impeditis viis, summum periculum afferat quaevis cunctatio; statim ad valentem medendi rationem properandum est, ut quamerrime tumor inflammatorius minuatur; solutaque, reuocato aliorum sanguinis impetu, immutataque ejus copia. Vena igitur quantocius secunda, tamdiu sanguis effluere sinatur, donec facies, collum, oculique ruborem intensiorem amittant, et quasi expallescant; ac pulsus plurimum in magnitudine, et velocitate, quam viribus sublat; non vero, ut aliqui praecipiant, tantum sanguinis profundatur, ut animi sequatur, aut instet aliquum. Non enim periculo vacat eorum praecipitis nimis propere, aut temere indulgere. Multum quidem sanguinis hic mitti oportet; sed aetate, temperamenti, habitus, sexus, consuetudinis, aetatis, et regionis ratio semper habeatur. In manne plethoricis, robustisque hominibus quindecim, et viginti unciae, aut paullo etiam plus, si lato itinere detrahantur, satis profecto erunt pro vna vice; et sic proportionate aliquanto minus in minus habitioribus, minusque valentibus. Disceptatio solet, quam ex parte eum detrahi praestet. In maxima vasorum plenitudine, evidenterque caput confusus sanguinis ex infernis partibus raptu, uti accidit, quando post suppressa catamenia, lochia, aut hemorrhoides malum repente oboritur, tutius in clinicorum plerisque putaverim in pede primum, deinde in brachio venam incidi; praesertim

Curatio anginae inflammatoriae.

Sanguinis misso largi summum reuocandum.

Loca delenda, quo sanguis miseri debet.

iis, siue mares, siue foeminae fuerint, quorum
 culiarem corporis constitutionem ejusmodi esse
 perientia constitit, ut sanguinis detractionem in
 prioribus artubus ferre nequeant, quin sibi pos-
 opprimi, caputue praegrauari perferant. Ca-
 rum e venis cubiti communius, utiliusque, ut et
 parti laboranti proximior, sanguis emittitur; ut
 potentius repellit, neque ita facile, ut ex pede
 sus metastasin materiae morbosae, quae saepe
 mero mobilissima est, ad alia viscera, et praer-
 tim ad pulmones, aut abdominis cauum
 Morbi vero impetu nequidquam retuso, aut
 inualecente, eadem sanguinis missio breui pos-
 tanda est, ut aeger ab imminente suffocatione libe-
 retur. Idque repeti toties licet, quoties indicati
 perseveret, et vires satis valeant. At quoniam
 hementissima angina per se celerrime suffocat, et
 circo monet Cl. SWIETENIUS a), venae sectio
 tunc licet necessariae, praemittendam esse an-
 euentus, et summi periculi prognosin; ne scilicet
 mors, si malo fato incidat, remedio potius quam
 morbo tribuatur.

a) In BOERHAAV. §. 809.

§. CCCLXXXV.

Sin harum venarum sectio non satis profecerit
 vel adhuc efficacius auxilium morbi vis possumus
 sanguis e jugulari vena, si fieri possit, extem-
 mitti debet; quo nihil praestantius ad immine-
 dam in proximis partibus sanguinis congestionem
 Non enim deriuat, ut vulgo putatur, sed rursus
 ut cognita vasorum distributio ostendit. Quod
 neque euacuatio haec profecerit, aut aliquo mo-
 minus institui queat, impedimento fuerit, opor-
 tunissimum, utilissimumque est, raninas venas in
 lingua *) aperire, cucurbitulas ceruici posterio-
 ri

*Communius
 e brachio
 mittitur, et
 cur.*

*Iteranda
 sanguinis
 missio.*

*Monitum
 Swietenii.*

*Quando ju-
 gulares, an-
 raninae ve-
 nae aperiun-
 dae.*

*Cucurbitu-
 lae quo loco
 defigendae.
 Alui ductio.*

lli lateribus, aut subter mento, aut scapulis, in-
 a altius cute, affigere, aluum catharticois anti-
 logisticis, aut saltem clysmatibus acrioribus du-
 re, pedes in aquam calidam demittere, et per-
 care, et pedum plantis etiam ea, quae irritant,
 rubefaciunt, imponere, vt, quoad fieri potest,
 tentissime fiat *reuulſio*. Praeterea iubendum est,
 vapores ex aqua calida, cui etiam aliquid aceti
 eſtum ſit, ſi feratur, inſpirentur; ſed cauere
 ortet, ne nimium calidi, aut nimium irritantes
 t. Fauces vero lacte, aut poſca tepenti alluen-
 : potius ſunt, quam colluendae, ne dolor ex gar-
 rizatione augeatur. Acetum vero omittatur, vbi
 lor acerbior eſt, ne eo loca dolentia exasperen-
 : Interim, quoad licet, imperanda eſt frequens
 billatio decocti althaeae, vel hordei, vel florum
 nbuci, vt fauces humeſcant, laxentur, mulcean-
 rque; humores vero omnes diluantur, liquentur,
 reſoluantur. Eo ſpectant quoque eclegmata
 oſa, mucilaginosa, refrigerantia, anodyna, leni-
 mellita, de quibus aliquid ſaepe delingi debet.
 am primum vero deglutiendi iter liberius eua-
 , liberaliore potu opus eſt, calido, crebro, anti-
 ogiſtico, attenuanti, ſaponaceo. Interdum gur-
 io, amygdalae, velumque pendulum palati adeo
 pent, vt vna quaſi coeant in tumorem omnem
 cium hiatum occupantem, aerisque ingreſſum
 ie totum prohibentem; tunc praefentiſſimum,
 ere vnicum auxilium praebet prudens, et cauta
 rum partium ſcarificatio, qua, ſanguine efflu-
 e, citiſſime detumeſcunt.

*Balnea pi-
 dum, et
 crurum fri-
 cationes.*

*Vapores in-
 spirandi.*

*Cautiones
 circa gar-
 rizationem, et aceti
 uſum.*

*Quae ſorbil-
 anda ſint.*

Eclegmata.

*Potus copio-
 ſus.*

*Faucium
 ſcarificatio.*

Raninarum ſectioꝝ duo obijci ſolent: primum, quod
 ter inciae non ſatis ſanguinis effundant; alterum, quod
 acius ſectae humoris plus, quam oportet, amittant, hae-
 rhagiamque, quae ſiſſi quandoque nequeat, procreent.
 In magna ſanguinis congeſtione vix timeri vnquam
 potest;

potest; nam ob refluxum sanguinis prope impediuntur huiusmodi venae, et non ita cito inaniantur; neque non punctim, sed caesim, et transuersim aperiri, et rique aqua calida ore recepta debent, ut sanguis liber, et diu, prout volumus, manare possit. Sic primae illi dejectioni obuiam itur. — Altera vero, qua haemorrhagiae metus incutitur, facili quoque negotio euanesceat, si et sanguinis diathesis in vera, ac legitima inflammatione, et renarum exiguitas considerentur. Sanguis cum ad coalescendum, cohaerendumque sit pronior, vix, ac ne rix quidem fieri potest, ut diutius, quam nobis lubet, effluere pergat. Breui enim per se, vel aëris attractu in haec cogitur, et ora vulneris claudit, vel admota frigida, et spleniolis ex linteo duplicato vulnuscule impositis, et aliquamdiu adpressis facile sistitur. Exiguitas denique renarum tanta est, ut ad magnam sanguinis profusionem non sufficiant. Vera tamen dicunt, qui eiusmodi timorem deijciunt, si de angina non inflammatoria, si de cachectica et scorbuticis hominibus loquantur. In his enim haemorrhagiae ex rapinis audacius concisis pene lechiserae, et non semel egomet ipse vidi, enascuntur. In aliis vero atque in vera sanguinis inflammatoria diathesi nunquam huiusmodi infortunium obseruaui, etsi saepissime ad hanc sanguinis missionem confugerim, adhibitaque etiam pluries interfuerim.

§. CCCLXXXVI.

*Topica externa.
Reprimentia.*

Interea negligenda haud sunt ea, quae extrinsecus adhibita leuando morbo adjutrices manus conferre creduntur. Plerique statuunt, in hoc morbo admouenda ea esse, quae influentem humorem leniter reprimant, et vasa subadstringant; siue liaque, eo inclinante, commendant. Ab his tamen in augmento, siue inflammatione jam prouecta, diligentissime cauent; quod sanguinem coactum magis compingunt, et vias angustiores reddunt.

*Tutius quae reuolunt.
Fomenta et cataplasmatum molliora.*

Tutius tamen vel inter initia est auocare, et reuolare, quam reprimere, et roborare. Hinc praefertur fomentis humidis, moderate calentibus, assiduo motu, aut etiam cataplasmatum ejusdem generis.

nimirum quae molliant, et leniter discutiant, col-<sup>lia, et discuti-
tiencia
praeferun-
tur.</sup> lum circumcingere, cautione adhibita, ne calore, aut pondere molestiam creent. Vfsitatiffima ad id esse solent decocta ex malua, althaea, parietaria, feminibus lini, foenu-graeci, floribus sambuci, chamaemeli, meliloti, verbasci, atque ex his cataplasmata quoque parantur, addito oleo quodam pingui, veluti nymphaeae, violarum, rosarum, aut simili. Non nulli his croci orientalis, aut camphorae tantillum adjiciunt; sed animaduertere oportet, ne odore aegri laedantur. Aliis pulpa cassiae eum-<sup>Pulpa cas-
siae lauda-
tur.</sup> dem in finem cataplasmatismatis instar collo applicita probatur, et reapse praeferenda, vt vt simplicissima, multis aliis videtur; sed curandum est, vt leuiter prius calefiat, et non magno volumine admoueat. Nec desunt, qui ex veterum consilio, et auctoritate ^{Epispastica.} acribus, sinapi videlicet, sale, scilla, aut similibus collum, pectusque rubefaciendum, vlcerandumque praecipiuut, vt ad exteriora morbus a) auocetur. Imo cantharides fermento panis exceptas admouent, vt vesicae excitentur, narrantque, praeclaros inde effectus saepissime consecutos esse. Depleta vero prius vasa, et retusus febris impetus aliquantum sit, oportet. At vbi jam ingens subitae suffocationis <sup>Tracheoto-
mia.</sup> metus incumbit, ne quidquam intentatum relinquatur, ad tracheotomiam per se nec difficilem, nec periculosam b) deueniendum esse sine mora existimant *). Verum haec tum solum prodesse poterit, cum praefocationis causa non infra laryngem propagatur. Secus, non item.

a) SWIETEN. l. c. b) Séanc. Publiq. de la Societé de Médecin. de Paris le 9. Decembr. 1779. LOUIS Mémoir. de l'Acad. Roy. de Chirurg. T. 4. et DE MARTINIERE ib. T. V. vid. LE BLANC op. chirurg. Vol. I.

*) Tracheotomia, quae fit aperto inter anulum, et anulum in trachea foramine, immissoque idoneo, vt chirurgi docent, tubulo, per quem spiritus duci possit, vix aliquid periculi

periculi habet. Verum, quando aliquod corpus ex eadem trachea, casu in ipsam illapsum, extrahendum est; tunc sane necesse est, ut non modo tegumenta longitudinali incisione diuidantur, musculique diducantur, verum etiam aliquot annuli, et pars quaedam glandulae thyroideae dilacerentur, quo corpus alienum erui possit. Quo in casu operatio non omni caret periculo, 1. quia vulnus non facile corr., nec facile cicatrice obducitur; 2. quia vulneratur glandula thyroidea; 3. quia ex laesis vasis sanguiferis non omnino exiguis haemorrhagiae metus imminet; et 4. quia nervi recurrentes saepe reciduntur cum vocis, et loquelae jactura. At quamquam illud prius tracheotomiae genus tutius, faciliusque adhiberi potest, nolim unus quis credat, omni difficultate ipsum vacare. Raro enim tubulus qui inseritur foramini, sic adhaeret loco, ut non saepe exeat, irritamque reddat operationem. Quod si vinculis, et compressione eum in sua sede detinere tentes, saepe tussim, doloremque excitat, ut amoveri eum oporteat. Quare Cl. FOURCROY tracheotomiam posthabendam laryngotomiae esse nuper censuit, locum commodissimum, in quo institui potest sine vlla molestia, ac difficultate, proponens. Locus autem ad id aptissimus est spatium illud quasi triangulare, quod medium jacet thyroideam inter, et cricoidem cartilagineas. Ibi non glandulae, non vasa, non musculi, non nervi insignioris visciduntur. Sola cutis, et tracheae sola tunica perforanda est acu triquetra, cannulae inclusa, quam *troquartium*, sive *paracenterium* vulgo vocant. Hunc ipsum locum cuiusque alii praeferendum putat Cl. VICQ D'AZYR, additque, ejusmodi laryngotomiam felicissime in canibus jam esse tentatam (*Séanc. publique cit.*). In hac vero sede perforatio ista tum solum utilitatem asseret, cum causa suffocationem minitans summam, et supremam laryngem occupabit; non vero, si infra perforationis locum constitent. Inutilis quoque, ut patet, erit, vbi corpus aliquod in tracheam illapsum extrahi debeat. Tunc enim trachea ipsa aperienda est, ut mox dicam.

§. CCCLXXXVII.

*Quae suppurationi con-
veniant.*

Cum vero angina ad suppurationem tendere (§. CCCLXXXIII.) videatur, locus, vbi suppuratio fit, lacte, butyro, oleo blandissimo, aut decocto emollienti,

nti, et mucilaginoso assidue humectandus, fo-
ndusque est. Pure demum confecto, abscessus
ature aperiri debet. pharyngotomo, aut alio ac-
modato instrumento, vt pus emittatur. At,
i tonsillae pluries, et saepe inflammationi obno-
ue fuerint, nec vnquam perfecte detumuerint, et
bile in eandem leui ex causa relabi soleant; tunc,
eas suppuratio occuparit, non mature nimis ape-
ndae sunt, sed expectandum, donec suppuratio
inem duritiem, et tumorem consumserit, ac de-
erit. Sic enim non solum earum scirrhusa in-
ratio, verum etiam ad inflammationem nimia
ocliuitas auerti solet. Non raro sola compres-
ne, aut repetito deglutiendi conatu abscessus dis-
mpitur, et, dictum factum; erumpente, et ex-
eato pure aegri, qui paullo ante ad extrema vide-
ntur redacti, repente liberantur, et reuiuiscunt.
uerto, vel sponte rupto abscessu, satis est, aqua
hordeo decocto cum melle mixta vlcus leniter
tergere. Hac sola facile repurgatur, et con-
escit.

§. CCCLXXXVIII.

Si contra gangraenae indicia in faucibus se pro-
e alicubi incipiant (§. CCCLXXXIII.), non cun-
dum amplius est, sed protinus ad antiseptica
fugiendum. In horum vero usu cauere opor-
ne inflammationem adaugeamus. Itaque acria,
ue irritantia vitentur, aut certe summa pruden-
adhibeantur. Initio, cum ambiguae adhuc no-
gangraenam indicent, satius erit gargarizare ex
a florum sambuci, aut scordii; succo mali me-
, aut citrei modice acidulata, et calenti, aut ex
a communi cum pauxillo aceti, et mellis; aut,
argarizare nequeant, nesciant, aut nolint aegro-
es, h^{os}ce liquores in fauces per syringam inji-
e, aegris interim ab inspiratione abstinere iussis,

Z 5

Signis

Progressu aliquando validius agere licet. Signis gangraenae incrementibus aliquid gargarismatibus addi licet ex spiritu acido salis marini vel volatili salis ammoniaci, vel ex tinctura myrrae, atque eodem spiritus melle rosaceo exceptos.

Scarificatio quando?

si manui, et oculis pateat, saepe illini, aut pincillo his imbuto maculas gangraenosas crebro, et leniter attingi, ut coercetur earum progressus. His vero non proficientibus, scarificatione pertendi

Potus qualis et quantus.

ea loca debent. Quae dum aguntur, si deglutendi facultas redierit, aut liberalior euasit, liberaliori manu potui dentur, sed calide, ea omnia, quae diluunt, temperant, et diaphoresin promouunt, quae vim vitae leni stimulo erigunt, et quae putredini aduersantur. Hic praesertim celebrantur heres chamaemeli, herba scordii, cortex peruianus,

Antiseptica interna.

Camphora qua ratione adhibenda.

alkali volatile, et camphora. Diluta, decocti tincturae ex his comparantur. Camphora acriter calenti, addito paucillo sacchari albi, solui commode potest, et liquoribus quibuscumque admisceri. Saporem facile corrigunt additi syrupi ribesorum, violarum, althaeae, rubi idaei, vel similia.

§. CCCLXXXIX.

Angina in scirrhum degenerans quid possidet.

Rarius euenit, ut angina inflammatoria in scirrhum (§. CCCLXXXIII.) degeneret. Id vero si vequam incidat, ea in mentem reuocentur, quae a nobis opportune tradita fuerunt a). Tonsillae huic malo magis subijciuntur. Harum scirrhus, si alia ratione resolui nequeat, chirurgi manu facit, et sine periculo excindi poterit, aut crebris scarificationibus paulatim deteri, et suppuratione inducenda consumi. Atque haec plane sunt celsioris artis praesidia, quae ad anginam inflammatoriam curandam adhibentur; quamquam nec omnia semper, nec in quauis ejus specie necessaria reputantur. Leuiiores enim faucium, gurgulionis, et tonsillarum

intra

inflammationes paucioribus, mitioribusque adiu- *Leuiore au-*
 mentis discutiuntur. Victus ratio ex solo jure *linae pau-*
 tenui, ouorumque vitellis, aut hydrogala, aut *cioribus*
 ptisana saturatiore constabit. *gens.*

a) *Commens. de inflammat. §. LXXVIII.*

ANGINA CATARRHALIS, SIVE NOTHA.

§. CCCXC.

Ab angina inflammatoria, siue vera gradum faci- *Descriptio.*
 mus ad *anginam catarrhalem*, siue *lymphaticam*, siue
notham passim dictam. Haec a priore illa differt
 tumore potius lymphatico, et seroso, quam san-
 guineo, minus rubicundo, imo interdum pallido,
 dolore exiguo, aut certe non pulsante, febre vel
 absente, vel plane mitiore, et catarrhalium simili.
 Amygdalae, vuula, velum palatinum, et proximae
 partes frequentius hoc morbo corripuntur, quam
 fauces reliquae. Facilius quoque in eum incidunt
 homines pituitosi, laxiorisque habitus, senes aequae,
 ac pueri, humido, nubiloque in aëre degentes.

§. CCCXCI.

Mucus, lympa, serum, si in folliculis, cryptis; *Causa pro-*
 vasis, cellulosoque textu congeruntur, accumulan- *xima.*
 tur, stagnant, uterque acrimonia, aut copia, aut
 lentore irritant, distrahunt, et leuiter inflammant,
 causam morbi proximam constituere videntur. In *Causae re-*
 remotis vero numerantur temperamentum humi- *motae.*
 dum, et frigidum; aetas senilis, aut puerilis; sexus
 sequior; pluviosae, et austrinae aëris constitutio-
 nes; hiemale tempus; subitae, et insignes tempe-
 statum mutationes; cacœhymia scorbutica, arthri-
 tica venerea; rheumatica diathesis; acritates quae-
 cunque; expiratio cohibita, retenta; lymphae,
 lymphaticique systematis vitia, atque alia hujus-
 modi.

§. CCCXCII.

§. CCCXCII.

Veritas. Ad hanc anginam (§. CCCXC.) referri debet *anginae aquosae, lymphaticae, pituitosae, oedematosae* auctorum, in quibus tument quidem, sed laxae, molles, ruboris expertes, leuiter dolentes, et saepe numero aquoso tumore quasi pellucidae: itemque dolores leues faucium sine febris, cum nullo, aut exiguo rubore, nec valde calido, tenuique tumore, ex quo organa deglutitionis, et vocis in suis functionibus non admodum intense laeduntur.

§. CCCXCIII.

Diagnos. Morbus ex tradita haecenus descriptione facile cognoscitur. Interdum non desunt tumores glandularum ceruicalium, maxillarium, parotidum, aliarumque saliuarium, siue lymphaticarum. Nec tussis, nec catarrhales ceteri affectus desiderantur. De *Prognosis.* quadam *anginae aquosae* specie apud Wallenses, in locis praesertim mari proximis, epidemica, et maligna, quae oris, palati, et vicinarum partium glandulas tumidas, et distentas referebat, multoties intra biduum, aut triduum enecabat, mentionem facit Cl. MEADIVS a). Alioquin per se minus periculi habet, et saepe solo diaetetico regimine, et naturae beneficio paullatim abigitur. Quando congestio grauior, ingentiorque est, et frequentius recurrit, difficilius discurrit; imo interdum in abscessum transit, aut post se tumores duros, in primis cum tonsillae affectae pluries fuerint, relinquit. Hinc facilis ejus in anginam scirrhosam transit. Negari tamen haud potest, interdum hujusmodi anginas periculosas fieri, cum nempe epiglottidis, glottidem, et laryngem afficiunt, aut aliter respirationis spiritus angustiores reddunt, quod ex difficili inspiratione, loco dolente, vocis raucitate, aphonia, tussi, stertore, aliisque cognoscitur; aut cum a scorbutica

utica, aut venerea labe profectae vlcera mali moris quaquauerfum depascentia, profunda, lata, vehementer dolorifica, circum inflammata, rebellia excitant.

a) *Monit. et praecept. meth. cap. 4. p. 52.*

§. CCCXCIV.

Itaque, vbi aliqua artis ope eget malum, ea in *Curatio.*
 sum veniant, quae copiam humorum minuunt, liorsumque auocant; crassam, et lentam lympham attenuant, stagnantem digerunt, ac soluunt; acre mendant, et diluunt; vim, et tonum vasis, fibris, et membranis restituant. Quare, si febris est, etsi *Quando venena secanda.*
 non acuta admodum; si tumor, dolor, et rubor intus euadat, vt timor instet proximae inflammationis, aut si deglutitioni difficili difficilis quoque respiratio adjungatur, non erit alienum sanguinem mittere, sed parciore manu, quam in angina inflammatoria; idque speciatim audere licebit, si temperamentum ad sanguineum propius accedat, et plenior habitus, et viridior aetas, et corporis, viriumue robur vna consentiant. Misso semel, aut bis, opus fuerit, sanguine, cucurbitulae cum siccae, cum scarificatae. ceruici, et dorso admouendae sunt; earum applicatio tum etiam multo opportunior censenda erit, cum sanguinis missioni locus nullus se posse visus fuerit. Neque raninis parcendum *Raninae quando incidendae.*
 enim est, quotiescunque plurimum humoris lingua contraxerit, itaque intumuerit, vt prae tumore intra os contineri nequeat. Infantibus, puerisque, *Hirudines.*
 quibus venae incidi haud potuerint, auxilio essent lentae hirudines prope venas cubiti, aut colli applicatae. In illa *angina aquosa epidemica* a MEADIO *Curatio Meadiana.*
 memorata, quae adeo perniciofa erat, vt multi intra tres dies, ea correpti (§. CCCXIII.) perirent, fuit quam plurimis haec medendi methodus:
 Statim

Statim mittebatur magna copia sanguis; deinde laxabatur leni eccoproctico, aut enemate alius; postea emplastra ex cantharidibus sub mento, aut alibi lateribus admovebantur: sin autem per haec satis proficiebatur, in palato circa vuulam, vique sub lingua, plagis satis altis vulnera infligebatur, quibus malus humor erumperet; intrinsecus vero ter, quaterue in die dabatur pulvis contrariae eruae compositus cum pari nitri pondere a).

a) MEAD. L. c.

§. CCCXCV.

Cathartica. Celebrata, si res tulerit, sanguinis missione, reliquum est, ut ad reuellendam, euacuandamque leuissimam colluviem alius ducatur medicamentis hydragogis, manna videlicet, senna, syrupo aureo solutiuo, sale cathartico amaro, diagrydio, itemque si validius agere oporteat, jalappa, mechoacanna, similibusque; quod in primis anginae pituitosae, serosae, oedematosaeque (§. CCCXCII.) conuenientissimum est. Subinde etiam danda sunt intrinsecusque diluunt, et leni stimulo diuresin, diaphoresinque promouent, uti decocta radicis bardanae, similis asperae, saponariae, ligni sassafras, aliaque id genus; quibus adjici poterit aliquid oxymellis simplicis, aut etiam scillitici, prout opportunius videbitur, quo valentius incidunt. Hic quoque, si nequam, locum inuenire potest *aethiops mineralis* drachmam semis bis in die dandus, quem tanquam praesentissimum, promptissimumque auxilium in angina depraedicat LANGE a). In ea autem, quae cum labe venerea complicatur, aut a strumosis moribus, scirrhisque comitatur, in primis mercuriale hujusmodi remedium magis conueniet.

a) Miscel. veritat. Fascic. I. p. 5.

§. CCCXCV.

§. CCCXCVI.

At interdum medicamenta deglutiri nequeunt. *Vesicantis.*
 unc ceruicem posteriorem cantharidibus imposi-
 ; exulcerare; in brachiis earum ope vesicas indu-
 re; pedes, et crura acriter perfricare; aluum *Fricationes.*
 iematibus, et quidem acrioribus sollicitare vtilissi-
 um est. Gargarismata quoque primum resolu-
 i, et discutientia, deinde subadstringentia, et robo-
 rantia conueniunt. Si haec quacunque ex causa
 ministrari nequeant, aut gargarizandi actio do-
 rem intendat, aut faucibus multum muci, et vi-
 dae lymphae adhaereat, easque oppleat, liquor
 oneus per syringam injiciendus est, vt fauces *Injectiones.*
 rentur; sic tamen injicitur, vt non in laryngem
 grediatur: suffocationis enim metum induceret.
 ec aliena sunt quae ore detenta salivae fluxum *Sialagoga.*
 liciant, talia tamen, quae inflammationi, si qua est,
 on officiant, aut, vbi non est, eam non excitent.
 xymel scilliticum, itemque sal prunellae utroque
 casu, et modo videntur reliquis praestare. Prae-
 rea extrinsecus fomenta, cataplasmata, et empla-
 ta, quae molliant, discutiant, resoluantque, omit-
 non debent. Imo horum actio leni fricatione
 iuuanda est. In primis haec opportunissima ha-
 ntur, quando glandulae lymphae tenaci, et crassa
 plentur, et turgent. Quo casu fomenta humi-
 vaporem aqueum suppeditant, qui in venas ab-
 rrentes receptus ad glandulas breui via defertur,
 mirifice lympham diluit, attenuat, et soluit.

§. CCCXCVII.

Malum demum si malo fato in abscessum, aut *Abscessus, et*
 rrum abeat, curatio fere eadem conueniet, *scirrhus, et*
 am supra commendauimus (§§. CCCLXXXVII. *ulcera quo-*
 CLXXXIX.). Vlcera vero mali moris, et depa- *modo curen-*
 ntia (§. CCCXCIII.) si superuenerint, non aliis
 curan-

curantur, quam iis, quae notae acritudini, et humorum dyscrasiae, unde fouentur, contrariis sunt. Idcirco provide, et sollicitè antiscorbuticis, antivenericisque medicamentis, sed diu, et liberè adhibitis oppugnentur; topicis interim, quae tergant, atque antiseptica virtute pollent (§. CCCLXXXVIII.), non praetermissis, et, si foeda, et sordida fuerint, spiritu vitrioli, aut collyrio LAFRANCI etiam applicito. Cauto tamen opus est, ne ulcera, cum primum deterga, pura, rubra, et valde sensibilia facta sint, acris amplius irriterentur; sed satius tunc est mollissimis ea, et blandissimis medicamentis nutrirè, et mulceri. Non abhominabili ratione (§. CCCXCIV. ad CCCXCVII.) angines

Anginis aquosae, et oedematosae, et leues faucium dolori (§. CCCXCII.), cum febre carent, curandas omnino sunt, excepta, et omissa sanguinis missione; nam in his sola cathartica, aperientia, epispastica, etiam collo ipsi admota, vesicantia, et sudorifera suffi-

ciunt; quamquam in leuiore morbi gradu, et in laesione partium, quae minus vitae necessariae sunt, saepe sola diaeta, et abstinentia intra paucos dies malum omne depellitur.

ANGINA GANGRAENOSA MALIGNA⁴.

§. CCCXCVIII.

Quid ea sit? Anginam inflammatoriam quandoque in gangrenam desinere, supra (§. CCCLXXVIII.) animaduersum est. Hic vero de alio anginae genere, benigno, et plerumque epidemico, infantibus, pueris, et adolescentibus prae aliis insensissimò, quod immitte quoddam venenato, et putrefaciente ad hanc, et speciatim ad tonsillas traducto, easque quae, et ignis facit, adurente profluere videtur, sermo noster

Discrimen his habendus est. In priore illa nulla malignitas est, neque vlla putredo antecedens; et gangraenatoriam.

ipsa, quando accedit, maximo tantum inflammationis gradui superuenit, debeturque, et plerumque, ubi praesertim interiora occupat, latiusque diffunditur, extremum morbi finem certa nece facit. In hac vero aliter res habet; nam leuissima diatheseos inflammatoriae indicia a) adfunt, malignitatis contra, putredinisque maxima, et indubia; et gangraena, quae prope omnium aegrotantium communis est, non sero, sed citissime superuenit, et quamquam saepe perniciem afferat, non tamen semper vitam idimit, nisi cum in laryngem, tracheam, et pulmones se se propagauerit; nam pluries, adhibita cita, atque accommodata medicina, malum sistitur, aegerque seruetur. Non ergo haec vehementissimae inflammationis soboles est; sed causticae, malignae et deleticis caussae effectus. *Gangraenosam anginam* hanc vocauimus, quod gangraena perpetuo fauces corrumpat; sed addidimus *malignam*, ut prava ejus natura innotescat, qua discriminetur ab angina inflammatoria, interdum et ipsa in gangraenam desinente.

Nomine
ratio.

*) *Synonyma.*

Angina maligna, et gangraenosa ann. 1751. ad 1753.
 IVXHAMI, *Journ. de Médécin.* Octobr. 1757. vol. VII. p. 241.
Angina gangraenosa TVSSANI, GILB. BOVLLAND *Quaest. medic.* 1750. *Angina gangraenosa* CHOMELII, *Dissert. sur l'espec. de mal de gorge gangreneux de Pan.* 1748. Paris. 1749. *Angina in gangraenam desinens*, D. MARTEAU; *Journ. de Med.* T. IV. Mars 1756. p. 222. *Angina maligna ulceroza* FOTHERGILLII, *An account of the sore Throat attended with ulcers* 1748. 1751. vid *Comment. Lips.* Vol. I. p. 493. *Tonsillarum gangraena* MEADII, *Monit. et Praecept. med.* cap. IV. p. 52. *Pestilens, et praefocans pueros abscessus, quem graece vocant ταιδαρχόνιον λοιπόν.* siue *Puerorum strangulatum pestilentem.* M. A. SEVERINI, *De rationis. abscess. natura* ed. Francof. 1643. p. 428. et seqq. *Crustosa, malignaque Tonsillarum, et faucium ulcera* IO. ANT. BOGLIA 1620., *de Anginosa passione* *Morb. strangulatorius* AETII, CLETI SIGNINI, *De morb. strangulator.* Rom. Vol. III. P. II. A a 1636.

1636. 8. *Pestilens faucium affectus* IO. ANDR. SGAMBATI, *De Pestilens. fauc. affect.* Neapoli sacriente 1620. 4. *Vir Syriacum* M. ANT. ALAYMI, *De Ulcer. syriac.* Epidur strangulatorius affectus IO. BAPT. CARNEVALLII, *De strangulat. affect.* Garrotillo HISPANORVM, *Renat. Mor.* inter epist. medicinal. Thom. Bartholini, cent. I. ep. LXXI. *Angina gangraenosa, Pseudanchone* SEVERINI, VOGELII, *De cognosc. et curand. praec. c. h. affect.* §. 184. p. 135. *Angina maligna, vel morbus strangulatorius, vel pestilens faucium affectus* FRANC. HOMII, *Princip. medicina. lib. 2. part. 1. sect. IV.* *Anginae primum genus ann.* 1747. MARTINI GALLII, *Letter. med. Lett. 2. sopra le Angin. epid.* Depressi 1747. e 1748. Cremon. 1749.

a) *Commentus. de Inflamm. §. XLIII. ad §. XLVII*

§. CCCXCIX.

Vaporibus nota, et descripta. Hanc, si minus ab HIPPOCRATE a), certe ab ARETAEO b), atque ab AETIO c) antiquissimis medicis cognitam, et luculenter descriptam censent plerique neotericorum d). Ab iis tamen dissentit

Diffensio inter Vogelium et Swietenium. quam maxime Cl. VOGELIUS, cui videntur illi graves viri de aphthis scripsisse eo loco, non de angina ista, cum memorent ulcera sensim a tonsillis ad labellam, linguam, gingivas, et dentium alveolas provenire, quae aphtharum natura est. Et certe, subiicit, in angina gangraenosa lingua, et gingivae immunes sunt ab omni labo: nec haec diu e) excruciat. At

alia omnino sententia est Cl. SWIETENIO; nam is concedit quidem aphtharum nomine ibi malum describi, sed plane diuersum ab aphthis hodie vocatis veram nempe gangraenam a depositione malignae materiae versus fauces natam, et tale malum ad anginam gangraenosam pertinere f). Et quod attinet ad ARETAEVM, reuera ex toto capite de tonsillarum ulceribus inscripto, si omnia, quae ibi scripta leguntur, vna perpendantur, multo verosimilius videtur, non de aphthis hodie sic nominatis g) ibi agi sed de maligno, et gangraenoso faucium morbo, anginae

Confirmatur opinio Swietenii.

iginæ huic gangraenosæ simillimo. Nam, præter vlcera maligna *concreto humore albo, aut livido, et nigro sordentia*, quæ tonsillis innascuntur, melioratur ibi *colli* quoque externus rubor, qui *phlegmones* instar non nunquam efflorescit, atque *erumpit*. Quod sane ab aphthis hodiernis alienissimum est, dum contra hujus gangraenosæ, et malignæ iginæ fere proprium esse consuevit. Præterea, alium ab ARETÆO descriptum non diuturnum est, cum eo laborantes *non multis diebus post, phlegmone, febribus, foetore, inediaque consumti* interire dicuntur. Adde, AETIVM de lingua, gingivis, dentibus in ejus historia ne verbum quidem facere, dum in reliquis symptomatibus recensendis minime cum ARETÆO consentire videtur. Quare probabile utique est, id, quod de gingivis, lingua, dentibus ab ARETÆO notatum fuit, quodque VOGELIO pluris fortasse sit, quam deceat, accipiens potius, atque epigenomenon fuisse, quam instans, atque inseparabile symptoma; uti esse let in aphthis veris, et hodiernis, quæ præterea non ita cito occidunt, nec ita celeriter sua tempore percurrunt.

a) Coac. 276. Praenot. 131. Epid. l. 6. sect. 7. b) De diff. et sign. acut. morb. l. 1. cap. 9. c) Tetrabibl. 2. m. 4. cap. XLVI. de crustos. et pestilent. tonsillar. ulcerib.

HOME Princip. med. l. 2. Part. 3. sect. 4. MEAD. l. c., VIETEN. in Boerhaav. §. 816. n. 2., multique alii ex, qui ante hos de morbo isto mentionem fecerunt. De cognosc. et curand. praecip. h. c. affect. cl. I. §. 184. r. *). f) L. c. g) L. c.

§. CCCC.

Atqui dimissa hujusmodi qualicunque de morbi tiquitate (§. CCCXCIX.) disputatione, neque utili, que necessaria; illud vere certissimum est, eum non ante annum 1620. *) accuratissime descriptum

A a 2

fuisse.

fuisse. Cum enim Neapoli tunc epidemice delevierit, et totam Italiam, atque Hispaniam perverit, magnam ubique cladem inferens, continuo in lucem editae fuerunt multorum de ea liberationes, inter quas prae ceteris celebrantur ^{jo.} ANT. FOGLIA commentarius *de anginosa passione*), ^{jo.} ANDREAE SGAMBATI opusculum *de pestilenti faucium affectu Neapoli faciente b)*, et M. A. SEVERINI *de pestilente, et praefecante pueros ab affectu*. Nostra denique aetate, postquam dira haec calamitas aliquot annos ^{d)} Belgium, Galliam, Angliamque afflixit, ita medicorum observationibus illustrata est, ut hodie non desit absolutissima ejus historia apud ^{jo.} FOTHERGILLIUM ^{e)}, RABOVSIVM ^{f)}, BOVLLANDIVM ^{g)} **), MARTEAUX ^{h)}, RAVELLINIVM ⁱ⁾, HUXHAMIVM ^{l)}, BOUCHERVM ^{m)} aliosque nec paucos, nec incelebres.

*) RENATVS tamen MOREAU epist. LXXXI. *intercept. Medic.* THOMAE BARTHOLINI *cent. I.* testatur a ^{jo.} WIZO in libro *observation. rarior.* describi quandam *anginam* epidemicam, quae annis 1564. et 1565. per internecionem Germaniam vagata est. Prodiit etiam Compluti ann. 1611. *Disputatio medica* IO. ALPHONSI DE FONTECHA *de angina, et garrasillo*; itemque Mattiti eodem anno FRANCISCI PEREZII liber *De affectione puerorum etc.* Sed, ut diximus, ab anno 1620. et descripta diligentius est, et multo generalius cognita.

a) Neapoli 1620. b) Ibid. anno eod. c) Ibid. *Ann.* 1739. 1742. 1746. 1747. et 1748. e) *Lamb.* 1748. 4. et 1751. f) *De ulcere tonsillarum* 1749. *Thes. medic.* ann. 1750.

**) Anno 1752. grassatum est hoc malum in Valle Sarmia apud Heluetos, HALLERO, et ZIMMERMANNIO ^{ib.} bus. LANGHANS *Act. Heluetic.* T. 2.

h) *Journal de médecine.* Mars 1756. i) Ibid. et *L. de la maladie occasionnée par les prompts et fréquents variations de l'air chap. XIII. Maux de gorge epid. an. 1748. et 1749. p. 242.* l) *Journal de Méd.* 1757. m) *Journal de Méd.* T. VIII. p. 556.

§. CCCCI.

En autem ejus historiam: Repente utplurimum *Descriptio.* accedit faucium dolor, calorque acer cum difficili salivae, aliarumque rerum deglutitione. Inspectae interiores partes ruborem erysipelatodem, qualis in carbunculo, cernitur, velum palatinum, uvulam, tonsillas, et pharyngem occupantem exhibent. Vaula plerumque tumida, et elongata est. Tonsillarum alterutra, quandoque etiam utraque tumet, et cito macula alba aphthae simili, vel liuida, vel nigra, gangraenae, atque vlcis futuri indice, circa medium notatur. Macula breui dilatatur, et totam amygdalae faciem complectitur. Tunc dolor jam minuitur, et deglutitio redditur facilior. Decidente vero, aut detracta prima hujusmodi quasi eschara, quod interdum accidit, mox altera succrescit, altiusque penetrat. Os tetrum spirat odorem, quod in alios contagium traducitur. Accedit grauedo; sanguis e naribus non raro erumpit; vlcis sanies in laryngem depluit; tussim clangosam excitat, respirationemque morbo ad laryngem, et tracheam protenso, primum ingruente somno intercipit; mox somnum jam captum repente ejulatu, aut choncho edito interrumpit; deinde etiam in vigiliante difficilem, et stentorofam reddit; sicque intra paucos dies, quasi laqueo compresso spiritu miserrime strangulat, gangraena videlicet jam ad tracheam, pulmonesque diffusa, imo ad pharyngem, quandoque ad oesophagum, et ventriculum etiam; quod tamen postremum rarissimum est.

§. CCCCH.

Febris modo paullo ante, quam fauces doleant, *Febris varia.* inuadit; modo eodem tempore, quo angina incipit. Quandoque primis duobus, vel tribus diebus valde mitis apparet, at circa quartum inualescit, ve-

Pulsus qualis.

hementiorque fit. Quandoque statim ab initio hemens est, sed non diu in eodem statu persistit, breuique ad mediocritatem inclinat. Pulsus etrumque debilis, celer, ac frequens; raro magnus, validus, et durus; et quando talis est, breui in laetitia, gaudam, mollem, et paruum mutatur. Ab horripilatione autem, aut frigore, aut tremore exorditur accessio febrilis, postea calor vrens subsequitur. Vesperis, et nocte omnia ingrauescunt; mane leui manante sudore plerumque deferuescunt, et mitigantur.

Vesperis exacerbatio, mane remissio.

§. CCCCH.

Reliqua symptomata.

Initio saepe caput, et collum dolent, interdum cum vertigine, et sopore, dorsi, artuumque fractione, pondere ad cordis scrobiculum, et crebris suspiriis. Non nullis facies tumet, rubetque; oculi illacrymant, et sanguine suffunduntur; aliis contra vultus pallét, aut siliet, idque praesertim evenit, cum teterrimus foetor oris gangraenam iam inchoasse demonstrat. Nausea non raro, vomitus, et diarrhoea putrida se mutuo excipiunt. Linguae plerumque crasso, albo muco contegitur; et quamvis mollis, et humida videatur, summa tamen siti, ANATHEO observante, aegri torrentur: sed hoc perpetuum minime est, nam saepe eos non sitire alii asseuerant. Urinae primum crudae, et aquosae progressu deinde flavae, et croceae redduntur. Plerosque angor quidam inexplicabilis, anxietas, inquietas, mentisque perturbatio, imo delirium exigit, et virium languor, et dejectio opprimit. Sanguis etiam ex vena missus, ut plurimum rutilus valde, et coccineus, vix concrevit, magna feri copia effluens, ac liquefcens. Interdum tamen crustam inflammatoriam ostendit, in primis si inchoante morbo protinus detractus fuerit: verum eius crassamentum

Sanguis etiam ex vena extrahitur qualis.

mentum vix cohaeret, nigricareque tunc solet, et facile dissoluitur.

§. CCCCIV.

Nec rarum est, in hujusmodi morbo, praesertim *Ruber circa collum et pectus.* cum epidemice diffunditur, circa collum, pectus, et brachia erumpere ruborem quemdam erysipelatodem, saepe cum papulis morbillosis conjunctum, aut exanthemata miliaria, papulaeque rubras in summam cutim alicubi prodire; quin imo parotides ipsas, glandulasque maxillares, jugularesque tumesceri, ac dolere. In quibusdam etiam constitutionibus gangraena, ulcusque ab amygdalis ad columellam exporrigi, eamque exedere, et quasi depasci visa est. *Exanthemata miliaria.* Nec parit interdum velo palatino, pharyngi, oesophago, et ventriculo, ut jam notauimus, depluens tabum. In aliis vero lingua, gingivae, dentiumque alveoli, unde dentes caries, nigerque color contaminat, simili labe inficiuntur: quod etsi rarum credimus, ab ARETAEO tamen memoriae, ut supra jam innui, proditum est. Imo *Gangraenae diffusio ad partes interdam diffusas.* non nunquam vis morbi ad nares ipsas adscendit, copiosumque muci fluxum ex his elicit. *Nec ore contentae immunes.*

§. CCCC.V.

Deglutitionem, potissimum initio, laedi, supra narraulmus. Hinc aegrotantes, in primis pueri, *Cur aegri potum vitent, et per nares reddant.* dolorem, quem in deglutiendo incurrunt, veriti vel a potu abstinere, vel, si aliquid bibunt, illud per nares plerumque restituunt. At fere commune est, *Quando dolor evanescat.* gangraena oboriente dolorem mitigari, imo, ea perfecta, evanescere ob scilicet deletum partium sensum, et viam potui, et cibo liberam reddi. Vox *Vox rauca.* omnibus rauca est, atque obscura. Cum vero ad *Quid evanescat larynge occupata.* laryngem morbi vis descendit, respirationemque prope intercludit (nam glottidis rimula facile ob-

struitur), aegri, non modo dum aërem inspirant, expirantque, peculiarem strepitum, et sibilum edunt, arctati itineris signum, verum etiam vix cumbere possunt. Quamobrem, pueri praesertim, e lectulo surgunt, rectique aut stant, aut sedent, et spiritum hauriant; sed mox ob virium defectum, aut languorem iterum se demittunt, et sic irrequieti assidue jactantur, donec penitus prostrati jaceant, et strangulati pereant. Id autem eodem ipso die evenit, quoq; larynx, et trachea laborare manifeste coepit. Quibus vero feliciori fato evadere contigit, hi profecto mitiorem morbum experti sunt, et vigente naturae robore adiuti se a venenato fonte expediunt facili, et laudabili nata suppuratione, aut leni, continuataque salivae, sudorisque excretionem. Ceterum magis pueri, et puellae ante pubertatis tempus hoc morbo tentari, periclitarique consueverunt, quam puberes, et adulti: quamquam certum, indubiumque est, nullam plane aetatem, nullumque temperamentum ab eo immune existere. Ceteris vero omnibus in eum procliviores sunt infirmi, atque imbecilli, aut cacochymici.

*Quinam
servantur?*

*Quibus fa-
miliarior
morbus?*

§. CCCCVI.

Prognosis. Fallacissima saepe est morbi facies, ita ut, qui eum alias non viderit, facile sibi blandiatur, spernereque alat proximae sanationis. Accitus ad nobilem, et unicuique familiae amplissimae heredem, puerum septennem, angina hac laborantem primis jam morbi diebus vir longa experientia probatus, idemque medicus, et chirurgus celebratissimus, non solum eachinno quasi excepit juvenem medicum, qui recte de morbi natura, et discrimine iudicium tulit; verum etiam tonsillarum, in quibus alba macula cum doloris, et difficultatis vorandi imminutione exorta erat, scarificationem a juvene medico, qui morbum

orbem cognoverat, propositam aspernatus est, neglexit, vti superuacuum. At biduo post, mor- laryngem pene strangulante, et facie in lividam, daericamque mutata, vehementer obstupuit, ortem sine ulla spe reliqua appropinquare. Tunc i novitate, vt a fulmine, percussus juvenem illum edicum humaniter, et blande, sed clam domesti- is omnes, rogavit, vt auctores, qui de tam per- cioso anginae genere memorarunt, sibi indicare llet. Decipere ergo vel expertissimos potest ras, fallaxque morbus. Dies criticos nec servat, e crisin certam habet. Finitur vt plurimum *Finis com- munior.* tra secundum, et septimum diem. Tumor, et *Quae bene ominantur.* bor exterior, progressu abortus plerumque bene ninatur. Caloris mitigatio, exscretio copiosa, ulorum nitore spem faciunt; et contra. Diar- *Signa mala.* roea, rigor, pulsus debilis, et parvus, virium rostratio, deliquia, facies oedematosa, cadaueris milis, exanthematum liuescens color, aut recessus, emorrhagiae immodicae mortem portendunt. vlcerebus vero, quae alba sunt, tutiora; cinerea, *Vlcerum aestimatio.* jora; livida vero, et nigra, omnium pessima a). orbo ad salutem vergente evanescit exterior *Solutio.* mor, et rubor, cuticula desquamatur, febris cedit, vlcera sanantur *).

a) HOMIUS *Princip. med. l. 2. P. 3. sect. IV. ang. maligna.* 6. 8. 9.

*) Praeter scriptores, quos supra allegavi, legi debent quae de hoc morbo in Diario Medico VANDERMONDII VII. p. 241. et seqq.) cumulativissime scripta ab HUXHABO habentur.

§. CCCCVII.

Ex his, quae hactenus exposita sunt, rite consi- *Causae.* ratis erui posse videtur, causam proximam in pe- *Proximas.* liari, malignoque erysipelatis genere faucium, et asillarum, quod ab acri, vrentique principio indu- citur,

Putridum, et necroticum principium. citur, sitam, positamque esse. Id vero acre, in putridum, necroticumque principium vel sponte in corpore gignitur, atque euoluitur, impetum fauces, et propiora loca, aut febrili motu genum extricatumque in iis deponitur; vel contagio recipitur, aut ex infectis in sanos tradocitur.

Contagiosum. Contagiosum enim esse, celeris per expirationem, halitum, vaporem, aut stillantem ex ore

Causae remotae. saniem communicatio declarat. Remotiores vero causae vulgo habentur pleraeque earum, quae aliorum putrium, et malignorum morborum, ut aër calidus, et humidus, aut praeter morem fixus, regio palustris; aquae turbidae, et coenosae potus, liquores fermentati; herbae, semina, atque olea corrupta, acria; alimenta quaecunque alkalescentia aut acida, aut austera deuorata; putridae, et caeterae verosae exhalationes; habitus corporis molli, et laxus, leucophlegmaticus, cacoehymicus, scorbuticus, rhachiticus, strumofus; tempestas autumnalis, aut verna calorem insolitum subsequens; aëris peculiaris constitutio; et fortasse, epidemiarum miasma.

§. CCCCVIII.

Distinguenda est ab angina putrida symptomatologica. Atque haec de angina quidem gangraenosa prima maria intelligantur velim. Nam ea, quae febre putridis, aliisque morbis malignis superuenit, quaeque putrida vocatur a F. PENROSIO a), aliter videtur, ni fallimur, a gangraenosa haecenus distincta distinguenda omnino esse. Discrimen autem

Quomodo differant inter se. quod inter utramque intercedit, eodem PENROSIO iudice, est huiusmodi: In gangraenosa amygdalae et columella tument quidem, atque inflammatae non tamen valde turgent, nec tenduntur, sed flaccido potius tumore, minime duro afficiuntur. Color subito in cinereum, et liuidum mutatur, pulsus, et vrina plerumque parum, aut non valde

inis recedunt (paucis casibus exceptis, in quibus ebris, ut supra demonstraui, aliquanto primis diebus vehementior est), dolorque citissime cessat, aut etiam abest. Et quod praecipuum est, morbus quasi repente corripit, et celerrime occidit. Contra *angina putrida* febris putridae, aliisque congeneribus morbis lento prorsus gradu superuenit, et non ita celeriter, sed post multos ut plurimum dies tantummodo affert exitium. Plerumque ulcerosa malis, aut aphthosa haec esse videtur, quam vere angraenosa *), qualem nos memorauimus.

a) *A Dissert. on the inflammatory, gangrenous, and putrid sore Throat also on the putrid fever together with their diagnostics, and method of cure. Oxford. 1766. Vid. Comm. ips. Vol. XV. p. 338.*

*) Hujus prope generis fuisse existimo, quam obseruaui ann. 1748. et 1749. RAVLLINIVS (l. c.) itemque illum, quam anno 1749. in quodam Orphanotrophio videre contigit LASSONNIO (*Mém. de la Soc. Roy. de médéc. T. I. p. 97.*). Haec enim superueniebat febris gastrico-putridae malignae a putrido mialmate ex male humatis boum, et accarum cadaueribus emanante genitae. Erat autem angina symptomatrica, putrida, et aphthosa.

§. CCCCIX.

Ab *angina* pariter *gangraenosa*, quam explicamus, *Quibus notis angina inflammatoria*, ut supra (§. CCCXCVIII.) indicatum *haec differat ab inflammatoria in gangraenam desinente.* est, differre credimus: 1. quod haec rarissime, et a morbo tantummodo ad summum inflammationis ultigium euecto, ut jam dixi, in gangraenam denit; 2. quod color ruber ad liuidum, et fuscum, non ad cinereum, et album vergit; et demum 3. quod febris acuta, et vehemens ipsam comitatur cum pulsu magno, vehementi, duro, et sanguine in concrescendum paratissimo, aliisque symptomatibus diathesi inflammatoriam denotantibus. At contra *angina gangraenosa maligna* in plerisque, quos eodem tempore inuadit, initio fere ipso gangraenae indicia

*Ab aphthis
quoque dif-
fer.*

indicia praemonstrat; tumor erysipelatodes potius est, quam phlegmonodes; et in vicus foetidum, aut cinerea eschara, siue crassa obductum eorum vertitur; fauces, et amygdalas fere semper prius occupat; sanguis tenuior, et solutior est, febrisque pulsu debili, aut certe nec duro, nec valido, virium lapsu, vomitu, diarrhoea colliquante, et letitida, atque subdelirio comitatur. Prior robustos, et viros; posterior debiles, et pueros, imo infantes magis infectatur. Gangraenosa demum cum aphthis nequaquam confundi debet. Hae enim primum linguam, labia, palatum, deinde fauces pustulis exiguis afficiunt, et plerumque sine febre, nisi symptomaticae fuerint *). Angina vero, de qua loquimur, fauces primum, et plerumque solas adurit, et pustula, siue macula alba, aut cinerea, lata, et gangraenosa cito alterutram, vel utramque tonsillam foedat, et depascit, neque unquam febris ab ea abest.

*) Aphthae hodiernae non videntur differre ab illis, quae A. C. CELSVS (l. 6. c. XI.) descripsit his verbis: *Ulcera longe periculossima sunt ulcera, quae a pharynge Graeco appellantur; sed in pueris. Hos enim saepe consumunt. In viris, et mulieribus idem periculum non est. Haec ulcera a gingivis incipiunt; deinde palatum, totumque os occupant; ita ad unam, faucesque descendunt: quibus obsessis, non facile, ut puer convalescat; ac miserius etiam est, si letens alius infans est etc.*

§. CCCCX.

Indicationes. Hinc, cum morbus saepissime, praecipue infantibus, et pueris exitio sit, et celerrime decurrat, quae primum eo intendi omnes nervi debent, ut primus, septicusque fomes, quoad fieri potest, tempore exeat, corruptioni, et gangraenae obstat, viresque vitae sustineantur. *Experientia docet, largam, aut repetitam sanguinis missionem non modo plurimum nocere, verum etiam perniciosiorem ipsam acco-*

*Monita de
venae se-
ctione.*

accelerare. Quare plerique, ut noxiam, hic ex-
 re eam jubent. Initio tamen, et nondum necro-
 exorta, viribus valentibus, aetate florente, bono,
 ethoricoque corporis habitu, faucibus valde tu-
 lentibus; et acriter dolentibus, parce, prudenter,
 et caute semel sanguinem detrahi non penitus ve-
 tum est; imo tum necessarium, et proficuum pu-
 tur, si minus per venae incisionem, per cucurbi-
 las saltem, aut hirudines. Alterutro, aut vtro-
 ue artis auxilio me aliquando feliciter usum esse
 profiteor. Contra si hujusmodi condiciones defi-
 ant, a sanguinis missione abstinere omnino ex-
 edit.

§. CCCCXI.

Omniū autem tutissimum, vtilissimumque prae-
 dium, usu ipso comprobatum, emetin esse, om-
 nes fere perhibent. Leni enim vomitu e ventricu-
 o, oesophago, fauciumque glandulis, folliculisque
 quicquid virulenti ibi latitat, citissime excutitur,
 icque magna ex parte morbi fomes detrahitur.
 Ieri igitur debet vomitus protinus ab initio leni
 liquo emetico, uti aqua tepida oleo mixta, oxymel-
 e scillitico, radice ipecacuanhae, aut tartaro eme-
 tico; potuque tepido affatim desuper hausto pro-
 noueri, ut facilius, et promptior materiae morbi-
 ae excretio obtineatur. Ac si semel id non suffi-
 cere videatur, repeti etiam pro re nata poterit, ut
 euacuatione hac morbi vis, quantum per artem li-
 cet, refringatur. Dicitur autem vix potest, quantum
 hac ratione malignitatis, et virulenti amittat malum.
 Non vero catharticos par ratio est: nam humorum
 nimia ad colliquefcendum procliuas immodicis
 aepe euacuationibus occasionem praebet, quin ta-
 men venenatus fomes ex latibulis, in quibus haeret,
 inseditque, exturbetur. Hinc fatius est vel solis
 nematibus aluum sollicitare, quod nemo impro-
 bat,

*Vitissus
emetici.*

*Cathartici
non ita vti-
li.*

*In fine mor-
bi utilis.*

bat, vel lenissimis eccoproticis tantummodo vi-
quam catharsin moliri. Vtilius, ac tutius in fine
morbi alius ducitur, in primis ubi signa gastrice,
atque intestinalis saburrae non defuerint, appe-
tus langueat, venter tumeat, aut febris protrah-
tur. Hac enim via plerumque omnia recrementa,
quae reciduum morbum facere possunt, commo-
dissime excernuntur.

§. CCCCXII.

*Antiphlogi-
stica minus
necessaria,
aut modera-
te adhibenda.*

*Cardiaca, et
antiseptica
magis ido-
nea.*

*His utebatur
Huxhamius
feliciter.*

In antiphlogisticis quoque adhibendis motus ali-
quis esse debet. Timor enim est, ne his mota
salubres naturae, quibus se se ab infenso hos-
te libera-
rare nititur, praepostere inhi-
beantur. Quare fere
prae-
stat vires vitae lenibus cardiacis sustinere, aut
excitare, et putredinem, necrosinque antiseptici-
simul auertere, aut coercere. Sic natura oppor-
tune recreata, et refecta feliciter acerrimi, morti-
ferique humoris consequitur expulsionem, nempe
vel erysipelatis exterioris, vel papularum miliarium
specie, quae secundo, aut tertio die in aliquibus
prodeunt, vel sudoris, vel blandae exspirationis
ope, uti HUXHAMIVS se observasse pluries affirmat.
Is autem in hunc finem utebatur mixtura quaedam
cardiaca, et diaphoretica ex sale volatili, cornu cer-
vi, et succo mali medici composita, et aqua alexi-
teria simplici dilutis; vel julapio camphorato, et
similibus.

§. CCCCXIII.

*Acida vege-
tabilia pro-
ficua.*

*Antiseptica
alia.*

Generatim acida ex vegetabilibus, uti acetum,
succus mali citrei, aurantii, medici, fructuum ber-
beris, rubi idaei, ribesiorum, aqua diluta, appo-
vbertim sumta commendantur, ut acrimonia puri-
da, et nimia ad alkalescendum humorum propen-
sio temperetur, et cohibeatur. Camphora quo-
que, scordium, chamaemelum, ruta, contrayerva
corru-

ruptionem arcent, vitaeque vires erigunt, ut orbum subigere possint. Hoc vero nomine ce-
 is omnibus praestat cortex peruianus cito; et *Cortex pe-
 ruianus om-
 nium effi-
 cacissimus.*
 quibus interuallis liberaliter datus, quo vno non
 modo in hoc pessimo anginae genere, verum etiam
 quouis erysipelate maligno hodie non pauci con-
 unt magis, quam in reliquis omnibus. At ubi *Quando aci-
 dis fortiori-
 bus vti li-
 ceat.*
 sanguis, reliquique humores liquari, ac dissolui
 manifeste occoeperint, ut inde haemorrhagiae, al-
 ique profluvia cum summo vitae periculo orian-
 tur, illis acida fortiora, ut spiritum vitrioli, sul-
 uris, aut nitri adjicere etiam oportet.

§. CCCCXIV.

Sed cura simul faucium, et tonsillarum habenda est. *An garga-
 rizando?*
 PRINGLIUS in vniuersum gargarismatum
 um, praesertim acidorum, reprobatur. Timet enim *Pringlii o-
 pinio.*
 iuae fluxum, qui utilis esse consuevit, per illa
 hiberi. Decoctum tamen caricarum ex hydro-
 la paratum, cui aliquid spiritus salis ammoniaci
 iectum sit, concedit, et magni aestimat a). Hoc
 iuam attenuari, digerique, et glandulas ad ejus
 retentionem, excretionemque allici arbitratur.
 qui HOMIUS gargarizandum esse consulit ex iis, *Gargari-
 smata magis
 idonea.*
 ae leniter reprimunt, et discutunt, cujusmodi
 ut quae ex diluto rosarum rubrarum, et pauco
 cito, aut vini rubri austeri pauxillo compo-
 nuntur b). Neque ab his ego valde absum, cum
 tio, maculis, siue pustulis nondum in faucibus
 ortis, aut vix apparere incipientibus, mature
 fluendas saepius, et leniter fauces jubere sim-
 itus aquis scordii, sambuci, et chamaemeli, ad-
 is spiritus salis probe edulcati guttis aliquot,
 mellis simplicis, aut oxymellis, aut diamororum
 ut illo. Interea suadeo etiam, ut subinde ad-
 rem, vrentemque dolorem, si quis est, mitigan-
 tem lacte, aqua florum sambuci diluto, utantur.

a) Ma-

a) *Malatt. delle Armat. P. 3. cap. 2. §. 3. p. 104* & *Neapol.* b) *Princip. medic. l. 2. P. 3. sect. IV. §. II.*

§. CCCCXV.

*Quando de-
bergensibus
viti liceat.*

Pustula autem alba, aut cinerea; crassa, aut melleo late tonsillas obtegere incipiente, doloreque tunc imminuto, aut evanescente, valentius detergendum esse docent plerique, melle nimirum scilicet, tinctura myrrhae, aut aloës, aqua cakis, decocto caricarum, lenticulae, aliisque hujus generis. Quo in casu ego equidem spiritum vitrioli exceptum ceteris antepono. Eo enim penicilli pluries in die crustosae pustulae, siue maculae applicito, non solum hujus progressio sisti solet, verum etiam escharae necroticae separatio celeriter perficitur. Simul ac vero, crusta ablata, vlcus deterfum, parum, et rubrum intueor, tunc sol melle ex rosis, aut tinctura myrrhae syrupo e rosis ficcis temperata bis, vel ter in die illud illinire euro. Quod si idem vlcus jam deterfum, et parum ruborem circum ostendat insignem, acriusque doleat, tum ab omnibus, quae irritant, abstinendum puto, solis contentus gargarismatibus, quae demulcent, et temperant, vti lacte aquae hordeiadmixto, aut aqua ex seminibus mali cotonei, vt vocant, emulsa; ex quibus fauces saepe, et blande coldae sunt.

§. CCCCXVI.

*Curatio
Swietenio
vitiata.*

Cl. SWIETENIVS, quando pustulae gangraenae rubor quidam circum diffusus apparet, se scilicet gargarisma adhibuisse ait a), quod consistit spiritu sulphuris per campanam multa aqua, et ex rosb baccarum sambuci. Cum vero fœtus jam ex ore halitus emanat, et gangraena profundius locum exedere videtur, mox illiniendas partes jubet mixtura, quae habet mellis rosacei vnciarum

nam; et spiritus salis marini guttas triginta, aut quadraginta; sicque eito fisti serpens malum vidit. Mixturam ceteris praefert *RAVLINIVS*, quae recipit aquam rosarum cum aliquot salis saturni granis *b)*. Hac saepius in die gargarizandum, aut tingenda vlcera esse praecipit, neque aliis opus esse medicamentis opinatur. Sic quippe ea imminui, nutriri, et sanescere, etiam ubi reliqua gargarismata irrita fuerint, confirmante id quoque *BOUCHERO c)*, dicuntur. Is enim narrat, se mirabiles semper effectus ex plantaginis viciis duabus, et salis saturni granis viginti ad gargarizandum usurpatis retulisse. Similes plane effectus ab *aqua vegeto-minerali*, vel ab *extracto saturni GOVLARDII* sibi pollicentur alii.

*Raulinii
gargarisma.*

a) In *BOERH. §. 811.* *b)* *Des malad. occasionées etc. chap. XIII. p. 261.* *c)* *Journal de Médec. vol. 8. pag. 556.*

§. CCCCXVII.

Alkali quoque volatile, tamquam antisepticum, antinecroticumque summum; hic celebratum video post *FRINGLIUM* a *Cl. MAIAVLTIO a)*; neque multum interest, e regno vegetabili, an animali id elicitum sit. *MAIAVLTIVS* usus est alkali volatili e raphano rusticano educto, et in gargarismatis modum sic redacto: *Rec. aqu. commun. unc. vj., spirit. vini unc. ij., spiritus raphani rustican. unc. ij., mellis rosat. unc. j. ss. m.* Colluenda leniter ex hoc liquore gangraenosa loca iussit, et vaporem ejus assidue inhalandum. Hac ratione post horas triginta sex gangraena amygdalas occupans non modo substitit, verum etiam leui circum exorta inflammatione pars emortua abscessit, aegrotansque intra novem dies perfecte conualuit. Monet vero apposite Auctor, omittendum esse alkali volatile, simulac quidquid corruptum erat, exciderit. Valentius ta-

*Alkali vola-
tilis mira-
vis antise-
ptica.*

men agere videtur spiritus salis ammoniaci volatilis. Hujus in calidam instillati vapor erumpens, si ore attrahatur, non solum tonsillarum, et fauces gangraenae curandae est peridoneus, sed ejusdem quoque ad laryngem processum anteuertit; imo, ea jam descendere in vias spiritus coeperit, vnicuique in quo spes aliqua relinquatur, auxilium, et quidem praesentissimum nobis largitur.

a) *Journal de Méd. T. V. p. 25. In illos 1756.*

§. CCCCXVIII.

** Meadii
optima cura-
tio.*

*Defenditur
contra Lien-
taudium.*

At aliam Cl. R. MEADIVS proponit curationem. Detracto primum sanguine, et clystere aluo laxata, tonsillas gangraenosa macula correptas tribus, vel quatuor vulnusculis satis profundis incidendas, et deinde melle rosaceo inungendas, atque hordei, et ficorum decocto eluendas, abstergendasque saepius esse, feliciter a) expertus, commendat. Neque LIEVTAVDII, qui ejusmodi chirurgiam infausam fuisse b) scribit, auctoritatem tantum tribuendum est, ut id genus auxilii statim et inutile, aut noxium rejiciatur. Fortasse enim, quam par esset, adhibitum optato effectu caruit, vel noxium euasit culpa ejus, qui scarificationem instituit: nam inepto instrumento adhibito, vel imprudentius scalpello adacto non nunquam nocuisse, fateor, potuit. Ceterum MEADIVS ipse opportunissime animaduertit, scarificationes istas protinus ab initio, nimirum nondum necrotico tabo absorpto, aut nondum ad laryngem protenso, fieri oportere; post biduum enim, aut triduum adeo alba gangraena inualefcit, spiritumque intercludit, exitum nulla tunc arte vitari possit. Testor, praescriptas a me felici euentu in quadam epidemica anginae gangraenosae constitutione hujusmodi incisiones esse. Vtinam licuisset iis semper

vti in pueris, et infantibus, qui difficillime induci ad eas subeundas solent; nam maiorem eorum partem seruare potuissem!

a) L. c. cap. 2. de morb. cap. 4. p. 53. b) *Précis de Médec. l. 2. p. 521.*

§. CCCCXIX.

Anginam putridam, quae symptomatice febribus putridis, et mali moris, et variolis, aut morbillis malignis, aliisque exanthematicis morbis interdum superuenit, supra (§. CCCCVIII.) commemorauimus. Haec autem, vt symptoma morbi principis, vix aliam medicinae opem desiderat, quam quae morbo principi conueniens est. Multa tamen, quae intrinsecus, atque extrinsecus hactenus proposuimus, in hac quoque vsui esse poterunt; sed praecipue ratio habenda morbi primarii, a quo bene curato, symptomatum etiam, atque adeo anginae inde pendens maxima pars curationis expectanda est.

Anginae putridae symptomaticae curatio.

§. CCCCXX.

Quod ad regimen attinet, hoc neque nimis ad calidum, neque nimis ad frigidum inclinare debet; alterum enim putredini faueret; alterum morbo ad cutim prodituro impedimento esset. Itaque media via insistere oportet, vt vtrique scopo fiat satis. Aëris quoque renouatio quam maxime curanda est, vt putridi halitus, vaporesque dissipentur. Neque suffumigia praetermitti debent, quibus aëri, qui inhalandus, ducendusque perpetuo est, vis medicata, atque antiseptica impertiatur. Acetum super laminam ferream candentem projectum, vaporem saluberrimum, et non ingratum suppeditat. Camphora item in acetum infusa, leni igne subdito, in halitus sensim resoluitur mirifice antisepticos. Jure tenui e pullis, et ouorum recentissimis vitellis vires suffi-

Regimen dieteticum.

Aëris renouatio.

Suffusio.

Clin.

neantur. Serum quoque lactis vinosum ad idem egregie confert. Nunquam vero quidquam sit cibi, siue potus, siue medicamenti deuoretur, quous, et fauces prius ablutae rite fuerint. Aliis ichor necroticus, putridusque cum iis confusus, et demissus oesophagum, ventriculum, et penitus loca contaminaret.

ANGINA VLCEROSA BENIGNA.

§. CCCCXXI.

Discrimen : Cauendum denique est, ne quoduis pustulae, et
inter gangraenosam vlcis genus tonsillas, faucesque corripens pro
malignam, gangraenosam statim, et maligna angina habeatur.
et ulcerosam Nascuntur ibi quandoque et pustulae, et vlcera,
benignam. quae minime maligna sunt, quaeque non difficulter
 remediis obtemperant, neque exitiosa facile euadunt: quod iam memoriae tradidit ARETAEVS ipse. Ab his maligna differunt, quod lata, caua, pinguis, fordida, alba, cinerea, aut liuida, nigra, atque altius, et citius descendunt apparent. Hinc et, et vere monet SWIETENIUS a), esse anginae speciem quandam gangraenosae affinem, sed benignam, palatum, vuulam, et tonsillas infestantem, saepe a se visam, quae facile depellitur, quamquam acriter partes illae doleant. Haec medico clinico diligenter medicinam facienti rara non est. Praecedit febris non magna, interdum acutior, et ephemerae similis breui euanescens. Tum primum dolor fauces alicubi aggreditur. His inspectis, miculas, siue pustulae quaedam albae, sed exiguae connotantur, quarum limites circum rubent, et dolent acerbè; at neque crassae valde sunt, neque loca circumposita magnopere tument. Si tamen negligantur, dilatantur ipsae, proserpunt, et vicinas partes roduunt, excuantque, neque foetoris expertes omnino esse

esse solent. Nec desunt exempla funestiora, in quibus ad tracheam, et pulmonem vis morbi penetravit pessimo euentu *).

a) L. c. § 811.

*) Cuiusmodi fuisse videtur anginae primum genus, quod Cl. GHSIVS epidemicam Cremonae vidit. *Lett. med. Lett. 2. 1749.*

§. CCCCXXII.

Scorbuticis, et cacochymicis huiusmodi malum *Quos, eo quando invadat.* frequens, et familiare est; quandoque etiam epidemice occurrit, verno praesertim tempore, humido, et calido coelo existente. Acris quaedam, *Actiologia.* et subtilis materia e sanguine extricata, aut e primis viis in eum immissa, aut a recrementis expirationis profecta cor, nervosque irritans febrilem primo motum exsuscitat; deinde vi febris ad fauces protruditur, ibique consistit, pustulas leuiore, atque vlcuscula benigniora cum phlogosi efficiens. Sanguine per metastasin sic repurgato, nec amplius cor, arterialisque praeter naturam irritante febris omnino decedit. In hac igitur quoniam acer humor morbum facit, non temere, neque sine urgente dolore, et difficultate deglutiendi sanguinem mitti licet. Tentari prius debent attemperantia; reuellentia; eccoprotica; fomenta; gargarismata anodyna, et demulcentia, et copiosus aquae hordei potus. Si his nec dolor, nec phlogosis, nec febris remittat, sanguis detrahendus quidem est, sed parca, et cauta manu. Pustulis vero, siue aphthis, vlcusculisue ea adhibenda propemodum sunt, quae supra (§. CCCCXIV. et seqq.) accurate exposita fuere. Sin vero haec dolorem exasperent, quemadmodum primo actu fieri solet, poterit is leniri aqua hordei cum lacte remixta, aut succo semperuiui majoris, cui mel, aut syrupus althaeae adiectus sit. *Curatio.*

Deterfa tum fuerint vlcuscula, sensim tum omitti debent detergentia paullo acriora, vt illa con possint *).

*) Ad hanc speciem videtur referenda angina epidemica, quam describit REGNAULTIUS (*Journ. de Méd. T. 57. Juin. 1782. p. 528.*). In ea enim fauces saepe aphthis afficiebantur, et interdum iis non carere vix est inter tracheae tunica, vt ex sectione cadaverum patuit, sed aliquanto magis anomala, et perniciosior illa fuit. Male so rebat sanguinis missionem. Interdum tamen lecta non jugularis, vbi suffocatio imminerebat, morbum vix. Vescantia pariter loco affecto plurimum profuere.

ANGINA TRACHEALIS, SIVE CYNANCHE THE CROUP AB ANGLIS DICTA *).

§. CCCCXXIII.

Est alia anginae species, quae in regionibus humidis, et frigidis frequentissima occurrit, quaeque a Scotis, cum ei maxime obnoxii sint, vernacula lingua *croup*, vel *chock*, vel *stiffing*, id est strangulatus, siue suffocatio nominatur. Infantum, et puerorum fere propria creditur, sed falso, cum adulescentibus etiam corripere interdum obseruata sit; quos tamen minus grauiter ab ea affici, fatendum est, vt animaduertit in epidemica constitutione Cremonensi ann. 1747. et 1748. Cl. MARTINVS GHISLIVS a). Illos vero frequentius infestat. Quo nomine, et strangulationis ratione, et exitii celeritate adeo ad *anginam gangraenosam malignam* accedit, vt pro vna, eademque a quibusdam accepta sit. Sed quo facilius vtriusque differentia discernatur, non alienum erit ejus descriptionem mox in medium proferre. A sede, quam tenet angina haec, reiectis aliis minus aptis nominibus, eam appellandam censui; adjuncta tamen anglica denominatione, vt a ceteris cynanches speciebus, a quibus reapse differt, diuersa esse comperiatur.

*) *Synonyma.*

Suffocasio stridula FR. HOMII, *An Inquiry into the croup* Edimb. 1765. *Asthmatis species*, Anglice *CROUP* dicta, BUCHANII, *Medic. domest.* T. 4. p. 182. edit. Paris. 1778. *Cyananche stridula* WAHLBOMI, *Barartelser till Riksfens ständer* m. 1765. *Angina suffocatoria* ENGSTROEMI, *Barartelser till Riksfens ständer vorand Medicinal etc.* an. 1767. *Angina strangulatoria*, et *morbus strangulatorius* QVORVMDAM. *Angina polyposa*, *sive membranacea* CHRIST. FRID. MICHAELIS, *De Angin. Polyp.* Gotting. 1778. *Alterum anginae epidemicae genus* ann. 1747. et 1748. MARTINI GHISII, *Lett. med.*, lett. 2. Cremon. 1749. *An angina maligna epidemica* MALOVINII? *Mem. de l'Acad. Roy.* 1746.

a) GHISI *Lett. med.* Lett. 2. REGNAULT *Journal de Med.* 57. pag. 527., vbi etiam adulti in hunc morbum incidisse memorantur.

§. CCCCXXIV.

Plerumque epidemice discurrit; non nunquam etiam sporadice, et sparsim infestat. Quoniam vero infantibus, et pueris frequentissime accidit, qua ratione in his praesertim se explicet, desaeuiatque, dicendum erit; nam facile hinc elucescet, quomodo in adultos etiam impetum faciat. Sequar autem cl. CHRIST. FRIDER. MICHAELIVM, qui hujus morbi historiam prae omnibus aliis accuratissime conscripsit a), et opportunissimis animaduersionibus illustravit. Amittunt, inquit ille, infantes, et pueri, quibus morbus imminet, nativam hilaritatem, et consuetam ad jocos, atque alia oblectamenta procliuatatem. Hinc tristes, morosi, difficilesque fiunt, et solito magis incalescunt. Linguam habent albo muco obductam, et quandoque etiam sordibus foedam. Mox dolorem aliquem in trachea accusant, plerumque obtusum, interdum pungentem. Saeppe colli pars anterior, qua dolenti tracheae respondet, tumidior apparet, et pressione, etsi non admodum acutum, doloris tamen sensum aliquem percipit. Facies quoque turgescit, et rubet; sitis

Descriptio.

Quae morbo imminente accidunt.

non exigua est; maxima in fornum propensio, et capitis dolor premit.

a) *De angin. polypof. p. 10. et seqq.*

§. CCCCXXV.

*Morbus jam
praeiens.*

Ad haec morbi praeludia, siue maius initia, accedit cito febris cum pulsu celerrimo, et duro, recedine, tussi breui, et primum semper sicca, Asthicio sanguinis e naribus, aliisque symptomatibus catarrhalibus. Superuenit modo citius, modo ferius spirandi difficultas, initio leuissima, deinde gravissima cum suffocationis periculo. Laesa respirationis, suffocationisque incumbentis nulla manifesta causa se prodit; nam inspectis faucibus nihil praeter naturam inuenitur, nisi quod aliquando paullulum niteant, aut tenaci muco induantur. Cum ista difficili respiratione, plerumque profunda, raro celeri conjungitur sonus quidam peculiaris, qui verbis exprimi apte nequit, sed facillime discernitur ab iis, qui semel eum audiuerint. Si cuiquam voci comparandus is est, nullam ei magis similem inuenies, quam illam ipsam, quam juniores puerinae edunt. In quibusdam sonus iste singulas inspirationes comitatur; in aliis tum solum auditur, cum vel clamant, vel tussunt. Praeter spirandi hanc difficultatem, saepe vomituritio, imo vomitus, quo insignis materiae tenacissimae copia ejicitur, aegrum exercet. Nonnullis tamen vomitus inanis est, nihilque eo expellitur. Compluribus manus, et pedes tumescunt; tonsillae vix unquam, et, si quando parum certe.

§. CCCCXXVI.

Augmentum.

Citissime haec omnia (§. CCCCXXV.) ita inscunt, ferociuntque, ut qui paucis ante horis tantum medicina egere videbatur morbus, jam saepius omnem medendi diligentiam superet. Tanta enim anxietas, et spiritus angustia miseros torquet, ut quo-

momento mors ex suffocatione imminet. Inim illaesa manet deglutiendi facultas, aut si quid titur vnquam, leuissimum id plane est. Vrina, ae clara ante erat, et aquosa, tunc sedimentum bum deponit; et pulsus, qui celeritatem cum ducie, et fortitudine conjungebat, in debilem, molissimum, imo intermittentem commutatur. Inter ec non raro euenit, vt tussi, naturaeque ope non odo copiosissima alba, caseiformis, tepax materies, rum etiam concretiones cauae, tubuliformes, smbraneae, figuram asperae arteriae, ac broniorum perfecte referentes extundantur. Qua ex etione respiratio in primis plurimum subleuari et, et omnia fere in melius mutantur. Imo si ta haec glutinosa materies, siue membraneum ncrementum, vel magna ejus saltem pars ejecta erit, aeger ab orci faucibus continuo eripitur, conualefcit. Sin vero potior adhuc materiae utinosae, et caseo similis, aut membranae tubuliformis portio intus relinquatur, aut, etsi rejecta, o nimis regeneretur, mox omnia ingrauescunt rum, et in pejus ruunt, sic vt, quem seruatum edidisses, morbi vi denuo aeger obrutus extremum fatum experiatur.

*Membranas
tubuliformes
extinguntur.*

*Interdum
regenerantur.*

§. CCCCXXVII.

Animaduertendum quoque est, non raro, et su- Fallax mor-
o praeter rationem, et sine vlla materiae obstruen- bi mitigatio.
excretionem omnia sic in melius verti, vt liberior,
o naturalis omnino respiratio reddatur, et infan-
t, pueriue e lecto surgere, et obambulare possint;
ullo post vero fallaci huic symptomatum quieti
uum repente succedere insultum, saepenumero
grauem, vt eum, qui momento vno, vel altero
us cum sociis ludebat, aut cibum appetitu opti-
sumsit, mors repentina abripiat. Ceterum alii
tione mortis genere, aucta nimirum anxietate, et
B b 5 semper

*Nullus cer-
tus finis ter-
minus.*

semper difficiliore reddita respiratione; tussique cessante, et pulsa intermittente, et tremulo facto pereunt. Sed lentum ejusmodi genus mor-
rarum est. Illud prope perpetuum perhibetur, quod ad extremum usque vitae terminum sensum, rationisque usus perfecte integer servari solet. Nullis certis limitibus, aut diebus morbus addi-
gitur, quibus aeger euadat, aut occumbat. Pri-
mos tertius, vel quartus, imo interdum sextus dies occidit; nec tamen insequentes perire co-
rent; cum ab HALEMIO referatur exemplum, in quo decimus octauus dies lethum attulit. Com-
plures post tertium, aut quartum diem sanati ce-
rantur; sunt tamen qui tardius ad integritatem redeunt. Prouectiores diutius morbum trahunt. Puer duodecim annorum post quinque decem hebdomadas, rejecto tum peregrino corpore seruatus a) fertur, et sartor ille TULPII multo adhuc longius vitam produxit.

a) *Ass. N. C. T. I.*

§. CCCCXXVIII.

Huc usque MICHAELII descriptio tum ex pro-
pria, tum ex aliorum obseruatione diligenter de-
promta. Cumque eidem quam simillima sit illa,
quam inter primos certe, et in Italia fortasse sola
huiusce exitiosissimi morbi epidemice in vrbe Ob-
mona grassati accuratissimus obseruator, MAR-
CVS GHISIVS, jam diu edidit; operae pretium ha-
dixi, italicaeque medicinae hodie apud exteras
juriam despectae perhonorificum, si anginae
historiam jam traditam ejus quoque obserua-
tionibus illustrare non praetermisero; id enim tantu-
mi, fallacissimique morbi cum diagnosin, tum co-
rationem quam maxime adjuuabit. Dabo autem
operam, ut non pluribus, quam ipse auctor, reser-

t. summatim quoad licet, rem comprehendam.
 igitur species anginae, quae annis 1747. et
 8. epidemica apud Cremonenses existit, erat *Descriptio*
 x. et lethifera, quin fauces villo modo laederet, *constitutio-*
 deglutitionem deprauaret. Hinc aliquos in- *nis epidemi-*
 1747-1748. *cae Cremon.*

os homines, et complures pueros, quibus apta
 icina defuit, adoriebatur, et neci dabat. Inso-
 bibendi cupiditas, facies pallida, tussis asper-
 , assidua, et consueti sonitus expers, utpluri-
 ficca; spirandi difficultas; ardor, dolorque
 semper circa laryngem molestus; febris cum
 no interiorum partium, exteriorum vero per-
 io calore conjuncta; pulsus parui, et plerum-
 naequales; magna corporis jactatio; vox clan-
 ; et quandoque respiratio sibilans communia
 t omnibus symptomata; quae breui vehemen-
 facta, citissime eo aegros redigebant, ut pul-
 maxime inaequales, et intermittentes, cutim
 ue aridam, extremaque corporis frigida habeo-
 ; nullo modo decumbere, aut loco conque-
 possent; spiritum aegerrime, et celerrime
 horrendo stertoris perpetui murmure duce-

Ore enim hiante, ceruice tumida, et poste-
 versus retracta, et trachea, in primis ejus ca-
 siue larynge fursum ad maxillam inferiorem
 proxime adducta, et extrorsum anterieus ve-
 ntissime protrusa inspirationem obibant, siue
 idem est, oppido sublimem, ut eam vocauit
 OCRATES, habebant respirationem. Sicque
 rime vexati, alii tertia, aut quarta, alii quinta,
 andoque etiam secunda, aut septima ab angii-
 rincipio die suffocabantur.

§. CCCCXXIX.

issis autem utplurimum ficca (§. CCCCXXVIII.) *De tussis*
 hic dicitur; quia copiosa sputa, quae non *animaduer-*
 nulli *siones.*

nulli excreabant, non ex trachea, aut larynge, ex ipsis faucibus educebantur. Ibi enim lymphae, et mucī vis ex irritatis glandulis, et folliculis mucosis expressa coaceru-

*Sputa quae
sunt.*

Quod si aliquando aliquid tussis ope ex viis respirationis extundebatur, id erat membranae instar, et millimum adamussim concretionibus illis gelatinosis, quae in summo sanguine e vena pleuritica extracto, aut in praecordiis cadauerum sub nomine crustae pleuriticae, aut pseudopolypi reperi solent. Puella sexennis pridie, quam moreretur, cum suffocationis metu eiecit ex larynge nardicum frustum albae, et solidae materiae, quae in mam, et cauum totius tracheae, et bronchiorum

Crisis bona.

apprimere referebat. Reapse, si quis tanto periculo euadebat, is iudicabatur quidem vel multisputo lymphatico, et sanguine tincto, aut sudore et vrina vberim manantibus, aut metastasi ad pulmones: quae, licet in aliis fere mortiferi esse soleat, in hac tamen specie, si septimam diu

*Metastasis
ad pulmones
interdum
utilis.*

raret, in lentam, longamque, sed vtili expectationem desinebat. Nam pure per tussim pulsatim educto, sicque euacuata vomica aeger serubatur et conualescebat. Sed de iis, quae in Crimen illa constitutione contigerunt, iam satis.

§. CCCCXXX.

*Cadauerum
sectiones.*

Supereſt, vt ad complendam morbi hſtoriam eiusque naturam rite cognoscendam, quid eorum eorum, qui inde perierunt, sectiones erint, paucis aperiamus. Exterior corporis qualis in strangulatione peremtis, apparere plerumque liuet, et tumet; oculi prominent sanguine turgent; colli venae inflatae sunt et sanguine quoque anterior ceruix tumida, et bens reperitur. Fauces nulla labe, aut infla-

*Exterior
cadaueris
habitus.*

e contaminantur a), si excipias, quod aliquan- *Fauces fero*
 dulae ad linguae radicem sitae turgescunt, *naturales.*
 rum excretorii ductus aperto, et dilatato ostio
 et b). Magna item mucī vis circa glottidem *Mucus circa*
 na obstruens plerumque offenditur c). Trachea *glottidem.*
 o sub larynge modo vniuersa interiori facie *Trachea*
 extra usque bronchia inflammata d), modo ab *vicia, et*
 ii inflammationis nota immunis e) deprehendi- *nonne.*

Membrana autem tubuliformis, siue concre- *Membrana*
 nembrana interiorē tracheae faciem succin- *tubuliformis.*
 , modo longissima, et ab ipsa larynge ad vlti-
 bronchiorum diuisiones protensa, quae edu-
 ram continentis partis omnino ostendit; modo,
 uidem frequentius, infra laryngem tantum sita, *Ejus vario-*
 nulto breuior; in aliis partium arteriae asperae *tates.*
 ium occupans f); in alijs in media dum-
 t trachea parui concrementi albidī frustum re-
 ns, simillimum illis, quae extussita fuerunt g);
 nonnullis tenuissima; interdum crassissima, vt
 im cauum oppleat; interdum mollis, et facile
 erpenda; aut contra tenax, et glutinosa valde
 irrit. Colore plerumque est albido, et nitido,
 uando rubris maculis variegato, quandoque
 m cineracea, aut nigro. Nullibi adhaerere in- *Nulla ejus*
 ori tracheae tunicae videtur, sic vt pro intima *adhæsio.*
 tunica, quae integra subter inuenitur, haberi
 eat. De ejus structura non conuenit inter ob- *Fabrica.*
 atores. Alii eam ex vasis sanguineis contextam,
 ex fibris longitudinalibus, aut striatis compo-
 dicunt. Verum si rite examinetur, inorgani- *Inorganica*
 dices, ex mucoſo, lymphaticoque humore con- *est.*
 am, non dissimilem polyposis concretionibus,
 ; interdum vel a peripneumonicis excreantur,
 quod omnem membranae verae naturam exclu-
 in aqua cum sapone omnino solubilem. Non
 membrana ista concretio cum aqueo, et spu-
 moso

moso liquore, imo cum aqua quadam coniungitur. In quibusdam etiam glandulae, quae circa *bronchiales* ad horum in pulmones ingressum locantur, utro multae, et praeter modum induratae sunt. *Pulmones* in multis perfecte sani; in aliis sani quidem, sed pleurae adhaerentes, et non nihil infirmi; in aliis multo rubore suffusi, et sanguine completi, aut obscure fusci, maculisque nigris praenotati *h*); quandoque ita rubentes, ut etiam citius inflammati appareant, sed colore valentius, do, qualis erysipelatodes est, nec ab ejusmodi gossi pleura, et diaphragma alicubi, scilicet quomoni gravius inflammato, aut adhaerenti repedent, immunia euadunt *i*). Nec rarum est, pulmones deprehendi materia quadam albida plena, qua omnes bronchiorum rami obstruantur. Haec vero ablata facile etiam aliquid sanguinis pressio exprimitur. In quibusdam etiam pure scateant, aut aëre multo tumidos *l*). Cor, pericardium, *Cor, et praecordia.* diastinum, et thymus plerumque sanissimum, quod vena caua, et dextri sinus atro, et plenus sanguine, aut pseudopolypis saepe scateant, sinistri, et aorta inanes sunt *m*). Nec deest quaedamque in alterutro, aut utroque thoracis cauo aqua effusae modo plus, modo minus *n*). In abdomine omnia juxta naturam. In capite vero tam cutanea, quam piae meningis, et plexus choroidae praeter modum varicosa, ac dilatata, qualia strangulatis esse consueuerunt.

a) GHISI l. c. MICHAEL l. c. a p. 10. ad 22. b) MICHAEL, ibid. c) MICHAEL l. c. d) GHISIVIL MICHAELIVS l. c. e) MICHAELIVS l. c. f) GHISIVIL g) GHISIVS l. c. h) MICHAEL l. c. i) GHISIVIL j) MICHAEL l. c. m) GHISIVS l. c. n) MICHAEL l. c.

§. CCCCXXXI.

Sedes, et natura morbi.

Ex iis igitur, quae in historia morbi expositae sunt, et deinde ex his, quae in cadaueribus defunctorum

stome detexit, satis colligi licet, morbi sedem in
 era arteria perstringi, atque adeo anginam esse
 chealem, siue cynanchen, modo phlegmonodem,
 ido, et fortasse frequentius, erysipelatodem, mo-
 catarrhalem tantummodo; ejus praecipua, et *Signa dia-*
 opria symptomata efficiunt febris, dolor, aut ar- *gnostica.*
 r in ipsa trachea; tussis primum sicca, consueti-
 ritus expers; vox rauca, stridula, aut clangosa;
 piratio strepens, et cum sibilo voci juniorum gal-
 arum simili; vehemens laryngis eleuatio, et faei-
 citusque ad suffocationem lethalem transitus; et
 num, quod peculiare ejus est, mucosa, lymphati-
 que concretio tracheam, et bronchia obstruens,
 saepe sub membranarum tubuliformium forma
 tussim ejecta. Hanc vero membraneam con-
 tionem verosimilius esse, partim ex copioso, den-
 ue muco, quem glandulae, siue folliculi trachea-
 eructant, partim ex tenui lymphatico humore,
 re extrema arteriarum exhalant, aut arteriarum
 organici meatus exsulant, coacto, et concreto
 flari, cauearumque, et canalium, in quibus con-
 itur, formam recipere, et exhibere a).

GHISI l. c.

§. CCCCXXXII.

Perpicuum etiam videtur, non vnam ejus esse *Multiplen*
 iram, sed variam, prout temperamentum, ha- *ejus natura.*
 s corporis, aetas, sexus, anni tempus, tempe-
 um constitutiones, aeris ratio, aliasque causae
 cedentes, aut procatacticae variantur; nec
 m signum pathognomonicum existere, ex quo *Nullum si-*
 um dignoscatur, sed symptomatum praecipuo- *gnum patho-*
 syndrome, et concursu ejus diagnosin a) in- *gnomonicum.*
 oportere. Dissimulandum tamen non est, fa- *Confundi*
 anginam hanc cum aliis oongeneribus morbis *potest cum*
 undi posse, videlicet cum angina tracheali in- *aliis morbis.*
 flamma-

inflammatoria pura (§§. CCCLXXV. CCCLXXVI), cum catarrhali, aut serosa (§. CCCXC.), cum illa quae ab illapsis in laryngem corporibus (§. CCCXII) nascitur, cum catarrho suffocatio et tumentum cum tussi convulsiva *coqueluche* vulgo dicta, affligitur. Verum singula haec mala peculiaribus quibusdam

Discrimen inter hanc, et anginam inflammatoriam puram trachealem. notis discriminantur. Angina inflammatoria trachealis pura non adeo fallax, et subdola est, sed manifeste acutior, et inflammationis verae phaenomenis comitata. Dolorem in larynge, et trachea exhibet acrimonem, et magis molestum; sibilum peculiarem in inspiratione, qualem indicauimus, comitem non habet, neque vocem edit gallinaeae similem, neque frustula membranacea, de quibus mentionem est, et tubuliformes concretiones tussi ejicit.

a) MICHAEL. l. c. b) *Id. ib.* p. 128.

§. CCCXXXIII.

Discrimen quo differt ab angina catarrhali. Distinguitur quoque haec anginae species a catarrhali, siue serosa, quod in hac tument haec glandulae lymphaticae; raucescit quidem, sed non stridet; tussis sonitu consueto non caret; respiratio si quid patitur, nunquam tamen adeo increscit, ut ad suffocationis periculum pertingat, et demum nihil membraneum, aut tubuliforme effusum sit. Ab angina vero, quam illapsa in asperam arteriam corpora inducunt, nostra haec vel ex anamnesi, siue antecedentium commemorata internoscitur. Differt quoque ab asthma comitatu suo, quod in hoc insultus illico grauissimus comitatur, dum in illa a paruis, incertisque principium exorditur; quod peculiaris sibilus, et vociferatio, et stridor abest; aspera arteria nequaquam dolet; statis quibusdam temporibus accessio remittitur; vrina tenuis, et aquosa, et crebra redditur; pulsus paruus, contractus, spasticus, non fletus

fit, neque vlla membranarum rejectio contingit. Similibusque prope notis, et discriminibus a catarrho suffocativo ET TMVLLERI, itemque a tussi ^{A catarrho suffocativo.} ^{A tussi copulsiua.} conuulsiua, eam non arduum est distinguere a), et sic porro.

a) MICHAEL. l. c. p. 122. 123. 126.

§. CCCCXXXIV.

Facilius quis falli potest ab angina hac tracheali ^{Quomodo distinguitur ab angina gangraenosa.} strangulationem afferente, dum strangulationis ratione anginam gangraenosam malignam, quando haec ad laryngem progressa est, quodammodo aenulatur. Verum vtriusque descriptione mutuo collocata, cessabit omne errandi periculum. Consideret is in primis in angina gangraenosa maligna putredinis indicia, oris foetorem teterrimum, nauseam, vomitionem, alui dejectiones, sudoresque foetidissimos, puniceum faucium ruborem, paruas plerumque vel primo, aut altero nychthemero in faucibus exortas pustulas, aut albas, mucosas, cinereas, liuidasque maculas, cito totas tonsillas occupantes, lateque se diffundentes, et escharas induratas, et paullatim deciduas, vlcera subter depaupercentia relinquentes. Nam ex his solis cognoscet, ingens inter vtramque esse discrimen. Praeterea animaduertat, plus deglutitionem, quam respirationem, in gangraenosa angina laedi, tracheam nullo dolore affici, aliam vocis rationem esse, saepe delirium superuenire, et membranas illas tubuliformes non excreari; et, si vnaquam frustula quaelam membranea in angina gangraenosa, aut vlcerosa, vt quandoque incidit; extulsiuntur, vera haec esse membranae frustula, non tamen tubulata, sed in faucibus, pustulisque diuulsa, et decerpta, quae in aqua cum sapone nequaquam soluuntur a).

a) Id. l. c. p. 113.

C u r a t i o .

§. CCCCXXXV.

*Spes omnis
in natura
sanguinis
missione.*

Quoniam morbum adeo fallacem, et adeo precipitem subita, et fere ineuitabilis suffocatio caput, vitamque atroci specie adimit, sic, ut paucissimi feruentur: idcirco si vnquam alibi, hic certe summa celeritate opus est, ut periculum certo imminens, quanta fieri potest cura, auertatur. Si quid igitur spei est, id totum in sanguinis missione initio statim instituta ponitur, utpote quae praeteritum, si in brachio fiat, saepe sola omne malum repellit: Repetique id auxilii genus potest vel in ipsis pueris, quoties pulsus, et cetera indicantia regant (a). Hirudines collo applicitae, et scarificationes sanguinem detrahunt vtiliter, et minus vi-

*Cucurbitula
supra laryn-
gem scarifi-
cata.*

*Pedilunio,
potus sepi-
dus, linctus
oleosus.*

ribus nocent. In Cremonensi epidemica constitutione, ut testatur Cl. GHISIVS (b), nemo euasit, nisi ope citissimae, largae, ac repetitae venae sectionis, et cucurbitulae postea supra laryngem cum scarificatione adhibitae; non omissis interea pedilunio balneis, et paruis, sed crebris haustibus aquae cumdam pectori amicae, et tepidae, et linctu subinde olei amygdalini recentissime sine igne expressi, quo pars posterior asperae arteriae fouetur, humectatur, et emollitur. Hac curandi ratione non solum aliquot pueros, verum etiam non nullos adultos ad quos ingruente morbo statim accitus est, servatos idem ipse vidit. Horum autem alii breui cevaluerunt, multa lymphatica materia, sanguine interea, per tussim rejecta; alii sudoribus toto corpore effusis, et urinae copia; metastasi ad pulmones in lentam, sed vtilem, laudabilemque suppurationem, qualem HIPPOCRATES jam memorant (c), desinente.

*Sputatio, sudor, urinae
copia, meta-
stasis.*

a) MICHAEL. l. c. p. 194. 195. b) L. c. c) Aph. sect. V. 10

§. CCCCXXXVI.

Inter initia laudantur anedyna, et simul diaphoresin promouentia, utpote quae causam tollunt. *In hoc item primo stadio quae conueniant.* Hinc opium, camphora, spiritus Mindereri, et tartarus emeticus exigua, et refracta dosi alterantis in modum a); sed multo magis accommodata, et opportuna, censentur potus saponaceus antiphlogisticus, nitrum, oxymel, atque enemata. *Antiphlogistica.* Nec omit- *Eccoprotica;* tenda eccoprotica, si saburra gastrica, aut serosa colluuius educi, aut reuelli debeat, quo spectant *Emerica sunt.* magnesia alba cum saccharo, pulpa cassiae, electuarium lenitium, manna sero lactis soluta. Non ita tutus emeticorum usus est, et, si vnquam vomitus ciendus videatur, magna id fiat cautione, et prudentia, nam periculum est, ne suffocationem accelleret b). Vesicantia potius circa collum, et ad ejus latera, aut anteriori ceruici, aut etiam posticae ejus parti admota non carent laudatoribus c). *Vesicantia utiliora.* Haec quoque partes oleo, et spiritu salis ammoniaci non sine emolumento inungi posse a quibusdam dicuntur d). *Topica.* Atque haec quidem primo morbi stadio conueniunt. In altero vero, ubi et suffocationis metus est, et magna glutinis, mucosique humoris copia viae aëreae obstruuntur, ad expectorantia, et incidentia properandum est. *Quae in secundo stadio apta sint.* Inter haec primas tenent *Incidentia et expectorantia.* oxymel scilliticum, sulphur antimonii auratum tertiae praecipitationis, gummi ammoniacum, vapor aceti calidus ore hauriendus, et similia. Sed haec omnia non sine delectu, et matura deliberatione in usum vocentur. Si inflammationis verae, aut erysipelatosae symptomata magis vrgeant, mitioribus blandioribusque medicamentis tutius erit uti; sin catarrhalis, pituitosique affectus praevalent, paulo audentius agere, et aliquanto acriora tentare tum licet. *Cautio.* Non desunt qui audeant hic quoque emesin proponere. Sed quantum discriminis ha-

beant emetica in ita proximo suffocationis metu, viderint prudentiores e). In extremo suffocationis periculo sola tracheotomia, reliquis irritis, spem aliquam facit, quamquam non ab omnibus probetur f) *).

a) MICHAEL. l. c. p. 197. b) Id. ib. p. 203. c) Id. p. 207. d) Id. p. 211. e) Id. p. 210. f) Id. p. 217. & 220.

*) Tracheotomiae feliciter institutae in puero haemorrhagiae specie periclitante exemplum mecum communicavit per litteras Londino ad me datas JACOBVS LOCATELVS medicus magnae expectationis, qui eam vidit a celeberrimo Londinensi chirurgo ANDREAE dexterissime adhibitam a hunc modum: Primum sectione longitudinali a glandula thyroide versus sterni apicem producta, et tres circiter digitos latos longa, integumenta diuifit. Trachea deinde solertè detecta, transversim inter secundum, et tertium ejus anulum nectentem membranam dissecauit, et similem aliam incisionem inter quartum, et quintum anulum fecit, sic ut duo annuli inter utramque incisionem transversalem comprehenderentur. Ex his, qua antè spectant, duabus aliis lateralibus sectionibus frustulum quadrangulare exemit. Quo factum est, ut hiatus satis idoneus aëri inspirando, et expirando, tum concretioni membranaceae, quae suffocationem intenrabat, expellendae patulus esset. Ex hoc hiatu continuo prodiit non exigua pars vis, nulla vero membranaceae concretionis pars. Deinde post diebus per se quaedam hujus portio erupit per artificiosum ejusmodi hiarum; sic ut quod intus remanebat, manu deinde extrahi potuerit. Puer autem intra quindecim dies perfecte convaleuit.

ANGINA CONVULSIVA BOERHAAVII,

De cognosc. et curand. morb. §. DCCCXVIII.

§. CCCCXXXVII.

Definitio. Haec est ea faucium, siue laryngis, pharyngisque constrictio, quam earum spasmus efficit. Hinc etiam *spasmodica*, aut, quia mulieribus, ac viris hypochond-

pochondriacis familiaris est, *hysterica*, aut *hypochondriaca* vocitatur.

§. CCCCXXXVIII.

Cognoscitur ex sensu constrictionis, aut globi, *Diagnos.*
aut alius corporis, interdum oblongi, et cylindrici
faucibus infixi, aut ibi haerentis; inflatione, aut ri-
gida tensione vicinarum partium cum aliquo inter-
dum dolore; spirandi, aut deglutiendi difficultate
per intervalla cessante, et redeunte; vocis interce-
ptione; aut aponia; pulsu paruo, duro, debili,
abdito, raro, minime febrili; refrigeratione exter-
narum partium; interdum tremore; borborygmis,
doloribus ventris, aut stomachi; vrinis pallidis,
crebro, et copiose redditis; oscitationibus, pandi-
culationibus, aliisque convulsuarum affectionum
symptomatibus. Antecedunt causae, quae proxi- *Causae.*
me nervos, aut fibras ad laryngem, pharyngemque
spectantes, aut nervorum originem, aut eorum in
imo ventre propagines irritant, vti halitus, vapo-
resque sulphuris, nitri, vitrioli inspirati; acrida vo-
rata, aut comesta; herpetica, arthritica, scabiosa
materies retropulsa; vteri, viscerumque abdomina-
lium, in primis stomachi, vitia; menstrua imminu-
ta, aut suppressa; hypochondriaca affectio; animi
pathemata, et in primis moeror, aut ira compressa,
ac diuturna.

§. CCCCXXXIX.

Plerumque periculo vacat iste morbus, nisi ex *Prognosis.*
vitio aliqua per se graviore oriatur. Sed diuturni-
tate, et pertinacia aegros fatigat, et saepius recur-
rit post breves inducias ex levi quavis causa pro-
catartica. Curatio varia esse debet pro causarum *Curatio.*
evidentium ratione; petique potest ex iis, quae
alibi aduersus nervorum rigorem, distentionemque
commendauimus. Hinc modo aer purus, atque

apertus cum oleosis, et demulcentibus, modo coprotica, modo sanguinis missio, modo anthyrica, et paregorica, modo purificantia, et diaphoretica opportuna sunt. Generatim, ubi ataxia nervorum, hystericaque affectio est, graueolentia naribus, cucurbitulae siccae cruribus, et femoribus admoueri, pedes, et manus in calidam demitti vilius solent; aluiusque enematis blandis laxari. Puellam sensibiliorem, quam anthysterica nihil leuant, postquam horis quadraginta octo nihil deglutire potuerat, extemplo sanauit SWIETENIVS a) cucurbitula sine scarificatione posteriori ceruici affixa. Anginae conuulsivae, quae a primarum viarum coechylia pendebat, profuit emesis, et catharsis b), non facile alias administranda. Aliis nequidquam iuuantibus, raro optato effectu caret epilepticum, aut vesicans occipiti applicitum. Huiusmodi morbum in foeminis etiam exquisitiori sensu praeditis pluries felicissime expugnauit IO. TARGIONI TOZZETTIVS c) in hunc modum: Sanguinem e vena pedis primum detrahendum curabat, deinde cucurbitulas scarificatas scapulis admouebat. Demum, persistente pertinaciter adhuc malo, cantharidibus vesicas amplas utroque in brachio, aut utroque in fura excitabat. His mirum est, quam celeriter angina conuulsiva soluitur.

a) In BOERHAAV. §. 818. b) *Essays de Méd. & Edim.* T. I. p. 277. c) *Osservaz. medic.* p. 113. et seqq.

ANGINA PARALYTICA.

§. CCCCXL.

Quid in angina paralytica laboret. Si muscoli linguae, pharyngis, atque oesophagi motibus inservientes resoluantur, deglutitio laeditur, aut aboletur. Huic morbi generi angina paralytica nomen est. Raro in hac respiratio aliquando patitur.

atitur SWIETENIO iudice, quod muscoli respira- *Deglutitio*
 tioni dicati ad thoracem potius, quam ad fauces, *laeditur.*
 uarum morbus angina est, attinere videntur; nisi
 muscoli scaleni, et spinales colli vna afficiantur.
 Hemiplegiam, paraplegiam, apoplexiam, aliaque *Causae.*
 mala peculiarem quarundam partium paralyfin in-
 lucentia subsequitur haec anginae species.

§. CCCCXLI.

In ea cibi, potus, et saliva deglutita per nares, *Diagnos.*
 ut os refluunt, et quasi resiliunt non siue suffoca-
 tionis periculo. Nullus est in faucibus restrictio-
 nis sensus, nullus tumor interior, aut exterior, fe-
 brisque nulla. Neque quidquam in oesophagum
 lemmittere possunt ea correpti, aut difficulter, et
 ente id faciunt pro maiore, vel minore resolutio-
 nis gradu. Solidiora tamen minus aegre, quam li-
 quida, deglutiuntur. Supini magis laborant, quam
 erecta ceruice. Si parua cerea candela, aut flexilis
 balaenae pinna in fauces indatur, nullo obstaculo
 inuento oesophagum facile peruat, et libere ad
 ventriculum vsque detrudi posset.

§. CCCCXLII.

Id mali etiam a vertebrarum colli luxatione *Interdum fit*
 proficisci, perspectissimum est. Sed tum, si perfecta *ex luxatis*
 luxatio, praesertim in adultis, fuerit, lethalis para- *colli verte-*
 plegia simul adest. Imperfecta igitur luxatio esse
 debet, et quidem introrsum, vt paralytica angina
 oriatur. Vix autem ea locum habet, nisi in supre-
 mis colli vertebris, atque in junioribus, teneriori-
 busque corporibus, quibus vertebrae illae cartilagi-
 nae magis sunt, minusque firmis ligamentis con-
 nectuntur, vt optime animaduertit SWIETENIVS a).
 Huiusmodi luxationem non modo in aphorismis
 HIPPOCRATES b), vbi de juniorum morbis loqui-
 tur,

tur, commemorat, verum etiam in *prorrheticis*, dicit: Qui autem angina laborabant, illorum hae sunt affectiones. Cervicis vertebrae intro vergebant, et quibusdam amplius, quibusdam minus, collumque compunctum intro cavitatem habebat, et hac parte contusum dolebat c). Et quamvis raro iste morbus occurrat, tamen SWIKTENIO contigit semel eum videre in infante decem menses nato, cui caput retro inclinatum erat, guttur prominulum, et manifesta in cervicis tumor apparerat. Infans nihil deglutire poterat. In hoc autem malum inciderat post validas commotiones, a quibus facile in tenello e loco moveri, et de pelli vertebrae colli potuerant, cum ossium luxationes vel in adultis ex hac causa saepe contingere videamus.

a) §. 818. citat. b) Sect. 3. aphor. 26. c) L. I.

§. CCCCXLIII.

Prognosis, et curatio.

Curatio.

Plerumque qui angina paralytica affecti sunt, lenta pedetentim macie conficiuntur, et pereunt. Interdum tamen temporis, naturae, artisque beneficio sanantur. Ex causa vero paralyfin efficiente periculum aut periculum metimur. Curatio autem, si ei locus est, tentanda est iis, quibus reliquas nervorum resolutiones curandas docuimus. Sed quia deglutitio impedita, aut plurimum laesa est, ut bibere, aut comedere aegri nequeant, ali eos oportet vel per fistulam in ventriculum demisso liquidiori alimento, vel enematis, ut vocant, nutrientibus subter injectis, vel fomentis extrinsecus corporis liquoribus alere aptis, ut lacte, vino, jure carnis admotis; nam vasa ubique hiant, quae aliquid forsbeant, et per lymphaticas venas sanguini suppeditent. Balneum etiam ad id accommodatissimum est. In perfecta vertebrarum colli luxatione, in qua spinalis medulla non modo prematur, sed in-

time

ime labefactetur, et simul magnus adsit inflammatio, et febris, nullam superesse spem salutis jam AVLLVS AEGINETA a) docuit. In imperfecta vero, minusque graui tentandam curationem suadet AETIVS cucurbitula circa primas colli vertebrae fixa, et saepius auulsa, eo consilio, vt vertebrae in pristinam sedem restituantur b). Eo etiam spectat, bi lenta vertebrarum luxatio, atque introrsum retrusio facta sit, et omnis inflammatio absit, quod die manu mento, et occipiti supposita, aut apto inculo accommodato iuniores in altum attollere, et suspendere, vt pondere corporis spina in rectum educatur.

a) L. 3. cap. 27. b) Terrab. 2. serm. 4. cap. 47.

ANGINA VALSALVIANA, SIVE AB OSSE HYOIDE LUXATO *).

§. CCCCXLIV.

De ossis hyoidis luxatione, ejusque ad deglutientium impedimento primus omnium VALSALVA a) neminit, deinde PETRVS PAVLLVS MOLINELIVS b), quorum alter vnum, alter duo exempla hujusce morbi in medium protulit, vt nullum de eo superesse dubium possit. Itaque luxatur os hyoides, non vti humerus, vel digitorum phalanges, ut ossa alia, quorum articulos cauum aliquod excipit, e quo, cum luxantur, excidunt: sed ea ferme ratione, qua luxantur ossa cartilaginibus vna conplexa, vt ossa pubis, coccygis, nasi. Tum enim luxari coccyx a chirurgis dicitur, cum ita distorqueatur, distrahiturque, vt manus opera ad eum in suam sedem reducendum opus sit. Idem ferme accidit ossi hyoidi, et speciatim ejus cartilaginibus.

Luxatio ossis hyoidis.

*) Synonyma.

Dysphagia Valsalviana SAVVAGESII Nosok. cl. VII. n. XVII. Ad anginas vero nos id mali referendum duximus,

mus, quod impedimentum in ipsis faucibus consistit, an infra. Quae enim difficultates deglutiendi caussam iis-
cibus dislitam habent, has tantummodo ad Dysphagi-
spectare credimus, ut capite de *Dysphagia* dicemus.

a) *Tract. de anr. human. c. 2. n. 20.* b) *Comm. h-
scient. et art. acad. Bonon. T. V. part. 2. p. 1.*

§. CCCCXLV.

*Quot modis
luxetur os
hyoides.*

Luxatur autem os hyoides, ejusque appendices
vel introrsum, vel extrorsum. Quocumque modo
hujus ossis cornua, aut appendices distrahatur,
aut e sua sede deflectant, illud necessario sequitur,
ut pharynx quoque, quae cum osse hyoide ope mus-
culi hyopharyngaei jungitur, distrahatur, et sic
distractione deglutitionem laedat, impediat. Si igitur
vis aliqua ossi hyoidei vel extrinsecus, vel intrin-
secus inferatur, haec illud, vel aliquas ejus partes
facile distorquebit, atque adeo luxabit. Sic crassior,
duriorque bolus, vel quid aliud simile per vim in
fauces, oesophagumque adactum, et deglutitum,
extrorsum urgeat os illud, vel ejus cartilagineas
appendices, necesse est; quod erit alterum luxationis
genus, ossi hyoidei proprium. Contra violenta
manuum in guttur injectio, vel exterior ictus,
percutio, pressioque os idem, aut ejus cartilagineas
introrsum inflectet, atque e naturali sede dimove-
bit; quod erit alterum luxationis genus, cui illae
partes subjiciuntur.

§. CCCCXLVI.

*Symptomata
diagnostica.*

Quando illud incidit, ne gutta quidem, nec quicquam
aliud cibi assumi, et deglutiiri potest. Interdum etiam summi,
et crebri deglutiendi conatus accedunt, quales is experiretur,
qui bolum in faucibus haerentem haberet, quae vexatio tanta
quandae est, ut multus, frigidusque sudor undique effluat,
ac pulsus parvi, exilesque fiant. Respiratio tamen

loquendi facultas non admodum offenditur. Larynx solus e sua sede dejectus, et veluti incompositus apparet. Tumor item aliquis hunc inter, et usculum sterno-mastoideum ex alterutro latere rnitur, eoque loco, quo eleuatio est, si contretetur, dolor percipitur. Si his addas defectum, sentiamque eorum, quae aliarum anginarum sunt propria, eo certius de ossis hyoidis luxatione, orque inde deglutiendi difficultate iudicium habebis.

§. CCCCXLVII.

VALSALVAE obseruatio, de qua supra memoui, est ejusmodi: Putabat Bononiensis mulier, quae afforem bolum deglutiuerat carnis non bene mansae, ultisque imposuerat, se diuexari a bolo in faucibus erente: quem ut inde deturbaret, varia manuum, medicamentorum auxilia tentauit; sed incassum. Namque elapsum triduum erat absque eo, quod ullum bolum, vel potum assumere potuisset, cum denique a se opem quaesuit. Ego vero omnibus perpensis, cum aliqua ex appendicibus cartilagineis ossis hyoidis luxationem suspicarer, partem, ut anatomica indicabat sententia, ita digitis contrectaui, et illico per unam, et alteram contrectationem omnia in pristinum statum ducta sunt, sic ut immediate absque ullo deglutiendi commodo iusculum sumere, et cibum, mulier modo sperata, potuerit. Haecenus VALSALVA. Haec obseruatio exemplum sistit luxationis ossis hyoidis causa intrinsecus applicita inductae. Quas habuit MOLINELLIVS, luxationem hae exhibent, iam genuit vis extrinsecus illata. Prior autem exponitur: Chirurgus annos agens vigintiquinque, habitu corporis gracilis, cum nescio quid e manibus erire niteretur robustioris iuuenis, manum hic illius collinjecit, atque in mutua illa concertatione virium ad maiorem, et dexteram partem vehementer preffit. Nihil

Confirmatur res exemplis.

Molinellii binae observationes.

hil postea solidi, nihil liquidi deglutire chirurgus potuit. Elapsa hora de me auxilium quaerit. Perstabam ea, quam modo dicebam, deglutiendi difficultatem summos, assiduosque deglutiendi stimulos, atque intus, etiamsi nihil in os quidquamsumeret ad deglutendum. Eaque afflictatio sic opprimebat intrepidum ceteroquin hominem, ut jam multo, frigidoque sudore perfunderetur, et pulsus exilis fierent, nec de se sciretam, nisi angustiae vis remississet, omnino trahi posse affirmaret. Haud multum tamen loquendi, respirandique turbatam facultatem dixissem. Larynx tunc deformata non nihil, atque incompressa visa est. Temor etiam aliquis hanc inter, et musciculum sternocleidaleum dexterum apparuit; ab eoque loco, si tangeretur, dolebat non leuiter a). En alteram ejusdem observationem in haec verba: Vir mihi b) Nofocomio se obtulit annos natus duos, et quinquaginta, modo exi statura, atque habitu, cujus dexterarum, superiorum anterioris colli regionis parti cum manu quicquid lapidem distringebat, iratus imegisset, tanta pressuram illam, quanta in eo, de quo antea diximus, deglutiendi difficultas consecuta est, anxietas plane tanta. Nihil difficultate post horas minimum trahente Nofocomium petiit b). Utrosque continuo in integrum restituit, adhibita, quam mox et eodem tradam, facili curationis ratione. Eandem ego quoque adhibui eundam mulieri, quae a viginti jam horis nihil prorsus potuerat deglutire, nec teme aliquid dicere. Praeter enim difficultatem deglutiendi, de qua querebatur, vocis etiam, et loquendi potestatis non parum amiserat. A manu vehementer injecta compressae eidem foras fauces. Illico VALSALVAE, et MOLINELLI observationum recordatus, eam ab omni incommodoliberaui intra pauca minuta.

Curatio.

Observatio
Auctoris.

a) L. c. p. 4. b) lb. p. 6.

§. CCCCXLV

§. CCCCXLVIII.

Curatio autem sic instituitur: Ministro ad caput continendum delecto, dexteræ manus index, si luxatio dextrorsum inclinēt; si vero sinistrorsum, sinistrae index altē in fauces demittitur tonsillam intrat, et linguae basin ex eo latere, in quod luxatio detur protuberare, vel quaquaversum modo in eam, modo in aliam faucium partem, si affecti loci des nequaquam perspecta satis sit. Eodem tempore index, mediusque digitus sinistrae manus in imo indicato casu, dexteræ vero in altero extrinsecus collo transversim admoventur, eo in loco, ubi ossis hyoidis sedi respondeat. Indice, qui in fauces immissus est, os hyoides leniter promouetur, flectaturque secundum ejus longitudinem vel anteriorem partem, vel in posteriorem, prout luxatio introrsum, aut extrorsum contigerit, pressio- nem una moderantibus, ac dirigentibus digitis collo trinsecus appositis. Idque interdum repeti bis, si iter oportet, donec deglutiendi potestas omnino leat; quod momento fere temporis consequitur. Si vero si ex luxatione inflammatio orta jam sit, nec discutienda prius est, quam ad ossis repositionem deueniatur, ut facilius euadat.

ALIAE ANGINAE SPECIES.

§. CCCCXLIX.

Memoratis addi possent anginae a veneno canis mordi, aut aliorum animalium, a semine daturae, inanitate, atque exsolutione morbis grauioribus, diuturnisque superueniente, ac demum a dentibus, et circa fauces haerentibus *). Quarum tamen vel ad anginam *convulsivam*, aut *paracram* referri commodè possunt, vel ad morbos, eorum curatio chirurgis committenda est. Chirurgis

rurgis quoque relinquuntur illae anginae, quae a
 excrescentiis, fungis, verrucis, ossibus, calculis pharyngi, vel oesophago innatis, a tumore glandulae thyroideae, a thymo adaucto, et indurato, ab accessibus, a sarcomate, a polypo, a scirrho, aliis id genus causis difficilem deglutitionem, aut inspirationem reddentibus proficiuntur; quarum harum non nullae opportunius a nobis pertrahendae fortasse erunt, cum de *dysphagia* sermo habetur.

*) Corpora aliena in fauces delapsa, ibique in oculis pateant, vossella, aut vincto idoneo educuntur, tenui ceri pinna, vel cereo in ventriculum detrudentur, vel oleosis, pinguibus, et mucilaginosus sensim foras viae sic lubricantur, ut illa suum iter deorsum perficiant. Spinae defixae, aut alia acuta corpora, si extrahi, aut primi nequeant, inflammationem inducant, et sanguinis missionem exigunt. Facta demum suppuratio aut dunt, aut sursum redeunt. Non desunt exempla eorum, qui moto vomitu corpora illapsa sursum eiecerunt. Sed si acuta fuerint, et infixae, timendum est, ne vehementius, et altius defigantur. Res difficilior est, quando in tracheam, aut bronchia aliena ingrediuntur. Tunc cum vel continuo eliso spiritu occidunt, vel lentos pulmonum vires asserunt. Rarum omnino est, ut tussis ope extrahatur, et per os exeant. Puellam decem circiter, aut duodecim annorum, gracilem, tenuique habitu corporis praeditam vidi, cui dens primus molaris a chirurgo evulsus, malo fato e forcipe elapsus in fauces decidit, et in glottidem se se intrusit. Parum absuit tunc, quin suffocaretur. Post aliquot vero horas, quibus cum morte colluctata est, dente laryngis angustias praeterlapsa, altiusque in tracheam protruso, coepit melius habere, sola molestissima tussis et sibilo, et stertore assiduo vexata. Casum miserum consului, ut eclegma oleosum subinde cochlearum assumeret, decoctum emolliens tepidum saepe sorbillaret, et rumpere bis saltem in die aquae calidae ore exciperet. Si quid incideret, uti dolor, sanguinis sputum, febris, aut tussis vehementior, sanguinem sibi mitti curaret; quod utique necesse fuit post aliquot dies ob dolorem pleuriticum, febremque cum tussi asperiore abortam, et

putum sanguine tinctum semel facere. Ceterum continuato, quod dixi, regimine, viisque laxatis, quodam nane experrecta puella, et tussi de more, sed atrociore orrepta sensit sibi aliquid ad laryngem adscendere, moxque matrem dentem proxime erupturum. Et reapse exitus comprobavit. Tussiendo enim dentem paullo post eiecit, et sic ab omni et tussi, et stertore libera uasit. Scire autem oportet, inspectis, pertrectatisque uicibus nihil iis deprehensum esse alieni, aut doloris vnam perceptum. Complures et medici, et chirurgi non vulgares id tentarunt, testatumque faciunt. Tussis nunquam abfuit, saepe spirandi difficultas accessit, et quod nimaduersione in primis dignum est, interdum quidem ost primos dies sibilum, et stertorem inter respirandum non raro filuisse, fortasse dente inferius, dum ipsa erecta caret, descendente; rediisse vero certissime, et constanter, simul ac lectum peteret, et horizontaliter decumberet, dente tunc, ut videtur, altius prouecto. Dies utem fausta, qua dens extussus est, nonnisi post sesquiensem circiter ab extractione dentis elapsum, auspiciato illuxit. En quomodo natura prouide a Medico adiuta et tanto discrimini eripuit.





